行政院農業委員會 農業試驗所 特刊 第104號
Taiwan Agric. Res. Inst., Spec. Publ. No. 104

害蟲天敵名錄
下冊
A List of Natural Enemies of Insect Pests
Vol. III

林珪瑞編著
Compiled by Kwei-shui Lin

行政院農業委員會 農業試驗所 印行
中華民國九十二年九月
Published by
Taiwan Agricultural Research Institute
Wufeng, Taichung, Taiwan, R.O.C
September, 2003

行政院農業委員會 農業試驗所 特刊 第 104 號
Taiwan Agric. Res. Inst., Spec. Publ. No. 104

害蟲天敵名錄
下 冊
A List of Natural Enemies of Insect Pests
Vol. III

林 珪 瑞 編 著
Compiled by **Kwei-shui Lin**

行政院農業委員會 農業試驗所 印行
中華民國九十二年九月
Published by
Taiwan Agricultural Research Institute
Wufeng, Taichung, Taiwn. R.O.C
August, 2003

ACARINA 蜱蟎目

(Yue, 1989:179-189)

Parasitidae 寄蟎科

Cornigamasus lunaris Berlese 新月角革蟎 (Gu et Huang, 1993:177)

Cornigamasus lunaris Berlese, 1882:

寄 主：大倉鼠(*Cricetus triton* de Winton)。

分 佈：陝西。

Cornigamasus lunaroides Ma 擬月角革蟎 (Ma, 1986:384)

Cornigamasus lunaroides Ma, 1986:384-386.

寄 主：喜馬拉雅旱獺(*Marmota himalayana* Hodgson)。

分 佈：甘肅(洮江縣歐拉)。

Eugamasus butleri Hughes 布氏真革蟎 (Xin, 1988:111)

棲 息：稻穀、礱糠、碎米屑、糧堆和加工副產品中與粉蟎雜居。

捕 食：粉蟎。

分 佈：

Eugamasus minus Gu et Huang 小真革蟎 (Gu et Huang, 1990:317; 1993:177)

Eugamasus minus Gu et Huang, 1990:317-319.

寄 主：洮州絨鼠(*Eothenomys eva* Thomas)。

分 佈：陝西(太白縣大箭溝)。

Eugamasus yinchuanensis Bai, et al. 銀川真革蟎 (Bai, et al., 1994:497)

Eugamasus yinchuanensis Bai, et al., 1994:497.

棲 息：*Salix* sp. 柳樹皮下腐植層。

捕 食 性。

分 佈：寧夏(銀川市)。

Eugamasus spp. (Xin, 1988:111)

棲 息：

捕 食：線蟲及小蠹蟲坑道中的蟎類。

分 佈：

Gamasodes guoluoensis Gu et Liu 果洛革索蟎 (Gu et Liu, 1995:65)

Gamasodes guoluoensis Gu et Liu, 1995:65-67.

棲 息：鼠穴、鳥巢。

捕 食 性。

分 佈：青海(達日縣)。

Parasitus brachychaetus Ma 短毛寄蟎 (Ma, 1986:379)

Parasitus brachychaetus Ma, 1986:379-381.
寄 主：喜馬拉雅旱獺(*Marmota himalayana* Hodgson)、根田鼠(*Microtus oeconomus* Pallas)、中華鼢鼠(*Myospalax fontanieri* Milne-Edwards)。
分 佈：甘肅(洮江縣歐拉)。

Parasitus coleoptratorum 甲蟲寄蟎 (Xin, 1988:111)
棲 息：
捕 食：家蠅(幼蟲)。
分 佈：

Parasitus consanguineus Oudemans et Voigst 親緣寄蟎 (Deng et Cui, 1992:690; Gu et Huang, 1993:178)
Parasitus consanguineus Oudemans et Voigst, 1904:
寄 主：小家鼠(*Mus musculus* Linnaeus)。
分 佈：貴州、雲南、江蘇、陝西、青海、寧夏；蘇聯、希臘、歐洲。

Parasitus diviortus Athias-Henriot 富生寄蟎 (Gu et Huang, 1993:178)
Parasitus diviortus Athias-Henriot, 1967:
=*Parasitus insignis* (Holzmann, 1969:)
寄 主：藏鼠兔(*Ocotona thibetana* Milne-Edwards)。
分 佈：陝西。

Parasitus fimestorum (Berlese) 糞堆寄蟎 (Gu et Huang, 1993:178)
Parasitus fimestorum (Berlese, 1904:)
寄 主：東方田鼠(*Microtus fortis* Buchner)。
分 佈：陝西。

Parasitus fragilis Ma 脆毛寄蟎 (Ma, 1986:382)
Parasitus fragilis Ma, 1986:382-384.
寄 主：喜馬拉雅旱獺(*Marmota himalayana* Hodgson)、達烏爾鼠兔(*Ochotona daurica* Pallas)。
分 佈：甘肅(洮江縣瑪曲)。

Parasitus imitofragilis Ma 擬脆寄蟎 (Ma, 1990:61)
Parasitus imitofragilis Ma, 1990:61.
寄 主：*Allactaga sibirica* Forster 五趾跳鼠
Citellus dauricus Bandt 達烏爾黃鼠
Cricetulus triton Winton 大倉鼠
Mus musculus Linnaeus 小家鼠。
分 佈：吉林。

Parasitus mustelarum Oudemans 鼬寄蟎 (Wang et Ma, 1994:448)
Parasitus mustelarum Oudemans, 1903:
寄 主：甲蟲、鼠巢。

分 佈：寧夏、吉林；蘇聯(西伯利亞西部、高加索、歐洲部分)、意大利、瑞士、波蘭、奧地利、德國、荷蘭、挪威、英國。

Parasitus tichomirovi Davydova 季氏寄蟎 (Wang et Ma, 1994:313)

Parasitus tichomirovi Davydova, 1971:

寄 主：沙土鼠巢。

分 佈：寧夏；西伯利亞西部、蘇聯歐洲部分、西歐。

Poecilochirus necrophori Vitzthum 埋甲異肢蟎 (Deng et al., 1989:64; Gu et Huang, 1993:177)

寄 主：莫氏田鼠、布氏田鼠、狹顱田鼠、背紋毛蹠鼠、五趾跳鼠、達烏爾黃鼠、黑線倉鼠、黑線姬鼠、大林姬鼠、長爪沙鼠、棕背鼪、藏鼠兔(*Ochotona thibetana* Milne-Edwards)、鼠兔等。

分 佈：陝西、河北、青海、新疆、內蒙古、吉林、黑龍江；蘇聯、歐洲。

Poecilochirus subterraneus Müller 地下異肢蟎 (Deng et Cui, 1992:690; Deng et al., 1989:63; Pan et Teng, 1980:139)

寄 主：布氏田鼠、鼠兔等。

分 佈：湖南、青海、內蒙古、吉林、黑龍江；蘇聯、歐洲。

Vulgarogamasus dongbei Ma 東北常革蟎 (Ma, 1990:64)

Vulgarogamasus dongbei Ma, 1990:64.

寄 主：*Myospalax aspalax* Pallas 草原鼢鼠。

分 佈：吉林。

Vulgarogamasus gansuensis Ma 甘肅常革蟎 (Ma, 1987:271)

Vulgarogamasus gansuensis Ma, 1987:271-272.

寄 主：喜馬拉雅獺(*Marmota himalayana* Hodgson)。

分 佈：甘肅(洮江縣)。

Vulgarogamasus kraepelini (Berlese) 卡氏常革蟎 (Deng et Cui, 1992:690)

寄 主：

分 佈：貴州；蘇聯、奧地利、英國。

Vulgarogamasus multisetus Gu et Huang 多毛常革蟎 (Gu et Huang, 1993:179)

Vulgarogamasus multisetus Gu et Huang, 1993:179-180.

寄 主：大倉鼠(*Creicetus triton* de Winton)。

分 佈：陝西。

Vulgarogamasus oligochaetus Gu et Huang 貧毛常革蟎 (Gu et Huang, 1993:178)

Vulgarogamasus oligochaetus Gu et Huang, 1993:178-179.

寄 主：鳥巢中。

分 佈：陝西。

Vulgarogamasus oudemansi (Berlese) 奧氏常革蟎 (Deng et Cui, 1992:690)

寄 主：

分 佈：貴州；蘇聯、德國、英國。

Vulgarogamasus palmatus Gu et Huang 掌狀常革蟎 (Gu et Huang, 1993:180)

Vulgarogamasus palmatus Gu et Huang, 1993:180-181.

寄 主：藏鼠兔(*Ochotona thibetana* Millne-Edwards)。

分 佈：陝西。

Vulgarogamasus qiangorlosana Ma 前郭常革蟎 (Ma, 1990:63)

Vulgarogamasus qiangorlosana Ma, 1990:63.

寄 主：大倉鼠(*Cricetulus triton* Winton)、黑線倉鼠(*Cricetulus barabensis* Pallas)。

分 佈：吉林。

Vulgarogamasus remberti (Oudemans) 倫勃常革蟎 (Gu et Huang, 1993:178)

Vulgarogamasus remberti (Oudemans, 1912:)

寄 主：大倉鼠(*Cricetus triton* de Winton)。

分 佈：陝西；蘇聯、西歐各國。

Vulgarogamasus sinicus Ma 中華常革蟎 (Ma, 1987:272)

Vulgarogamasus sinicus Ma, 1987:272-274.

寄 主：喜馬拉雅獺(*Marmota himalayana* Hodgson)。

分 佈：甘肅(洮江縣、興海縣)。

Vulgarogamasus squarrosus Ma 粗糙常革蟎 (Ma, 1987:274)

Vulgarogamasus squarrosus Ma, 1987:274-278.

寄 主：根田鼠(*Microtus oeconomus* Pallas)、喜馬拉雅獺(*Marmota himalayana* Hodgson)。

分 佈：甘肅(洮江縣)。

Vulgarogamasus stepposus Ma 草原常革蟎 (Ma, 1987:281)

Vulgarogamasus stepposus Ma, 1987:281-284.

寄 主：根田鼠(*Microtus oeconomus* Pallas)、喜馬拉雅獺(*Marmota himalayana* Hodgson)、達烏爾鼠兔(*Ochotona daurica* Pallas)。

分 佈：甘肅(洮江縣)。

Vulgarogamasus trifidus Ma 三尖常革蟎 (Ma, 1987:278)

Vulgarogamasus trifidus Ma, 1987:278-281.

寄 主：根田鼠(*Microtus oeconomus* Pallas)、喜馬拉雅獺(*Marmota himalayana* Hodgson)、達烏爾鼠兔(*Ochotona dautica* Pallas)。

分 佈：甘肅(洮江縣、興海縣)。

Digamasellidae 雙革蟎科

Euryparasitus emarginatus Koch 凹緣寬寄蟎 (Pan et Teng, 1980:141)
寄 主：鼠穴。
分 佈：浙江、江蘇、遼寧、吉林、黑龍江；蘇聯、歐洲一些國家。

Veigaidae 維蟎科

Veigaia kochi (Trägårdh) 克維蟎 (Deng et Cui, 1992:691; Pan et Teng, 1980:142)
寄 主：採自朽木下。
分 佈：貴州、青海；蘇聯、歐洲一些國家。

Veigaia sinicus Ma et Piao 中國維蟎 (Ma et Piao, 1981:148)
Veigaia sinicus Ma et Piao, 1981:148.
寄 主：田鼠 (*Microtus* sp.)。
分 佈：甘肅。

Rhodacaridae 胭蟎科

Euryparasitus citelli Bai et al. 黃鼠寬寄蟎 (Bai et al., 1988:369)
Euryparasitus citelli Bai et al., 1988:369-371.
寄 主：阿拉善黃鼠(*Citellus alaschanicus* Büchner)。
分 佈：寧夏(海原縣)。

Euryparasitus taojiangensis Ma 桃江寬寄蟎 (Ma, 1982:115)
Euryparasitus taojiangensis Ma, 1982:115.
寄 主：田鼠(*Microtus* sp.)
喜馬拉雅旱獺(*Marmota himalayana* Hodgson)
中華鼢鼠(*Myiospalax fontanieri* Milne-Edwards)
達烏爾鼠兔(*Ochotona daurica* Pallas)。
分 佈：甘肅。

Puchihlungia chinensis Samsinak 中國蒲氏蟎 (Pan et Teng, 1980:138; Xin, 1988:112)
捕 食：*Coptotermes formosanus* Shiraki 家白蟻。
分 佈：廣東。

Blattisocidae (Aceosejidae) 蠊蟎科，裂胸蟎科

Blattisocius dentriticus (Berlese) 等鉗蠊蟎 (Deng et al., 1989:61; Pan et Teng, 1980:133; Xin, 1988:117)
捕 食：捕食糧、糖等倉貯中的粉蟎類，尤喜食其卵和幼期蟎
Tyrophagus putrescentiae 腐食酪蟎。
分 佈：廣東、四川、浙江、遼寧；日本、斯里蘭卡、意大利、荷蘭、英國、美國等國家。

Blattisocius keegani Fox 基鐮蟎 (Pan et Teng, 1980:134)

捕 食：自古巴進口糖中採得。

分 佈：馬來西亞、英國、以色列、北美。

Blattisocius tarsalis (Berlese) 跗鐮蟎 (Deng et al., 1989:62; Pan et Teng, 1980:134; Xin, 1988:116)

Blattisocius tarsalis (Berlese, 1918)

捕 食：在糧、糖等倉貯中生活，捕食粉蟎、 *Sitoroga* sp. (麥蛾) 或 *Plodia* sp. (穀螟) 的幼蟲和卵。

分 佈：廣西、雲南、湖南等省區；意大利、瑞士、英國等歐洲國家以及美國和澳洲。

Blattisocius keegani Fox 基鐮蟎 (Xin, 1988:117)

捕 食：穀物中甲蟲類的卵，如銹赤扁穀盜、雜擬穀盜、赤擬穀盜、鋸穀盜，也取食家食甜蟎。

分 佈：自古巴進口砂糖中發現。

Hypoaspis magnisetae Ma 巨毛下盾蟎 (Ma, 1988:147)

Hypoaspis magnisetae Ma, 1988:147-148.

寄 主：喜馬拉雅旱獺(*Marmota himalayana* Hodgson)。

分 佈：吉林(撫松縣)。

Hypoaspis sp. 厲蟎 (Lo, 1997:62)

寄 主：*Rhizoglyphus* spp. 根蟎。

分 佈：臺灣。

Neojordensia levis (Oudemann et Voigts) 里新約蟎 (Pan et Teng, 1980:137)

寄 主：地面採得。

分 佈：黑龍江；德國、奧地利、英國。

Proctolaelaps cossi (Duges) 蠹蛾肛厲蟎 (Bai et al., 1993:175)

Proctolaelaps cossi (Duges, 1834)

寄 主：*Potosia brevitarsis* Lewis 白星花金龜。

國外：蠹蛾蟲體上。

分 佈：寧夏(銀川市)；蘇聯、荷蘭。

Proctolaelaps pygmaeus (Müller) 矮肛厲蟎 (Deng et Cui, 1992:691; Pan et Teng, 1980:136)

寄 主：黃胸鼠。

分 佈：江西、貴州、雲南、四川、吉林；日本、印尼、澳洲、新西蘭、南非、歐洲、北美。

Proctolaelaps yinchuanensis Bai et al. 銀川肛厲蟎 (Bai et al., 1993:174)

Proctolaelaps yinchuanensis Bai et al., 1993:174-175.

寄 主：*Potosia brevitarsis* Lewis 白星花金龜。
分 佈：寧夏(銀川市)。

Ascaidae 囊螨科(氈螨科)

Asca aphidioides (Tseng, 1975:445)
Asca aphidioides
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Asca flabellifera Tseng (Tseng, 1975:445)
Asca flabellifera Tseng, 1975:445.
捕 食 性。
分 佈：

Asca longispinosa Tseng (Tseng, 1975:445)
Asca longispinosa Tseng, 1975:445.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Asca sinica Bai et Gu 中華囊螨 (Bai et Gu, 1992:314)
Asea sinica Bai et Gu, 1992:314-316.
寄 主：*Myrmos* sp. 蟻洞道及巢穴內。
分 佈：寧夏(海原縣)。

Asca spicata (Tseng, 1975:445)
Asca spicata
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Blattisocius keeqani (Tseng, 1975:445)
Blattisocius keeqani
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Lasioseius allii Chant (Tseng, 1975:445; Tseng, 1978:125;)
Lasioseius allii Chant, 1958:383-384.
=*Lasioseius bispinosus* Evans, 1958:220-221.
=*Lasioseius martini* Tseng, 1971:1-4.
棲 息：Associated with acarid mites on decaying bulbs such as the gladiota, lily, shallot, garlic and turnip.
捕 食 性。
分 佈：臺灣；英國、美國。

Lasioseius confuses Evans 混毛綏蟎 (Pan et Teng, 1980:135)

寄 主：地面草堆採得。

分 佈：黑龍江；英國、北美。

Lasioseius fenchihuensis Tseng (Tseng, 1975:445; Tseng, 1978:126)

Lasioseius fenchihuensis Tseng, 1975:445.

棲 息：柑橘。

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Lasioseius lindiquisti Tseng (Tseng, 1975:445)

Lasioseius lindiquisti Tseng, 1975:445.

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Lasioseius martini Tseng 根囊蟎 (Tseng, 1971:1-3)

捕 食：蔥、蒜根蟎。

分 佈：臺灣。

Lasioseius paucispathus Ge et Wang 貧板毛綏蟎 (Deng et Cui, 1992:691)

寄 主：

分 佈：貴州。

Lasioseius seilliticus Tseng (1975:445; Tseng, 1978:119)

Lasioseius seilliticus Tseng, 1975:445. 1978:119-121.

棲 息：*Spinolus murossi.*, Solanaceae., Decaying gaclic bulb.

捕 食：粉蟎(鱗莖上)。

分 佈：臺灣。

Lasioseius sugawarai Ehara (Tseng, 1978:118)

Lasioseius sugawarai Ehara, 1964:390-391.

棲 息：鳳梨。

捕 食：粉蚧(若蟲)

Acarid mites。

分 佈：臺灣。

Lasioseius taiwanicus Tseng (Tseng, 1975:445; 1978:121)

Lasioseius taiwanicus Tseng, 1975:445.

棲 息：Decaying material.

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Lasioseius wangi Ma 王氏毛綏蟎 (Wang, 1988:148)

Lasioseius wangi Ma, 1988:148-149.
寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius* Pallas)。
分 佈：吉林(撫松縣)。

Lasioseius youcefi Athias-Henriot (Tseng, 1975:445; 1978:124)
Lasioseius youcefi Athias-Henriot, 1959:182.
棲 息：鳳梨。
捕 食 性。
分 佈：臺灣；阿爾及利亞。

Lasioseius sp. 毛綏蟎 (He, et al., 1991:143)
捕 食：*Stenotarsonemus spinki* Smily 斯氏狹跗線蟎(稻跗線蟎)。
分 佈：福建。

Lasioseius sp. 氈蟎 (Chen et Lo, 1978:300)
Lasioseius sp., Chen et Lo, 1978:300.
棲 息：水稻。
捕 食：稻細蟎
Tarsonemus sp. 食菌細蟎(以 PDA 培養水稻小黑菌核病菌，供飼育食菌蟎，進而以食菌細蟎飼育氈蟎。
分 佈：臺灣。

Paeaproctolaelaps zhongweiensis Bai et Gu 中衛副肛厲蟎 (Bai et Gu, 1994:75)
Paeaproctolaelaps zhongweiensis Bai et Gu, 1994:75-76.
寄 主：*Apis* sp. 蜜蜂體上。
分 佈：寧夏(中衛縣)。

Proctolaelapa pygmaeus **(Tseng, 1975:445)**
Proctolaelapa pygmaeus
捕 食：蟎類、跳蟲、雙翅目幼蟲、蚧類幼期或卵、洋菇體常發現。
分 佈：臺灣。

Phytoseiidae 植綏蟎科(捕植蟎科)

(Guangdong ERI et al., 1978, 21(3):260-270; Huang, 1979(1):61-65, Wu, 1980, 2(3):39-50; 1980(2):54-59; Yang et al., 1983, 25(1):49-55)

Amblyseius abbasovae Wainstein et Begljarov 阿索娃鈍綏蟎 (Zhang, 1987[ed.] 2:96)
棲 息：艾。
捕 食 性。
分 佈：江西。

Amblyseius ainu Ehara 蝦夷鈍綏蟎 (He, et al., 1991:142; Hun., 1992:1361; Wu et al., 1991:150; Zhang, 1987[ed.] 2:94)
Amblyseius (s. str.) *ainu* Ehara, 1967:218-219.

棲 息：水稻、茶、竹、樟、烏飯樹、楓樹等。
捕 食：水稻有害蟎類。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川、貴州；日本。

Amblyseius aizawai Ehara et Bhandhufalck 愛澤鈍綏蟎 (ASZI, 1987, 2:795; He et al., 1992:180-181; Li, et al., 1991:131; Lin et al., 1991:90; Liang et Ke, 1983:163; Qi, 1981(1-2):59; Su et al., 1986:38; Xin, 1988:144)
棲 息：柑橘、槐、木瓜。
捕 食：*Brevipalpus obovatus* Donnadieu 卵形短須蟎(大紅花)
Panonychus citri (McGregor) 柑橘全爪蟎
花粉(飼養用)。
分 佈：海南、廣東、雲南、貴州；泰國。

Amblyseius alpigenus Wu 高山鈍綏蟎 (Wu, 1987:260)
Amblyseius alpigenus Wu, 1987:260-261.
棲 息：草。
捕 食 性。
分 佈：吉林(長白山溫泉)。

Amblyseius (s. str.) **alpinia** Tseng 鈍綏蟎 (Tseng, 1983:49)
Amblyerius (s. str.) *alpinia* Tseng, 1983:49-52.
棲 息：*Alpinia speciosa.*
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Amblyseius (s. str.) **altiplanumi** Ke et Xin 高原鈍綏蟎 (Ke et Xin, 1982:307)
Amblyseius (s. str.) *altiplanumi* Ke et Xin, 1982:307.
棲 息：委陵菜屬一種(薔薇科)。
捕 食 性。
分 佈：雲南(中甸)。

Amblyseius (s. str.) **anuwati** Ehara et Bhandhufalck 恩氏鈍綏蟎 (Hun., 1992:1361; Lin et al., 1991:90; Tseng, 1983:44; Wu, 1980(3):49; Wu, 1981:205; Wu et Lan, 1992:692; Zhang, 1987[ed.] 2:94)
Amblyseius anuwati Ehara et Bhandhufalck, 1977:63-66.
棲 息：柑橘、桃、梨、咖啡、油桐、甜櫧、栲、葎草、杉等。
捕 食：*Panonychus citri* (McGregor) 柑橘全爪蟎。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、四川、江蘇；泰國。

Amblyseius asetus (Chant) 少毛鈍綏蟎 (ASZI, 1987, 2:790; Xin, 1988:135; Tseng, 1983:40)
Typhrodromus (*Amblyseius*) *asetus* Chant, 1959:80-81.
Amblyseius (s. str.) *asetus,* Schuster et Pritchard, 1963:243-246.
棲 息：風輪菜、葎草、雜草。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、廣西、上海；美國。

Amblyseius astututs (Beglarov) 靈敏鈍綏蟎 (Wu, 1987:267)

Typhlodromus astutus Beglarov, 1960:956-958.

棲 息：梨、楊、水曲柳。

捕 食 性。

分 佈：遼寧、黑龍江。

Amblyseius asiaticus (Evans) 亞洲鈍綏蟎 (ASZI, 1987, 2:786; Hun., 1992:1362; Qi, 1981(1-2):59; Su et al., 1986:38; Wu, 1980(3):50; Wu et Lan, 1992:692; Xin, 1988:131; Zhang, 1987[ed.] 2:94; Zeng, et al., 1991:129)

=*Amblyseius* (s. str.) *siaki* Ehara

棲 息：梨、蕃石榴、柑橘、黃皮果、木瓜、茄子、西瓜、芝麻、玄參、向日葵、千斤拔、山苧麻、一年蓬、女貞、牛膝、牡荊、蕨、馬鞭草、飛機草、野菊、漆樹等。

捕 食：*Bravipalpus obovatus* Donnadieu 卵形短須蟎(女貞子)
Panonychus citri (McGregor) 柑橘全爪蟎。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、香港、廣西、貴州、雲南；印尼、馬來西亞、泰國、印度、塞浦路斯。

Amblyseius (s. str.) **australis** Wu et Li 南方鈍綏蟎 (Wu et Li, 1983;172)

Amblyseius (s. str.) *australis* Wu et Li, 1983:172-173.

棲 息：番石榴、草。

捕 食 性。

分 佈：福建、海南、雲南。

Amblyseius (s. str.) **baiyunensis** Wu 白雲鈍綏蟎 (Wu, 1982:97)

Amblyseius (s. str.) *baiyunensis* Wu, 1982:97.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：廣東(廣州白雲山)。

Amblyseius (s. str.) **barkeri** (Hughes) 巴氏鈍綏蟎 (ASZI, 1987, 2:790; He, et al., 1991:142; Hun., 1992:1362; Pan et Teng, 1980:132; Wu, 1980(3):47; Wu, 1981:205; Wu et al., 1991:148; Xin, 1988:136; Zhang, 1987[ed.] 2:94)

Neoseiulus barkeri Hughes, 1948:141.

別 名：*貝氏鈍綏*蟎。

棲 息：木瓜、水稻、小麥、木瓜、黃花蒿、牛滕、雞屎藤、芒、枸。

捕 食：*Tetranychus piercei* McGregor 皮氏葉蟎
稻田跗線蟎。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、雲南；日本、蘇聯、泰國、阿爾及利亞、北;非、以色列、歐洲、美國。

Amblyseius (s. str.) **bellatulus** Tseng 桑棲純綏蟎 (Tseng, 1983:38)

棲 息：桑 *Morus alba*.

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Amblyseius (s. str.) **brevicervix** Wang et Li 短頸鈍綏蟎 (Wang et Li, 1985:269)

Amblyseius (s. str.) *brevicervix* Wang et Li, 1985:269-270.
棲 息：艾。
捕 食 性。
分 佈：四川(峨嵋山)。

Amblyseius californicus (McGregor) 加州鈍綏蟎 (Lo, 1986:31; 1997:59; Lo et Chen, 1995:370; Wu et al., 1985:469-476; 1986:118)

別 名：*加州捕植蟎*。
棲 息：
捕 食：*Panonychus citri* (McGregor) 橘全爪蟎
Tetranychus kanzawai Kishida 神澤葉蟎(草莓)
Tetranychus urticae Koch 二點葉蟎。
分 佈：臺灣(於 1983 年自夏威夷引進)；夏威夷、美國。

Amblyseius calorai 短毛鈍綏蟎 (Lo et Ho, 1970:193)

別 名：*短毛蟎*。
棲 息：旱作
捕 食：*Brevipalpus obovatus* Donn. 擬紅蟎
Panonychus citri (McGreger) 橘全爪蟎
Tetranychus cordylinicolus Lo 葉蟎
Tetranychus cucurbitae Rahm. et Punj. 瓜葉蟎
Tetranychus hydrangeae Prichard et Baker 繡球葉蟎
Tetranychus kanzawai Kishida 神澤葉蟎
Tetranychus piercei McGreger 皮氏葉蟎
Tetranychus truncatus Etr. 截形葉蟎。
分 佈：臺灣。

Amblyseius castaneae Wang et Xu 栗鈍綏蟎 (Wang et Xu, 1987:153)

Amblyseius castaneae Wang et Xu, 1987:153.
棲 息：板栗(*Castanea mollissima* Bl.)。
捕 食 性。
分 佈：北京。

Amblyseius changbaiensis Wu 長白鈍綏蟎 (Wu, 1987:262)

Amblyseius changbaiensis Wu, 1987:262-263.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：長白山(白山站)。

Amblyseius cinctus Corpuz et Rimando 隘腰鈍綏蟎 (ASZI, 1987, 2:791; Xin, 1988:137; Zeng, et al., 1991:130; Zhou et al., 1988:107)

棲 息：番石榴、枸、西瓜、女貞、苦楝、相思樹、柑橘、扁楊、刺楊、茶、菠蘿蜜等。

捕 食 性。

分 佈：湖南、廣東、廣西、雲南。

Amblyseius (s. str.) **circellatus** Wu et Li 環形鈎綏蟎 (Wu et Li, 1983:173)

Amblyseius (s. str.) *circellatus* Wu et Li, 1983:173-174.

棲 息：紅楠(樟科)。

捕 食 性。

分 佈：福建(大竹嵐)。

Amblyseius (s. str.) **clinopodii** Ke et Xin 鳳輪鈍綏蟎 (Ke et Xin, 1982:308)

Amblyseius (s. str.) *clinopodii* Ke et Xin, 1982:308.

棲 息：鳳輪菜
菊科的一種。

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Amblyseius comitatus De Leon 伴生鈍綏蟎 (Xin, 1988:135)

棲 息：錦帶花、圓柏。

捕 食 性。

分 佈：山東；美國。

Amblyseius (s. str.) **compressus** Wu et Li 直純綏蟎 (Wu et Li, 1984:100)

Amblyseius (s. str.) *compressus* Wu et Li, 1984:100.

棲 息：菊屬的一種。

捕 食 性。

分 佈：四川(峨嵋山)。

Amblyseius crataegi Wang et Xu 山楂鈍綏蟎 (Wang et Xu, 1985:70)

Amblyseius crataegi Wang et Xu, 1985:70.

棲 息：山楂(*Crataegus pinnatifida* Bunge)。

捕 食 性。

分 佈：北京。

Amblyseius cryptomeriae Zhu et Chen 柳杉鈍綏蟎 (Zhang, 1987[ed.] 2:96; Zhu et Chen, 1983:386)

Amblyseius criyptomeriae Zhu et Chen, 1983:386-387.

棲 息：柳杉(*Cryptomeria fortuneri* Hooib.)、柃木(*Eurya japonica* Thunb.)。

捕 食 性。

分 佈：江西(武夷山)。

Amblyseius (s. str.) **curvus** Wu et Li 曲線鈍綏蟎 (Wu et Li, 1985:395)

Amblyseius (s. str.) *curvus* Wu et Li, 1985:395-396.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：海南(尖峰嶺)。

Amblyseius daliensis Liang et Ke 大理鈍綏蟎 (Liang et Ke, 1984:152)

Amblyseius daliensis Liang et Ke, 1984:152-153.

棲 息：蕨菜(*Pteridium aquilinum*)。

捕 食 性。

分 佈：雲南(大理)。

Amblyseius (s. str.) **deleoni** Muma et Denmark 德氏鈍綏蟎 (ASZI, 1987, 2:786; Chang et Tseng, 1978:339; Chen et al., 1982:49-55; Dai, 1992:41; He et al., 1996(4):33; Huang, 1990[ed.]:228; Hubei, Tian-men, 1981(4):23-25; Lin, et al., 1991:90; Qi, 1981(1-2):59; Su et al., 1986:38; Tseng, 1975:445; 1976:109-111; Wu, 1980(3):40; Wu, 1981:205; Xin, 1988:131; Ye et al., 1985:147-149; Zhang, 1987[ed.] 2:95; Zhou, 1981(4):11-13; Zhou et al., 1988:107)

Amblyseius deleoni Muma et Denmark, 1970:68-69.

=*Amblyseius* (s, str,) *largoensis* Muma, 1961:287.

Amblyseius (s, str,) *deleoni,* Tseng, 1976:109-111.

棲 息：桃、李、梨、枇杷、柑橘、柚子、黃皮、枳殼、蓮霧、番石榴、扁櫻桃、檬果、龍眼、荔枝、楊桃、釋迦、毛柿、可可椰子、檳榔、酪梨、韶子人心果、桑、野葡萄、茶、甘蔗、大豆、黃梔花、琅玡榆、杜仲、三角楓、喜樹、懸鈴木、羅漢松、紫蘇、苦櫧、茉莉毛、霍香薊(雜草)(*Ageratum conyzoides* Linnaeus)、芒、雜草等，其棲息植物多達 70 餘種。

捕 食：*Acaphylla theae* Watt 茶橙癭蟎

Brevipalpus obovatus Donnadieu 卵形短須蟎 (薔薇)

Panonychus citri (McGregor) 柑橘全爪蟎

Polyphagotarsonemus latus 多食跗線蟎

Pseudalacaspis cockerelli (Cooley) 考氏白盾蚧(白蘭)

Schizotetranychus sexmaculatus Riley 六點黃葉蟎

Panonychus elongatus 桂花長全爪蟎

Tetranychus urticae 二點葉蟎(月季普通葉蟎)

Eotetranychus sp. 黃葉蟎

Tetranychus sp. 木瓜葉蟎

Petrebia harti (Ewing) 酢醬草葉蟎。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、湖北；日本、泰國、澳洲、北美、南非、馬達加斯加等。

Amblyseius (s, str,) **densus** Wu 細密鈍綏蟎 (Wu, 1984:156)

Amblyseius (s, str,) *densus* Wu, 1984:156-157.

棲 息：牡丹(*Paeonia* sp.)、桃(*Prunus persica* Batsch.)。

捕 食 性。

分 佈：雲南(隴川縣、瀾滄縣)。

Amblyseius eharai Amitai et Swirski 江原鈍綏蟎 (He, et al., 1991:142; Huang et Gao, 1996:139; Hun., 1992:1362; Jiang et al., 1988:165-169; Lin et al., 1991:90; Luo et al., 1988:33-42; Luo, et al., 1991:126-127; Pu et al., 1990:355-358; Shi et al., 1989-90:81, 83, 89; Wu et Lan, 1992:692; Wu et al., 1991:86; 149; Zhang et Luo, 1990:151-152; Zhang et al., 1993(3):46-47; Zeng, et al., 1991:130; Zhou et al., 1988:107)

Amblyseius eharai Amitai et Swirski, 1981:59-65.

棲 息：柑橘、荔枝、龍眼、檬果、枇杷、木菠蘿、番石榴、木瓜、香蕉、水稻、玉米、豇豆、茄子、棉花。

捕 食：荔枝癭蟎

Dialeurodes citri Ashmead 柑橘粉虱

Eotetranychus kankitus Ehara 柑橘始葉蟎

Panonychus citri (McGregor) 橘全爪蟎

Tetranychus piercei McGregor 皮氏葉蟎

水稻害蟎類。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、山東；日本。

Amblyseius ezoensis Ehara 伊東鈍綏蟎 (Hun., 1992:1362; Wu et Lan, 1992:692; Zeng, et al., 1991:130)

棲 息：竹、小灌木。

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川；日本。

Amblyseius fallacis (Garman) 僞鈍綏蟎 (Dong et Niu, 1991:10-12; Dong, et al., 1991:134-135; Gao et Wang, 1995, 11(4):174-177; Hao et al, 1886:411-421; Ho, 1990:133-140; Ho et Chen, 1999:193-199; 257-264; Ho et Lo, 1996:183, 185; Kong et Zhang, 1986:158-161; Le et Lo, 1989:128-135; Lo, 1986:31-39; 1997:59; Lo et Chen, 1995:371; Lo et Lee, 1999:26; Lo et al., 1990:168; Wang et al., 1990, 6(3):102-106; Wang, et al., 1991:125-126; Wu et al., 1991, 7(4):160-162; Wu et al., 1993, 15(1):31; Wu et al., 1994, 10(1):32-34; Yu et Chen, 2000, (12):32; Zhang et Kong, 1985(1):10-13; 1985(3):6-9; 1986:10-13; Zhang et Li, 1989:60-63, 149-152; Zhao et al., 1993, 8(2):10-15)

Iphidulus fallacis Garman, 1948:13-14.

別 名：*虛僞鈍綏蟎，法拉斯捕植蟎*。

棲 息：蘋果、櫻桃、梨、桃、草莓、石榴、絲瓜、苦瓜、蘿蔔、一串紅、青岡樹、酸漿、紫穗槐(花粉飼養)。

捕 食：*Oligonychus coffeae* (Nietner) 茶葉蟎

Panonychus citri 橘全爪蟎

Panonychus ulmi (Koch) 蘋果全爪蟎(桃)

Tetranychus cinnabarinus (Boisduval) 朱砂葉蟎

Tetranychus kanzawai Kishida 神澤葉蟎(草莓、木瓜、茶)

Tetranychus piercei 皮氏葉蟎

Tetranychus urticae Koch 二點葉蟎(桃、茶)

Tetranychus viennensis Zacher 山楂葉蟎

可以花粉飼養繁殖。

分 佈：臺灣(1985 年由美國密西根大學引進)、山東(1983 從美國引進)、北京；原產美國北部和加拿大東南部，1983 年北京生物防治研究所從美國引進；加拿

大、美國、巴西、澳洲、新西蘭、阿爾及利亞、德國、印度。

Amblyseius (s. str.) **finlandicus** (Oudemans) 芬蘭鈍綏蟎 (ASZI, 1987, 2:794; Deng et al., 1989:206; Liang et Ke, 1983:162; Lo, 1965:60; Xin, 1988:142)

棲 息：蘋果、桃、山楂、杏、海棠、核桃、板栗、桑、櫟、椿樹、樺樹、木槿、榆、欒樹、山荊子、二球懸鈴木等木本植物。

捕 食：蘋果葉蟎。

分 佈：江蘇、山東、陝西、河北、北京；日本、亞洲、歐洲、美洲。

Amblyseius firmus Ehara 玉蘭鈍綏蟎 (Zhang, 1987[ed.] 2:95)

棲 息：黃花。

捕 食 性。

分 佈：江西。

Amblyseius floridanus (Muma) 佛州鈍綏蟎 (Wu, 1980(3):49)

Amblyseiopsis floridanus Muma, 1955:

Amblyseius floridanus Muma, 1958:

棲 息：柑橘。

捕 食 性。

分 佈：廣東、香港；美國、阿爾及利亞。

Amblyseius (s. str.) **guangxiensis** Wu 廣西鈍綏蟎 (Wu, 1982:97)

Amblyseius (s. str.) *guangxiensis* Wu, 1982:97.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：廣西(桂林)。

Amblyseius (s. str.) **hainanensis** Wu 海南鈍綏蟎 (Wu et Qian, 1983:264)

Amblyseius (s. str.) *hainanensis* Wu, 1983:264.

棲 息：柑橘。

捕 食 性。

分 佈：海南。

Amblyseius (s. str.) **herbicolus** (Chant) 草鈍綏蟎 (Chiu et Lo, 1985:5; Deng, et al., 1989:198; Ho, 1989:117; Hun., 1992:1362; Lin, 1991:90; Lo, 1986:31-39; Lo et Wu, 1989:193; Wu et Lan, 1992:692; Wu et Lo, 1987:421-428; Wu et al., 1991:87; 1992, 15(1):29; Zeng, et al., 1991:130)

Typhlodromus (*Amblyseius*) *herbicolus* Chant, 1959:84-85.

=*Amblyseius* (s. str.) *deleoni* Muma et Denmark, 1970:

別 名：*草棲純綏蟎，長毛鈍綏蟎，長尾捕植蟎*。

棲 息：柑橘、檬果、蘋果、梨、桃、石榴、棗、葡萄、水稻、高粱、玉米、茶樹、棉花、甘藷、豇豆、絲瓜、苦瓜、莧菜、牛膝、風輪菜、扁柏、女貞、黃泡、柞木、榆、葎草、大葉桉、八角楓、辣椒、棕櫚、紫荊、蔓陀蘿、半夏、杉樹、油桐、刺槐、夾竹桃、蓖麻、法國梧桐。

捕　食：Panonychus citri (McGregor)　橘全爪蟎
二點葉蟎
Polyphagotarsonemus latus (Banks)　茶跗線蟎
癭蟎
細須蟎。
分　佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、甘肅、遼寧；巴布亞新幾內亞、新喀里多尼亞、危地馬拉、波多黎各、南非、安哥拉、伊朗。

Amblyseius heterochaetus Liang et Ke　異毛鈍綏蟎　(Liang et Ke, 1984:151)
Amblyseius heterochaetus Liang et Ke, 1984:151-152.
棲　息：牛膝(*Achyranthes bidentata*)。
捕　食　性。
分　佈：雲南(芒市)。

Amblyseius (Asperoseius) heveae (Oudemans)　三葉膠鈍綏蟎　(ASZI, 1987, 2:796; Hun., 1992: 1362; Wu et Lan, 1992:693; Xin, 1988:146; Zhang, 1987[ed.] 2:95)
棲　息：野蒿、艾、藿香薊。
捕　食　性。
分　佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、湖北；印尼、印度等。

Amblyseius hidakai Ehara et Bhandhaflech　希氏鈍綏蟎　(Zeng, et al., 1991:130)
棲　息：
捕　食　性。
分　佈：廣西。

Amblyseius (s. str.) **huanggangensis** Wu　黃崗鈍綏蟎　(Wu, 1986:121)
Amblyseius (s. str.) *huanggangensis* Wu, 1986:121.
棲　息：
捕　食　性。
分　佈：福建(黃崗山)。

Amblyseius huapingensis Wu et Li　花坪鈍綏蟎　(Wu et Li, 1985:342; Zeng, et al., 1991:130)
Amblyseius huapingensis Wu et Li, 1985:342.
棲　息：
捕　食　性。
分　佈：廣西(花坪)。

Amblyseius (Paraphytoseius) hyalinus Tseng　透明鈍綏蟎　(Tseng, 1973:77; 1976:106; Wu, 1980(3):50)
Amblyseius hyalinus Tseng, 1973:77-79.
棲　息：一種懸鉤子屬。
捕　食：粉蝨。
分　佈：臺灣。

Amblyseius (s. str.) imbricatus Corpuz et Rimando 鱗紋鈍綏蟎 (ASZI, 1987, 2:788; Deng et al., 1989:201; He, et al., 1991:142; Hun., 1992:1363; Wu et Lan, 1992:693; Wu et al., 1991:89; 145; Xin, 1988:132; Zhang, 1987[ed.] 2:94; Zeng, et al., 1991:129) 、

Amblyseius imbricatus Corpuz et Rimando, 1966:127-129.

棲 息：荔枝、水稻、玉米、大豆、南瓜、甘蔗、茉莉、葎草等。

捕 食：稻小爪蟎

稻跗線蟎

薊馬。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、上海；菲律賓、泰國、蘇聯。

Amblyseius indocalami Zhu et Chen 箬竹鈍綏蟎 (Zhang, 1987[ed.] 2:96; Zhu et Chen, 1983:385)

Amblyseius sangangensis Zhu et Chen, 1983:385-386.

棲 息：箬竹(*Indocalamus tessellatus* (Munro.) Keng. F.

捕 食 性。

分 佈：江西(武夷山)。

Amblyseius japonicus (Ehara) 日本鈍綏蟎 (Zhang, 1987[ed.] 2:94)

棲 息：竹。

捕 食 性。

分 佈：江西。

Amblyseius (Proprioseiopsis) jianyangensis Wu 建陽鈍綏蟎 (Wu, 1981:208)

Amblyseius (*Proprioseiopsis*) *jiangangensis* Wu, 1981:206.

棲 息：*Diospyros kaki* Linnaeus 柿。

捕 食 性。

分 佈：福建(大竹嵐)。

Amblyseius jiangsiensis Zhu et Chen 江西鈍綏蟎 (Zeng, et al., 1991:130; Zhang, 1987[ed.] 2:96; Zhu et Chen, 1982: 280)

Amblyseius jiangsiensis Zhu et Chen, 1982:280-281.

棲 息：芒(*Miscanthus sinensis* Anderss)。

捕 食 性。

分 佈：廣西、江西(九連山)。

Amblyseius jilinensis Wu 吉林鈍綏蟎 (Wu, 1987:263)

Amblyseius jilinensis Wu, 1987:263-264.

棲 息：蒿。

捕 食 性。

分 佈：吉林(公主嶺、長春市南湖公園)。

Amblyseius juglandis Wang et Xu 核桃楸鈍蟎 (Wang et Xu, 1985:69)

Amblyseius juglandis Wang et Xu, 1985:69.

棲 息：核桃楸(*Juglans manshurica* Maxim)。

捕 食 性。
分 佈：北京(百花山)。

Amblyseius (s. str.) **kaguya** Ehara 香山鈍綏蟎 (Wu, 1987:266; Zhang, 1987[ed.] 2:96)
Amblyseius (s. str.) *kaguya* Ehara, 1966:12-14.
棲 息：毛竹、小灌木。
捕 食 性。
分 佈：江西、遼寧；日本。

Amblyseius koyamanus Ehara et Yokogawa 小島鈍綏蟎 (Xin, 1988:136; Zhu et al., 1983:181)
棲 息：水稻、禾本科植物、松。
捕 食 性。
分 佈：江西、安徽；日本。

Amblyseius largoensis (Muma) 拉戈鈍綏蟎 (ASZI, 1987, 2:786; Lo, 1970:56; Chen et al., 1979:57-60; Lin et Chen, 1984:126; Pan et Teng, 1980:131; Wu, 1980(3):41; Wu et al., 1991:88; Xin, 1988:131)
Amblyseiopsis largoensis Muma, 1955:
=*Amblyseius neolargoensis* Van der Merwe, 1965:
棲 息：米蘭、荔枝、紅毛、榴蓮、檬果、木耳、柑橘、龍眼、霍香、茉莉、木瓜、菠蘿蜜、咖啡、橡膠、木槿、柚、苦楝等。
捕 食：*Tetranychus* (s. str.) *urticae* Koch 二點葉蟎
Eotetranychus SP. Panonychus citri (McGregor) 橘全爪蟎
荔枝癭蟎。
分 佈：台灣，海南、廣東；日本、菲律賓、泰國、以色列、新西蘭、巴西、瓜地馬拉、墨西哥、美國、加拿大。

Amblyseius (s. str.) **leigongshanensis** Wu et Lan 雷公山鈍綏蟎 (Wu et Lan, 1989:250; 1992:693)
Amblyseius (s. str.) *leigongshanensis* Wu et Lan, 1989:250.
棲 息：竹。
捕 食 性。
分 佈：貴州(雷公山)。

Amblyseius lianshanus Zhu et Chen 連山鈍綏蟎 (Zeng, et al., 1991:130)
棲 息：樟、甜櫧栲。
捕 食 性。
分 佈：江西、廣西。

Amblyseius (s. str.) **liturivorus** Ehara 木瓜鈍綏蟎 (Tseng, 1983:54)
Amblyseius (*Indoseiulus*) *liturivorus* Ehara,1982:42-45.
棲 息：*Carica papaya*. 木瓜。
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Amblyseius longicervix Liang et Ke 長頸鈍綏蟎 (Liang et Ke, 1983:164)

Amblyseius longicervix Liang et Ke, 2983:164-165.

棲 息：柚、橡膠樹。

捕 食 性。

分 佈：雲南(景洪)。

Amblyseius (s. str.) **longisiphonulus** Wu et Lan 長管鈍綏蟎 (Wu et Lan, 1989:248; 1992:693)

Amblyseius (s. str.) *longisiphonulus* Wu et Lan, 1989:248.

棲 息：雜草。

捕 食 性。

分 佈：貴州(雷公山)。

Amblyseius (s. str.) **longispinosus** (Evans) 長毛鈍綏蟎 (ASZI, 1987, 2:789; Chang et al., 1993:240; Chao et Lo, 1972:191-192; Deng et al., 1989:181; Ho et al., 1994:550-551; Hua et Chang, 1994:555; Lin et Chen, 1984:126; Lo, 1986:31-39; Lo et Chao, 1971:185-186; 1973:177; He et al., 1996(4):33; Hou et al., 1996, 18(1):29-33; Hua, 1999:137-150; Lo, 19 :703-709; Lo et Ho, 1970:193; 1979:237-250; Lo et Tseng, 1980:441; Lo, Tseng et Ho, 1984:406-417; Lo et al. 1979: ; Lo et al., 1981:287-288; Lo et al., 1984:342; Pan et Teng, 1980:130; Su et al., 1986:37; Tseng. 1975:445; 1976:125; 1983:57; Tseng et Lo, 1982:291; Wen et Lee, 1981:134; Wu, 1980(3):45; Wu, 1981:205; Xin, 1988:133; Yeh et al., 2000, (4):335-345; Zeng, et al., 1991:129; Zhang et al., 1996, 22(5):11-13; Zhang et al., 1996, 23(3):287-288)

Typhlodromus longispinsous Evans, 1952:413.

別 名：*長刺鈍綏*蟎。

棲 息：草莓、木瓜、木薯、黃泡、构、木茨(*Manihot esculenta* Crantz)。

捕 食：*Thrips palmi* Karny 棕櫚黃薊馬
Brevipalpus obovatus Donn. 卵形短鬚蟎(蒲葵)
Eotetranychus sp.
Oligonuchus sp.
Panonychus citri (McGreger) 橘全爪蟎
Tetranychus cinnabarinus Boisduval 朱砂葉(木瓜)
Tetranychus cordylinicolus Lo 葉蟎
Tetranychus cucurbitae Rahm. et Punj. 瓜葉蟎
Tetranychus hydrangeae Prichard. et Baker. 繡球葉蟎
Tetranychus kanzawai (Kishida) 神澤葉蟎
Tetranychus piercei McGreger 皮氏葉蟎
Tetranychus truncatus Etr. 截形葉蟎
Tetranychus (s. str.) *urticae* (Koch) 二點葉蟎(草莓、冬瓜)。

分 佈：臺灣、福建、江西、海南、廣東、香港、廣西、雲南；日本、菲律賓、馬來亞、泰國、印度、印尼、夏威夷、澳洲、新西蘭。

Amblyseius longiverticalis Liang et Ke 長頂毛鈍綏蟎 (Liang et Ke, 1983:167)

Amblyseius longiverticalis Liang et Ke, 1983:167-168.

棲 息：滇楊(*Populus yunnanensis*)、鐵線蓮(*Clematis florida*)

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Amblyseius longshengensis Zeng et al. 龍勝鈍綏蟎 (Zeng, et al., 1991:130)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：廣西。

Amblyseius loni Muma et Denmark 尼氏鈍綏蟎 (Lin et al., 1994:93)

棲 息：觀賞植物。

捕 食：*Pseudaulacaspis cockerelli* Cooley 考氏白盾蚧。

分 佈：廣東。

Amblyseius lushanensis Zhu et Chen 廬山鈍綏蟎 (Zhang, 1987[ed.] 2:96; Zhu et Chen, 1985:273)

Amblyseius lushanensis Zhu et Chen, 1985:273-274.

棲 息：雜草。

捕 食 性。

分 佈：江西(廬山、井崗山、武夷山)。

Amblyseius (s. str.) **maai** Tseng 馬氏鈍綏蟎 (Chang et Shih, 1981:288; Chang et Tseng, 1978:340; Ho, 1989:117; Ho et Chen, 2001:321-328; Tseng, 1975:445; 1976:123; Wu, 1980(3):50)

Amblyseius (s. str.) *maai* Tseng, 1975:445.

Amblyseius maai Tseng, 1976:123-125.

棲 息：柑橘、柚子、龍眼、荔枝、番荔枝、木瓜、鳳梨、香蕉、桑、甘蔗、一種牛膝、*Achyranthes obtusidokia.*

捕 食：*Tetranychus kanzawai* Ehara 神澤氏葉蟎。

分 佈：臺灣。

Amblyseius magnus Wu 大螯鈍綏蟎 (Wu, 1987:261)

Amblyseius magnus Wu, 1987:261-262.

棲 息：松樹。

捕 食 性。

分 佈：黑龍江(寧安縣、牡丹江市)。

Amblyseius makuwa Ehara 真桑鈍綏蟎 (ASZI, 1987, 2:790; He, et al., 1991:142; Hun., 1992:1363; Lin et al., 1991:90; Pu et al., 1990:355-358; Pu et al., 1991:111-114; Tseng, 1983:52; Wei et al., 1989 51-55; Wei, et al., 1991:133; Wu et Lan, 1992:693; Wu et al., 1991:89; 147; Xin, 1988: 137; Zhang, 1987[ed.] 2:94; Zeng, et al., 1991:129; Zhou et al., 1988:107)

Amblyseius (s. str.) *makuwa* Ehara, 1972:154-156.

棲 息：柑橘、葡萄、茶、水稻、大豆、野莧菜、菜心、南瓜、蔥、甘薯、煙草、紫蘇、風輪菜、龍葵、野艾、辣蓼、喇叭花、黃麻、烏飯樹、构樹、杉樹、牛膝、雜草。

捕 食：*Panonychus citri* (McGregor) 柑橘全爪蟎

稻害蟎。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、江蘇、上海、湖北、甘肅、遼寧、吉林、黑龍江；日本。

Amblyseius (Kampimodromus) maritimus Ehara 海岸鈍綏蟎 (Deng et al., 1989:206; Xin, 1988:144; Zhu et Chen, 1983:183)

別 名：*海濱鈍綏蟎*。

棲 息：白櫟、玫瑰、桃、辣椒、艾。

捕 食 性。
分 佈：江西、廣東、山東；日本。

Amblyseius mcmurtryi Muma 麥氏鈍綏蟎 (Wu, 1980(3):48)

Amblyseius mcmurtryi Muma, 1967:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：廣東；印度。

Amblyseius (s. str.) **monomacroseta** Tseng 單大毛鈍綏蟎 (Chang et Tseng, 1978:340; Tseng, 1975:445; 1876:121; Wu, 1980(3):50)

Amblyseius monomacroseta Tseng, 1975:445.
Amblyseius monomacroseta Tseng, 1976:121-123.
棲 息：鳳梨、人心果。
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Amblyseius (Paraphytoseius) multidentatus Swirski et Shechter 多齒鈍綏蟎 (ASZI, 1987, 2:796; Deng et al., 1989:207; Lin et al., 1991:90; Qi, 1981(1-2):59; Su et al., 1986:37; Wu, 1980(3):48; Wu, 1981:205; Xin, 1988:145; Zhang, 1987[ed.] 2:95)

棲 息：山莓、楓樹、喜樹、葛藤、梵天花、香茶葉、柑橘、羊蹄甲；豇豆、絲瓜、南瓜、茄、野葵、馬鞭草、菠蘿蜜、大紅花、枸樹、算盤子。
捕 食：*Panonychus citri* (McGregor) 柑橘全爪蟎
葉蟎。
分 佈：福建、江西、廣東、香港、海南、廣西、雲南、貴州；日本、泰國、馬達加斯加、剛果等地。

Amblyseius (s. str.) **multiporus** Wu et Li 多孔鈍綏蟎 (Wu et Li, 1987:376)

Amblyseius (s. str.) *multiporus* Wu et Li, 1987:376-377.
棲 息：柳樹。
捕 食 性。
分 佈：新疆(奎屯)。

Amblyseius neoreticuloides Liang et Hu 新小皺鈍綏蟎 (Liang et Hu, 1988:317)

Amblyseius neoreticuloides Liang et Hu, 1988:317.
棲 息：榆。
捕 食 性。
分 佈：寧夏(銀川)。

Amblyseius (s. str.) **newsami** (Evans) 紐氏鈍綏蟎 (ASZI, 1987, 2:785; Chen et al., 1993:125; Deng, et. al.,

1989:197; He et al., 1996(4):33; Huang, 1990[ed.]:228; Kwangtung, EI., 1978:260-270; Lin et Chen, 1984:126; Lin et Zheng, 1981(3):31-33; Lin et al., 1991:90; Mai et al., 1979:52-56; Pan et Teng, 1980:131; Qi, 1981(1-2):59; Su et al., 1986:38; Tseng, 1983:44-45; Wu, 1980(3):39; Wu, 1981:205; Wu et al., 1991:88; Xia, 1989:27-38; Xia, 1989:27-39; Xia, 1989, 9(2):174-181; Xin, 1988:130; Zeng, et al., 1991:130; Zhi, et al., 1991:128)

Typhlodromus newsami Evans, 1953:450.

Amblyseius (s. str.) *newsami,* Ehara, 1966:24.

棲 息：柑橘、荔枝、龍眼、楊桃、棗、木瓜、橡膠、絲瓜、節瓜、水瓜、豆角、棉花、黃麻、藿香薊、豇豆、辣椒、姜、紫蘇。

捕 食：*Panonychus citri* (McGregor) 橘全爪蟎(桂花)

Eotetranychus sexmaculatus Riley 六點始葉蟎

Tetranychus (s. str.) *urticae* Koch 二點葉蟎。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、香港、海南、廣西、貴州、上海；日本、馬來西亞、泰國。

Amblyseius (s. str.) **nicholsi** Ehara et Lee 尼氏鈍綏蟎 (ASZI, 1987, 2:794; Chen et al., 1994, 16(2):86-89; Deng et Li, 1983:208; Deng et al., 1989:203; Ding et al., 1983:124-128; Du et Xiong, 1989:56-62; Du et al., 1987, 9(3):173-176; Du et al., 1989:46-49; Du et al., 1991:61-65; 1993:6-9; He et al., 1996(4):33; Huang et Gao, 1996:Huang, et al., 1987:133-139; Huang et al., 1989:39-45; Jiang, 1993, 15(2):78-83; Lin et al., 1991:90; Qi, 1981(1-2):59; Shi et al., 1989-90:83; Su et al., 1986:37; Tian, 1989:224-226; Tian, 1995, 11(4):153-155; Wu, 1980(3):42; 1981:205; 1982:100; Xia, 1989:27-38; Xia, 1989, 9(2):174-181; Xin, 1988:142; Xiong et al., 1988:9-14; Xiong et al., 1989:50-55; Xu et al., 1995, 17(3):12124; Zhang, 1987[ed.] 2:94; Zhang et Cao, 1993, 9(1):9-11; Zhang et Li, 1986, (1):22-24; Zhang, et al., 1991:136; Zhi et al., 1992:115-117; Zhou, et al., 1988, 4(3):106-110)

棲 息：柑橘、茶、棗、桃、桑、李、柿、石榴、油桐、荔枝、野葡萄、茶、樟、木葉黃楊、椿、龍眼、橄欖、鳳梨、苦麻菜、棕、馬桑、黃豆、烏柏、桂樹、無花果、三角楓等。

捕 食：*Brevipalpus obovatus* 卵形短鬚蟎(紫穗槐)

Eotetranychus kankitus Ehara 柑橘始葉蟎

Panonychus citri (McGregor) 橘全爪蟎

Pseudalacaspis cockerelli (Cooley) 考氏白盾蚧(白蘭)

Tetranychus cinnabarinus Boisduval 硃砂葉蟎(草莓)。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、香港、廣西、雲南、貴州、四川、江蘇、上海；泰國。

Amblyseius (s. str.) **oahuensis** Presad (Tseng, 1983:57)

Amblyseius (s. str.) *oahuensis* Presad, 1968:1518.

棲 息：西瓜。

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Amblyseius (s. str.) **obtuserellus** Wainstein et Begljarov 鈍毛鈍綏蟎 (Wu, 1980(3):44; 1982:99; Zhang, 1987[ed.] 2:95)

棲 息：柑橘、雞桑、山白菊、羅漢松、鵑木、春花小竹、芒、雜草。

捕 食 性。

分 佈：江西、廣東(四會)、日本、蘇聯。

Amblyseius ochii Ehara et Yokogawa 峰木鈍綏蟎 (Zhang, 1987[ed.] 2:94)

棲 息：杉、竹。
捕 食 性。
分 佈：江西。

Amblyseius (s. str.) **oguroi** Ehara 大黑鈍綏蟎 (Hun., 1992:1363; Wu, 1980(3):49; Wu, 1981:205; Wu et Lan, 1992:693; Xin, 1988:140; Zhang, 1987[ed.] 2:94)

Amblyseius oguri Ehara, 1964:
棲 息：梨、柿、茅莓、霍香薊、三葉木通、三角楓、榆、櫟、大葉白蠟樹。
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、遼寧、吉林(長白山)；日本。

Amblyseius okanagensis (Chant) 光滑鈍綏蟎 (Wu,. 1987:267)

Typhlodromus okanagensis Chant. 1957:293-294.
棲 息：榆樹。
捕 食 性。
分 佈：遼寧。

Amblyseius (s. str.) **okinawanus** Ehara 沖繩鈍綏蟎 (ASZI, 1987, 2:793; Lo,1970:56; Chang et Tseng, 1978:340; He, et al., 1991:142; Ho, 1989:117; Hun., 1992:1364; Lin et al., 1991:90; Pu et al., 1990:355-358; Qi, 1981(1-2):59; Su et al., 1986:38; Tseng, 1975:445; 1976:115; Wu, 1980(3):44; Wu, 1981:205; Wu et Lan, 1992:693; Wu et al., 1991:89; 149; Xin, 1988:141; Xu et al., 1996((2):23-26; Zhang, 1987[ed.] 2:95; Zeng, et al., 1991:130; Zhou et al., 1988:107)

Amblyseius (s. str.) *okinawanus* Ehara, 1967:72-75.
棲 息：柑橘、柚子、荔枝、龍眼、檬果、梨、番石榴、板栗、西紅柿、橄欖、茶、水稻、甘薯、豇豆、豌豆、角豆、萊豆、南瓜、絲瓜、節瓜、黃瓜、茄瓜、水瓜、辣椒、大豆、毛豆、芋、茄子、蒼耳、薄荷、蘿菜、劉寄奴、月季、牡荊、黃荊、一年蓬、白蘇、木槿、苦楝、樟、刺槐、三角楓、懸鈴木、羊蹄甲、牛膝、辣蓼、柳、香茶菜屬、風輪菜、玄參、野艾、土荊芥、勝紅薊、藿香薊、芒、雜草等。
捕 食：薊馬
嚙蟲
稻害蟎類
Brevipalpus obovatus Donnadieu 卵形短鬚蟎(白蘭)
Panonychus citri (McGregor) 橘全爪蟎
多種葉蟎。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、海南、廣西、貴州、雲南、浙江、江蘇；日本、蘇聯、泰國、巴布亞新幾內亞。

Amblyseius (Asperosius) omei Wu et Li 峨嵋鈍綏蟎 (Wu et Li, 1984:99)

Amblyseius (*Asperosius*) *omei* Wu et Li, 1984:99.
棲 息：菜豆。
捕 食 性。
分 佈：四川(峨嵋山)。

Amblyseius orientalis Ehara 東方鈍綏蟎 (ASZI, 1987, 2:793; Hun., 1992:1364; Wu, 1980(3):43; Wu, 1981:205; Wu et Lan, 1992:693; Wu et al., 1993, 15(1):28; Xin, 1988:139; Zeng, et al., 1991:130; Zhang, 1987[ed.] 2:95; Zhang, 1990:21-24; Zhang et al., 1992:21-24; Zhou et al., 1988:107; Zhu et Yu, 1993:226-227)

Amblyseius orientalis Ehara, 1959:290-293.

棲 息：柑橘、梨、蘋果、桃、柿、棗樹、桑、毛豆、南瓜、苦楝、樟樹、楊葎草、金銀、忍冬、杉、泡桐、柳、榆、櫟、桂花、女貞、楓楊、牡荊。

捕 食：*Eotetranychus pruni* 李始葉蟎

橘全爪蟎

Panonychus ulmi 蘋果全爪蟎

Tetranychus viennensis 山楂葉蟎

果樹上多種葉蟎。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、江蘇、上海、山東、河北、遼寧；蘇聯、日本、泰國、印度、巴布亞新幾內亞、夏威夷。

Amblyseius ornatus Liang et Ke 裝飾鈍綏蟎 (Liang et Ke, 1984:153)

Amblyseius ornatus Liang et Ke, 1984:153154.

棲 息：紫菀(*Astr* sp.)、年逢(*Erigeron annuus*)、野蒿(*Artemisia* sp.)。

捕 食 性。

分 佈：雲南(麗江、下關)、貴州(貴陽)。

Amblyseius (s. str.) **ovalis** (Evans) 卵形鈍綏蟎 (ASZI, 1987, 2:795; Lo,1970:58; Chang et Shih, 1981:288; Chang et Tseng, 1978:340; Chang et al., 1995:423-421; Ho, 1989:117; Huang et Gao, 1996:139; Liang et Ke, 1983:162; Lo, 1986:31-39; Lo et Chao, 1973:177; Shih et Wang, 1997:100-118; Tseng, 1975:445; Wu, 1980(3):46; Wu, 1981:205; Xin, 1988:143; Zhang, 1987ed.(2):94)

Typhlodromus ovalis Evans, 1953:458-461.

Amblyseius (s. str.) *ovalis,* Ehara, 1970:58.

棲 息：絲瓜、柿、梨、桃、柑橘、柚、蓮霧、番荔枝、鳳梨、詔子、桑、可可、蘋婆、橄欖、檬果、荔枝、龍眼、酪梨、楊桃、甘蔗、橡膠、山芋、苦楝、金貞、木波蘿(*Artocarpus heterophyllus*)等。

捕 食：*Tetranychus urticae* Koch 二點葉蟎、*Tetranychus* sp. 、Brevipalpus sp. 、*Oligonuchus* sp.。

分 佈：極廣，臺灣、福建、江西、廣東、香港、廣西、雲南、江蘇；琉球、菲律賓、馬來西亞、印度、印尼、毛里求斯、澳洲、新西蘭、美國、墨西哥、夏威夷。

Amblyseius (s. str.) **ovatus** (Garman) (Tseng, 1983:42)

Amblyseius ovatus Garman, 1958:78.

=*Amblyseius* (s. str.) *peltatus* Van der Merwe, 1968:119.

=*Amblyseius* (s. str.) *parapeltatus* Wu et Chou, 1981:273-274.

棲 息：雜草。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、廣東。

Amblyseius paraaerialis Muma 副空鈍綏蟎(ASZI, 1987, 2:792; Wu, 1980(3):49; Xin, 1988:139; Zeng, et al., 1991:130)

Amblyseius paraaerialis Muma, 1967:

別 名：*近空鈍綏蟎*。
棲 息：柚、楊梅、九里香、相思樹、大葉黃楊、橡膠、葛藤、檬果、荔枝、苦楝、番石榴等。
捕 食 性。
分 佈：廣東、海南、廣西、雲南；泰國、印度。

Amblyseius parapelatus Wu et Chou 擬盾鈍綏蟎 (He, et al., 1991:143; Wu et al., 1991:150)
Amblyseius parapelatus Wu et Chou, 1981:273-274.
棲 息：水稻(海南)、茶、藿香薊。
捕 食：稻害蟎類。
分 佈：福建、海南。

Amblyseius (s. str.) **pascalis** Tseng (Tseng, 1983:36)
Amblyseius (s. str.) *pascalis* Tseng, 1983:36-38.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Amblyseius peltatus Merwe 盾鈍綏蟎 (Zeng, et al., 1991:129)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：廣西。

Amblyseius (s. str.) **pseudolongispinosus** Xin, Liang et Ke 擬長刺鈍綏蟎 (Deng et al., 1989:199; He, et al., 1991:143; Hun., 1992:1364; Lin et al., 1991:90; Wang et Gao, 1995, 11(2):64-67; Wu et al., 1991:88; 1993, 15(1):29; Xin, 1988:133; Yan et Duan, 1988, 15(1):23-27; Zeng, et al., 1991:129; Zhou et Zhang, 1989:182-186; Zhou et Zhang, 1989:153-156; Zhao et al., 1993, 3(2):10-15; Zou et al., 1986, 8(3):137-141)
Amblyseius pseudolongispinosus Xin, Liang et Ke, 1981:75-80.
別 名：*擬長毛鈍綏蟎*。
棲 息：柑橘、荔枝、蘋果、香蕉、桑、水稻、棉花、玉米、黃麻、榆、月季、側柏、茄子、豇豆、大豆、豆角、綠豆、絲瓜、節瓜、白瓜、南瓜、冬瓜、水瓜、側楊、刺柏、柳、牛藤、枸、葎草、一年蓬、相思樹、大葉千斤拔、細葉益母草、白蘇、三色莧、月季。
捕 食：本種能捕食 7 屬 16 種葉蟎
Bryobia oristata (Duges) 冠狀苔蟎
Chinotetranychus firmianae (Ma et Yuan) 梧桐中葉蟎
Eotetranychus boreus Ehara 北始葉蟎
Eotetranychus broussonetiae Wang 构始葉蟎
Eotetranychus hicoriae (McGregor) 核桃始葉蟎
Eotetranychus suginamensis (Yokoyama) 桑始葉蟎
Oligonychus perditus Pritchard et Baker 柏小爪蟎
Oligonychus pratensis (Banks) 草地小爪蟎
Panonychus citri (McGregor) 柑橘全爪蟎

Schizotetranychus bambusae Rech 竹裂爪蟎
Schizotetranychus nanjingensis (Ma et Yuan) 南京裂爪蟎
Tetranychus cinnabarinus (Boisduval) 朱砂葉蟎
Tetranychus hydrangeae Prichard et Baker 繡球葉蟎
Tetranychus phaselus Ehara 豆葉蟎
Tetranychus truncatus Ehara 截形葉蟎
Tetranychus urticae Koch 二點葉蟎。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、陝西、山東、山西、河北、遼寧、吉林。

Amblyseius (s. str.) **pubes** Tseng 軟毛鈍綏蟎 (Chang et Tseng, 1978:340; Tseng, 1975:445; 1976:117; Wu, 1980(3):50)

Amblyseius pubes Tseng, 1975:445.
Amblyseius (s. str.) *pubes* Tseng, 1976:117-118.
棲 息：茉莉、可可椰子。
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Amblyseius (s. str.) **putmani** (Chant) 卜氏鈍綏蟎 (Zhu et Chen, 1983:184; Zhang, 1987[ed.] 2:95)

棲 息：桃、薄荷。
捕 食 性。
分 佈：江西；加拿大。

Amblyseius (s. str.) **quaesitus** Wainstein et Beglyarov 刻紋鈍綏蟎 (Liang et Lao, 1994:372)

棲 息：天目槭。
捕 食 性。
分 佈：浙江(天目山)。

Amblyseius qiuerci Liang et Ke 櫟鈍綏蟎 (Liang et Ke, 1983:168)

Amblyseius qiuerci Liang et Ke, 1983:168-169.
棲 息：櫟樹。
捕 食 性。
分 佈：吉林(長白山)。

Amblyseius (s. str.) **rademacheri** Dosse 拉豆鈍綏蟎 (Zhang, 1987[ed.] 2:95; Zhu et Chen, 1983:182)

Amblyseius (s. str.) *rademacheri* Dosse
棲 息：蘋果、大豆、菊科植物、茜草、苧麻、楦麻、竹、芒、雜草等。
捕 食 性。
分 佈：江西；日本、蘇聯、德國。

Amblyseius (s. str.) **repletus** Wang et Li 充滿純綏蟎 (Wang et Li, 1985:268)

Amblyseius (s. str.) *repletus* Wang et Li, 1985:268-269.
棲 息：李、野葡萄、漆樹。

捕 食 性。
分 佈：湖北(神農架)。

Amblyseius ricini (Ghai et Menon) 蓖麻鈍綏蟎 (Xin, 1988:145)
棲 息：蓖麻、狼毒、木薯、槐樹等。
捕 食 性。
分 佈：雲南、江蘇等。

Amblyseius (s. str.) **ruiliensis** Wu et Li 瑞麗鈍綏蟎 (Wu et Lan, 1992:694; Wu et Li, 1985:270)
Amblyseius (s. str.) *ruiliensis* Wang et Li, 1985:270-271.
棲 息：李、野葡萄。
捕 食 性。
分 佈：福建、雲南(瑞麗縣)、湖北。

Amblyseius (s. str.) **sacharus** Wu 芒草鈍綏蟎 (Hun. 1992:1365; Wu, 1981:209; Wu et Lan, 1992:694)
Amblyseius (s. str.) *sacharus* Wu, 1981:209.
棲 息：小灌木、芒草、雜草等。
捕 食 性。
分 佈：福建(大竹嵐)、江西、湖南、廣東、廣西。

Amblyseius sacchari Liang et Ke 甘蔗鈍綏蟎 (Liang et Ke, 1983:165)
Amblyseius sacchari Liang et Ke, 1983:165-166.
棲 息：甘蔗。
捕 食 性。
分 佈：福建(龍溪)、廣西(合浦)。

Amblyseius (s. str.) **salebrosus** (Chant) 粗糙鈍綏蟎 (Dang et al., 1989:202; Wu, 1980(3):50; Xin, 1988:134)
=*Phytoscutus taoi* Lo, 1970:
棲 息：柑橘、桑。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、廣東；泰國、印度、美國。

Amblyseius sangangensis Zhu et Chen 三港鈍綏蟎 (Zhang, 1987[ed.] 2:96; Zhu et Chen, 1983:384)
Amblyseius sangangensis Zhu et Chen, 1983:384-385.
棲 息：春花小竹(*Phyllostachys nidularia* Munro)。
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山)。

Amblyseius (s. str.) **seconbaraki Lin** 貝氏鈍綏蟎 (Tseng, 1983:58; Wu, 1986:121; Wu et al., 1991:147)
Amblyseius baraki Athias-Henriot, 1966:211.
Amblyseius seconbaarkeri Lin, 2002:250. (nen name for *A.* (s. str.) *barlero* Athias-Henriot, 1966:211, *nec* Hughes, 1948)
棲 息：水稻、玉米、草等單子葉植物的葉鞘。

捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建；泰國、阿爾及利亞。

Amblyseius (s. str.) **shiheziensis** Wu et Li 石河子鈍綏蟎 (Wu et Li, 1987:375)
Amblyseius (s. str.) *shiheziensis* Wu et Li, 1987:375-376.
棲 息：小麥。
捕 食 性。
分 佈：新疆(石河子)。

Amblyseius siaki Ehara et Lee 塞氏鈍綏蟎 (Wu, 1980(3):50)
Amblyseius siaki Ehara et Lee, 1971:
棲 息：野生菊。
捕 食 性。
分 佈：香港。

Amblyseius (s. str.) **sichuanensis** Wu et Li 四川鈍綏蟎 (Wu et Li, 1985:341)
Amblyseius (s. str.) *sichuanensis* Wu et Li, 1985:341.
棲 息：菊屬一種。
捕 食 性。
分 佈：四川(峨嵋山)。

Amblyseius similiovalis Liang et Ke 類卵鈍綏蟎 (Liang et Ke, 1983:163)
Amblyseius similiovalis Liang et Ke,1983:163-164.
棲 息：洋槐、橡膠樹、荔枝。
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Amblyseius sinuatus Chu et Shen 合歡鈍綏蟎 (Zhang, 1987[ed.] 2:94)
棲 息：小金合歡。
捕 食 性。
分 佈：江西。

Amblyseius spineus Tseng 刺鈍綏蟎 (Tseng, 1975:445; 1976:118; Wu, 1980(3):50)
Amblyseius spineus Tseng, 1975:445.
Amblyseius spinens Tseng, 1976:118-121.
棲 息：葡萄。
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Amblyseius (s. str.) **striatus** Wu 條紋鈍綏蟎 (Wu, 1983:267; Wu et al., 1993, 15(1):29)
Amblyseius (s. str.) *striatus* Wu, 1983:267-268.
棲 息：蘋果樹。
捕 食 性。

分 佈：山東(萊陽)。

Amblyseius subjianus Zeng et al. 似江鈍綏蟎 (Zeng, et al., 1991:130)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：廣西。

Amblyseius (s. str.) **subplebeius** Wu et Li 擬普通鈍綏蟎 (Deng et al., 1989:205; Wu et Li, 1984:46)

棲 息：蘋果、核桃、棘樹、大豆、栓皮櫟。

捕 食：葉蟎。

分 佈：湖北、河南。

Amblyseius subreticulatus Wu 擬網紋鈍綏蟎 (Wu, 1987:264)

Amblyseius subreticulatus Wu, 1987:264-266.

棲 息：柑橘、梨、艾、草。

捕 食 性。

分 佈：江西、新疆、遼寧、吉林、黑龍江。

Amblyseius (Paraphytoseius) subtropicus Tseng 亞熱鈍綏蟎 (Chang et Tseng, 1978:341; Tseng, 1971:1-3; 1976:105; Wu, 1980(3):50)

Amblyseius (*Paraphytoseius*) *subtropicus* Tseng, 1972:1-3.

棲 息：枇杷。

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Amblyseius sullivani Schicha et Elshafie 蘇氏鈍綏蟎 (Zeng, et al., 1991:129)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：廣西。

Amblyseius syzygii Gupta 丁香鈍綏蟎 (Xin, 1988:141)

棲 息：玉米、風輪菜、蕨、橡膠、苦楝、茶、沙梨等。

捕 食 性。

分 佈：廣東、海南、雲南。

Amblyseius (s. str.) **taiwanicus** Ehara 臺灣鈍綏蟎 (Chang et Tseng, 1978:341; Deng et al., 1989:181; He, et al., 1991:143; Lo et Ho, 1979:251-259; 1980:6; Lo et al., 1979: ; Tseng, 1976:125; Wu, 1980(3):50; Zeng, et al., 1991:129)

Amblyseius (s. str.) *taiwanicus* Ehara, 1970:56-58.

棲 息：水稻、鳳梨。

捕 食：*Stenotarsonemus spinki* Smily 斯氏狹跗線蟎(稻跗線蟎)
多種跗線蟎。

分 佈：臺灣、廣西。

Amblyseius (s. str.) **taoi** Lo 陶氏鈍綏蟎 (Tseng, 1976:126)

Phytoseulus taoi Lo, 1970:49-52.
Amblyseius (s. str.) *taoi,* Tseng, 1976:126.
棲 息：柑橘。
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Amblyseius (s. str.) **theae** Wu 茶鈍綏蟎 (Wu et Qian, 1983:263)

Amblyseius (s. str.) *theae* Wu, 1983:263.
棲 息：茶。
捕 食 性。
分 佈：江西(九連山)。

Amblyseius (s. str.) **tianmuensis** Liang et Lao 天目鈍綏蟎 (Liang et Lao, 1994:370)

Amblyseius (s. str.) *tianmuensis* Liang, et Lao, 1994:370.
棲 息：短柄枹。
捕 食 性。
分 佈：浙江(天目山)。

Amblyseius tibetasalicis Wu 藏柳鈍綏蟎 (Wu et al., 1993, 15(1):29)

Amblyseius tibetasalicis Wu, 1987:358-359.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：西藏(亞東)。

Amblyseius (s. str.) **tienhsainensis** Tseng (Tseng, 1983:46)

Amblyseius (s. str.) *tienhsainensis* Tseng, 1983:46.
棲 息：花。
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Amblyseius (s. str.) **trisetosus** Tseng (Tseng, 1983:49)

Amblyseius (s. str.) *trisetosus* Tseng, 1983:49.
棲 息：litter(爛葉)。
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Amblyseius tsugawai Ehara 津川鈍綏蟎 (ASZI, 1987, 2:791; He, et al., 1991:143; Hun., 1992:1365; Wu, 1980(3):49; Wu et Lan, 1992:694; Wu et al., 1991:89; 1993, 15(1):29; 146; Xin, 1988: 138; Zhang, 1987[ed.] 2:95; Zeng, et al., 1991:130; Zhou et al., 1988:107)

Amblyseius tsugawai Ehara, 1959:290-291.
棲 息：柑橘、橄欖、葡萄、橄欖、西番蓮、柿、桑、水稻、甘蔗、玉米、棉花、大豆、綠豆、花生、絲瓜、苦瓜、黃瓜、辣椒、蕹菜、莧菜、甘薯、棉、玉蘭、鴨舌草、茄子、野艾、山芋、毛豆、野莧菜、榆、芒、肖梵天花、紅花草、

鼠尾草、辣蓼、游草、芒、雜草。
捕 食：*Stenotarsonemus spinki* Smily 斯氏狹跗線蟎(稻跗線蟎)
蚜蟲
薊馬
葉蟎屬。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、江蘇、上海、山東、北京、遼寧、吉林、黑龍江；日本。

Amblyseius womersleyi 無氏鈍綏蟎 (Lo, 1997:61; Lo et Chen, 1995:370)
Amblyseius womersleyi
別 名：*溫氏捕植蟎*。
棲 息：釋放於草莓、茶、玫瑰等作物上。
捕 食：*Tetranychus kanzawai* 神澤葉蟎
Tetranychus urticae 二點葉蟎。
分 佈：臺灣。

Amblyseius utilis (Liang et Ke) 有益真綏蟎 (Wu et al., 1993, 15(1):30)
Amblyseius utilis Liang et Ke, 1983:169-170.
棲 息：蘋果。
捕 食 性。
分 佈：北京。

Amblyseius (s. str.) **vestificus** Tseng 罩鈍綏蟎 (Tseng, 1975:445; 1976:113; Wu, 1980(3):50)
Amblyseius (s. str.) *vestibicus* Tseng, 1976:113-115.
棲 息：可可椰子、榼山姜及一種破布木屬。
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Amblyseius volgini Wainstein 伏爾加鈍綏蟎 (Zhang, 1987[ed.] 2:96)
棲 息：臺灣松、扁柏。
捕 食 性。
分 佈：江西。

Amblyseius vulgaris Liang et Ke 普通鈍綏蟎 (Liang et Ke, 1983:166)
Amblyseius vulgaris Liang et Ke, 1983:166-167.
棲 息：麻櫟、菊科(一種)、油桐、梅樹。
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Amblyseius womerselyi Schicha 溫氏鈍綏蟎 (Chang et Shih, 1981:288; Ho, 1989:117; Ho et Chen, 1999:193-199; Ho et al., 1994:550-551; 1996:381-382; Lee et al., 1987:410; Lo, 1986:31-39; Lo et Lee, 1999:26; 257-264; Lo et al., 1990:169; Qi, 1981(1-2):59; Su et al., 1986:38; Tseng, 1983:54; Wen et al., 1993:303; Wu, 1980(3):45; Yeh et al., 2000, (4):335-345; Yu et Chen, 2000, (12):32; Zhang, 1987[ed.] 2:94)

Amblyseius womerselyi Schicha, 1975:106.
別 名：*溫氏捕植蟎*。
棲 息：黃麻、杉、芒、鵲木、雜草。
捕 食：*Brevipalpus obovatus* Donnadieu 卵形短須蟎(陰香)
Panonychus citri (McGregor) 柑橘葉蟎(印度棗)
Tetranychus kanzawai Kishida 神澤氏葉蟎(草莓、桑、茶)。
分 佈：臺灣、江西、廣東；西太平洋地區、澳洲。

Amblyseius wuyiensis Wu et Li 武夷鈍綏蟎 (Hun., 1992:1365; Wu et Lan, 1992:694; Wu et Li, 1983:171)
Amblyseius wuyiensis Wu et Li, 1983:171-172.
棲 息：竹、小灌木、鼠尾草等。
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、湖南。

Amblyseius xizangensis Zhu et Chen 西藏鈍綏蟎 (Zhu et Chen, 1985:204)
Amblyseius xizangensis Zhu et Chen, 1985:204.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：西藏(亞東)。

Amblyseius (s. str.) **yunnanensis** Wu 雲南鈍綏蟎 (Wu, 1984:157)
Amblyseius (s. str.) *yunnanensis* Wu, 1984:157-158.
棲 息：檬果(*Mangifera indica* Linnaeus)。
捕 食 性。
分 佈：雲南(盈江縣)。

Amblyseius spp. 捕植蟎 (Chang et Shih, 1981:288)
棲 息：桑園。
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Amblyseius sp. 捕植蟎 (Lo et Wu, 1989:182)
棲 息：柑橘。
捕 食：葉蟎。
分 佈：臺灣。

Asperoseius heveae (Oudemans) 三葉膠糙綏蟎 (Zeng, et al., 1991:130)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：廣西。

Chiliseius (s. str.) **lieni** Tseng (Tseng, 1975:445; 1976:97)
Chiliseius (*Chiliseius*) *lieni* Tseng, 1975:445; 1976:97-100.

棲 息：*Pteridium aquilinum.*
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Euseius aizawai (Ehara et Bhandhufalck) 愛澤真綏蟎 (Wu et al., 1991:86; Zeng, et al., 1991:129)
別 名：*間澤真綏蟎*。
棲 息：荔枝、木瓜、槐。
捕 食：荔枝癭蟎。
分 佈：福建、廣東、海南、廣西、雲南。

Euseius finlandicus (Oudemans) 芬蘭真綏蟎 (Wu et al., 1993, 15(1):29)
Seiulus finlandicus Oudemans, 1915:180-188.
Euseius finlandicus, Wainstein, 1962:15.
棲 息：果樹及其它木本植物上。
捕 食：葉蟎、癭蟎、花粉。
分 佈：我國北部地區；亞洲、芬蘭、歐洲、美洲等。

Euseius nicholsi (Ehara et Lee) 尼氏真綏蟎 (Hun., 1992:1360; Pu et al., 1990:355-358; Wu et al., 1991:85; Zeng, et al., 1991:129)
棲 息：荔枝、龍眼、柑橘、鳳梨、李、柿、番石榴、橄欖、桃、茶、水瓜、絲瓜、黃豆、辣椒、甘蔗、雜草、油桐、紫穗槐、刺槐、算盤子、苦楝、楓樹、柯樹、柏樹等灌木或小喬木。
捕 食：橘全爪蟎
荔枝癭蟎。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、香港、海南、廣西、貴州、雲南、四川、江蘇、湖北；泰國。

Euseius ovalis (Evans) 卵圓真綏蟎 (Hun., 1992:1361; Wu et Lan, 1992:694; Wu et al., 1991:84; Zeng, et al., 1991:129)
棲 息：柑橘、梨、桃、荔枝、龍眼、桑、西瓜、羊蹄甲、橡膠、蓖麻、苦楝、油桐、女貞、大葉相思等。
捕 食：荔枝癭蟎。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇；菲律賓、巴布亞新幾內亞、印度、毛里求斯、夏威夷、斐濟、新西蘭、墨西哥。

Euseius similiovalis (Liang et Ke) 類卵真綏蟎 (Wu et al., 1991:86)
Amblyseius similiovalis Liang et Ke, 1983:
棲 息：荔枝。
捕 食 性。
分 佈：

Euseius subplebeius (Wu et Li) 擬普通真綏蟎 (Wu et Lan, 1992:694; Wu et al., 1993, 15(1):29)

Amblyseius (s. str.) *subplebeius* Wu et Li, 1984:46-47.
Euseius subplebeius, Wu et al., 1993:29.
棲 息：蘋果、核桃、大豆、栓皮櫟。
捕 食：蘋果葉蟎。
分 佈：湖南、湖北(神農架)、河南、河北。

Euseius utilis (Liang et Ke) 有益鈍綏蟎 (Liang et Ke, 1983:169; Wu et al., 1993:30)
Amblyseius utilis Liang et Ke, 1983:169-170.
Euseius utilis, Wu et al., 1993:30.
棲 息：蘋果樹。
捕 食 性。
分 佈：北京。

Euseius wangwanus Zeng, et al. 網紋真綏蟎 (Zeng, et al., 1991:129)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：廣西。

Gnorimus chaudhrii Wu et Wang 昌德里棘蟎 (He, et al., 1991:143; Wu et Wang, 1982:134-136; Wu et al., 1991 147; Zhang et Lin, 1991, 7(4):163-165)
Gnorimus chaudhrii Wu et Wang, 1982:134-136.
棲 息：水稻、柑橘、茄瓜。
捕 食：*Stenotarsonemus spinki* Smily 斯氏狹跗線蟎(稻跗線蟎)
Tarsonemus fuzhouensis 福州跗線蟎。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東。

Indoseiulus duanensis Zeng, et al. 都安印小綏蟎 (Zeng, et al., 1991:129)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：廣西。

Indoseiulus liturivorus (Ehara) 奇異印小綏蟎 (Zeng, et al., 1991:129)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：廣西。

Iphiseius dinghuensis Wu et Qian 鼎湖伊綏蟎 (Deng et al., 1989:209; Wu et Lan, 1992:694; Wu et Li, 1983:174-175; Wu et Qian, 1982:61)
Iphiseius dinghuensis Wu et Qian, 1982:61-62.
棲 息：假柿樹、殼斗科錐屬一種。
捕 食 性。
分 佈：福建(三港)、廣東、貴州。

Iphiseius formosanus Ehara 臺灣伊綏蟎 (Tseng, 1976:101; Zhang, 1987[ed.] 2:96)

棲 息：*Calamus margaritae.*

捕 食 性。

分 佈：臺灣、江西。

Metseiulus occidentalis (Nesbitt) 西方盲走蟎 (Deng et al., 1988:97-101; Deng et al., 1990:54-58; Ho et Lo, 1996:182; Lo et Chen 1995:370; Zhang et al., 1988:105-109)

Metaseiulus occidentalis Nesbitt

棲 息：蘋果園。

捕 食：*Eotetranychus pruni* 李始葉蟎。

Tetranychus viennensis 山楂葉蟎。

分 佈：臺灣(不適高溫高濕，未立足)，甘肅；美國。中國大陸（1981 從美國引進）。

Okiseius chinensis Wu 中國沖綏蟎 (Wu et Qian, 1983:75)

Okiseius chinensis Wu, 1983:75.

棲 息：橡膠樹。

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Okiseius eharai Liang et Ke 江原沖綏蟎 (Liang et Ke, 1982:229)

Okiseius eharai Liang et Ke, 1982:229.

棲 息：艾蒿。

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Okiseius fomosanus Tseng 臺灣沖綏蟎 (Tseng, 1972:2-3; Wu et Qian, 1983:76)

Okiseius formosanus Tseng, 1972:2-3.

棲 息：*Aceria* spp. 銹蟎癭內。

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Okiseius subtropicus Ehara 亞熱帶沖綏蟎 (ASZI, 1987, 2:785; Hun., 1992:1365; Wu et Lan, 1992:694; Wu et al., 1991:90; Xin, 1988:129; Zeng, et al., 1991:130)

Okiseius subtropicus Ehara, 1967:

棲 息：柑橘、荔枝、龍眼、絲瓜、楓楊、山麻、算盤子、酢醬草等。

捕 食：荔枝癭蟎。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、浙江、上海；日本、琉球。

Paraphytoseius chihpenensis Ho et Lo (Ho et Lo, 1989:93)

Paraphytoseius chihpenensis Ho et Lo, 1989:93-94.

棲 息：*Macaranga tanarius* (L.) Muell-Arg., *Urena lobata* L.

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Paraphytoseius cracentis (Corpuz et Rimando) 纖細擬植綏蟎 (Ho et Lo, 1989:94; Hun., 1992: 1366; Wu et Lan, 1992:695; Zeng, et al., 1991: 130)

Pternoseius cracentis Corpuz et Rimando, 1966:115.

Paraphytoseius cracentis, Schicha et Corpuz-Raros, 1985:69.

棲 息：紫荊、雜草、小灌木。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、廣西、貴州、雲南；菲律賓、巴布亞新幾內亞。

Paraphytoseius hualienensis Ho et Lo 花蓮擬植綏蟎 (Ho et Lo, 1989:97)

Paraphytoseius hualienensis Ho et Lo, 1989:97-98.

棲 息：*Melastoma candidum* D. Don. (葉)。

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Paraphytoseius multidentatus Swirski et Shechter 多齒擬植綏蟎 (Chang et al., 1993:240; Ho et Lo, 1989:91; Hua et Chang, 1994:555; 1996:340-341; Hua, 1999:141; Hun., 1992:1366; Wu et Lan, 1992:695; Zeng, et al., 1991:130)

棲 息：柑橘、菠蘿蜜、南瓜、豇豆、大紅花、紫荊、羊蹄甲、雜草、小灌木。

捕 食：*Thrips palmi* Karny 棕櫚黃薊馬。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、廣西、貴州、雲南、四川；菲律賓、泰國、印度、巴基斯坦、巴布亞新幾內亞、新喀里多尼亞、尼日利亞、馬達加斯加。

Paraseiulus pinusi Zeng, et al. 馬尾松副綏蟎 (Zeng, et al., 1991:129)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：廣西。

Phytoseiulus persimilis Achais-Henriot 智利小植綏蟎 (Bai, 1989:96; Chang et al., 1990:401-407; Chen, et al., 1991:133; Deng et al., 1989:181; Dong, 1990:97-101; Dong, 1992:147; Dong et Guo, 1985, 1(1):12-15; Dong et Niu, 1987:101; 1988:1-5; 1990:59-63; 1991:10-12; Dong et al., 1986:59-62; Dong, 1988, 4(1):1-5; Dong et al., 1990, 6(2):59-63; Dong, et al., 1991:134-135; 1992, 8(3):106-109; Gao et Wang, 1995, 11(4):174-177; Guo et Dong, 1987:19-22; Guo et al., 1993, 9(4):151-155; Hao et al., 1996:411-421; Ho, 1990:133-140; 1997:59; Ho et Chen, 1999:192-199; 257-264; Ho et Lo, 1996:184; Huang, 1990[ed.]:228; Lee, et Lo, 1999:151-159; Lee et al., 1987:410; 1990:121-132; Lo, 1997:59; Lo,et Chen 1995;364; Lo et Lee, 1999:26; Wu et al. 1982:279-281; Xu et al., 1983:21-22; Yang et al., 1989:134; Yang et al., 1990:88-89; Yang, et al., 1991:132; Yu et Chen, 2000, (12):32; Zhang et al., 1996, 12(4):188-189; Zhang et al., 1996, 22(5):11-13)

=*Phytoseiulus riegeli* Dosse, Chant, 1959

=*Phytoseiulus tardi* (Lombardini), Ehara, 1966

棲 息：草莓、蔬菜、茶葉、棉花、豆角、香石竹(*Dianthus caryophyllus*)、一串紅。

捕 食：*Panonychus citri* 柑橘全爪蟎

Tetranychus cinnabarinus 朱砂葉蟎

Tetranychus kanzawai Kihide 神澤氏葉蟎

Tetranychus piercei McGregor 皮氏葉蟎

Tetranychus trancalus Ehara 截形葉蟎
Tetranychus urticae Koch 二點葉蟎。
分 佈：臺灣、江西、廣東、江蘇(國外引進)、北京。

Phytoseius (s. str.) **aleuritus** Wu 油桐植綏蟎 (Deng, et. al., 1989:193; Liang et Ke, 1981:235; Wang et Xu, 1985:74; Wu, 1981:105;, 207; Wu et al., 1993:30)
Phytoseius (s. str.) *aleuritius* Wu, 1981:207-208.
=*Phytoseius taianensis* Liang et Ke, 1981:235-236.
=*Phytoseius cotini* Wang et Xu, 1985:235-236.
別 名：*黃櫨植綏蟎，泰安植綏蟎*。
棲 息：蘋果、黃櫨 *(Coninus coggygria Scop.)*、栗樹 (*Castanea mollissima* Bl.) 紫蘇 (*Perilla* sp.)、灌木、喬木。
捕 食：葉蟎。
分 佈：福建、湖北、河南、山東(泰安)、河北。

Phytoseius breviperitremus Zeng, et al. 短溝植綏蟎 (Zeng, et al., 1991:130)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：廣西。

Phytoseius (Dubininellus) chinensis Wu et Li 中國植綏蟎 (Wu et Li, 1982:132-133)
Phytoseius (*Dubininellus*) *chinensis* Wu et Li, 1982:132-133.
棲 息：*Rhus verniciflua* Stokes 漆樹。
捕 食 性。
分 佈：福建(三港)。

Phytoseius (Dubininellus) coheni Swirski et Shechter 柯尼植綏蟎 (Chang et Tseng, 1978:341; Tseng, 1976:92)
Phytoseius (*Dubininellus*) *macropilis coheni,* Isracl, 1961:104-106.
Phytoseius (*Dubininellus*) *coheni* Swirski et Shechter, Denmark, 1966:92-95.
棲 息：柑橘、枇杷、龍眼、番石榴、巴西櫻桃、人心果、棗、桑。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、香港。

Phytoseius crinitus Swirski et Shechter 長毛植綏蟎 (Hun., 1992:1366; Qi, 1981(1-2):59; Su et al., 1986:38; Wu et Lan, 1992:695; Xin, 1988:128)
棲 息：番石榴、羊蹄甲、山毛櫸
捕 食：*Bravipalpus obovatus* Donnadieu 卵形短須蟎(小葉榕)
分 佈：湖南、廣東、香港、雲南；日本、印尼、澳洲、馬達加斯加。

Phytoseius dangdongensis Lü et Yin 丹東植綏蟎 (Lü et Yin, 1992:372)
Phytoseius dangdongensis Lü et Yin, 1992:372.
棲 息：曲柳(*Frakinus* sp.)。
捕 食 性。

分 佈：遼寧(鳳城縣鳳凰山)。

Phytoseius (Dubininellus) fujianensis Wu 閩植綏蟎 (Wu, 1981:206)

Phytoseius (*Dubininellus*) *fujianensis* Wu, 1981:206.

棲 息：*Pachyrrhizus* sp. 葛。

捕 食 性。

分 佈：福建(大竹嵐)。

Phytoseius (Dubininellus) hawaiiensis Prassad 夏威夷植綏蟎 (ASZI, 1987, 2:783; Deng, et. al., 1989:194; He, et al., 1991:143; Hun., 1992:1367; Qi, 1981(1-2):59; Su et al., 1986:38; Wu, 1981:205; Wu et Lan, 1992:695; Wu et al., 1991:89; Zeng, et al., 1991:130; Zhang, 1987[ed.] 2:95)

Phytoseius hawaiiensis Prasad, 1968:

棲 息：番石榴、荔枝、龍眼、桃、枇杷、無花果、柿、桑、茄瓜、佛手瓜、水瓜、茄瓜、絲瓜、豇豆、棉、茶葉、甘蔗、水稻、羊蹄甲、扁柏、构、紅千層、大葉黃楊、相思、楓楊、櫟、紫蘇、蒼耳、艾、竹、法國梧桐、梧桐、莧菜、蔬菜、牡荊、刺天茄、紅花地桃毛、霍香、野菊等。

捕 食：*Tetranyhus piercei* 皮氏葉蟎(藿香薊)
荔枝癭蟎。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、香港、海南、廣西、貴州、雲南；泰國、澳洲、夏威夷。

Phytoseius (s. str.) **hongkongensis** Swirski et Shechter 香港植綏蟎 (ASZI, 1987, 2:783; Deng, et al., 1989:192; Hun., 1992:1367; Tseng, 1976:87; Wu et Lan, 1992:695; Xin, 1988:127; Zeng, et al., 1991:130; Zhang, 1987[ed.] 2:96)

Phytoseius (s. str.) *hongkongensis* Swirski et Shechter, 1961:99-102.

棲 息：枇杷、草莓、山莓、莢蒾、鹽膚木、构樹、芫花、茄瓜、山毛櫸、刺槐、构樹、葎草、美洲紫苑、苦楝、枸、椿、栗。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、海南、廣西、貴州、雲南、上海、山東；日本、泰國、巴布亞新幾內亞、馬達加斯加。

Phytoseius (Dubininellus) huangi Ehara 黃氏植綏蟎 (Chang et Tseng, 1978:342; Tseng, 1975:445; Tseng, 1976:94)

Phytoseius (*Dubininellus*) *huangi* Ehara, 1970:62.

棲 息：番石榴、毛柿、石榴、葡萄、桑、*Pithecolobium dulce*

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Phytoseius huaxiensis Xin, Liang et Ke 花溪植綏蟎 (Wu et Lan, 1992:695)

棲 息：核桃、榆。

捕 食 性。

分 佈：貴州、四川。

Phytoseius (s. str.) **incisus** Wu et Li 切口植綏蟎 (Wu et Li, 1984:457; Zeng, et al., 1991:130)

Phytoseius (s. str.) *incisus* Wu et Li, 1984:457.
棲 息：梧桐。
捕 食 性。
分 佈：廣西。

Phytoseius kishii Ehara 克氏植綏蟎 (Zhang, 1987[ed.] 2:95)
棲 息：烏桕。
捕 食 性。
分 佈：江西。

Phytoseius (Dubininellus) longus Wu et Li 細長植綏蟎 (Wu et Li, 1985:396)
Phytoseius (*Dubininellus*) *longus* Wu et Li, 1985:396-397.
棲 息：算盤子。
捕 食 性。
分 佈：海南(尖峰嶺)。

Phytoseius (s. str.) **minutus** Narayanan et al. 小植綏蟎 (Tseng, 1976:89)
Phytoseius (s. str.) *minutus* Narayanan et al., 1960:391.
棲 息：*Paulownia fortunei, Achyranthes obtusifolia, Solanum* sp.
捕 食 性。
分 佈：臺灣；印度。

Phytoseius (s. str.) **mori** Xin et al. 桑植綏蟎 (Xin et al., 1983:47)
Phytoseius (s. str.) *mori* Xin et al., 1983:47-48.
棲 息：桑、瑯玡瑜。
捕 食 性。
分 佈：上海。

Phytoseius (Dubininellus) neoferox Ehara et Bhandhufalck 新猛植綏蟎 (ASZI, 1987, 2:784: Wu, 1981:205; Xin, 1988:128; Zeng, et al., 1991:130; Zhang, 1987[ed.] 2:95)
棲 息：番石榴、沙田柚、杜鵑花、山柳、三角楓、雞矢藤。
捕 食 性。
分 佈：福建、廣東、廣西、雲南；泰國。

Phytoseius (Dubininellus) nipponicus Ehara 日本植綏蟎 (ASZI, 1987, 2:784; Deng et al., 1989:196; Hun., 1992:1367; Xin, 1988: 128; Zeng, et al., 1991:130; Zhang, 1987[ed.] 2:95)
棲 息：核桃、柿、六麥菊、黃花蒿、竹、算盤子、三脈葉馬蘭、臭靈丹、千斤拔、艾、葎草、构、柳、栓皮櫟、油桐、刺榆、櫟、榛子、亡牛兒苗、鹽膚木等。
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、江蘇、上海、湖北、山東、遼寧、吉林；日本。

Phytoseius (Dubininellus) nudus Wu et Li 光滑植綏蟎 (Wu et Li, 1984:45)

Phytoseius (*Dubininellus*) *nudus* Wu et Li, 1984:45-46.

棲 息：薔薇(*Rosa* sp.)、椅楊(*Populus wilsonii* Schneid)。

捕 食 性。

分 佈：湖北(神農架)。

Phytoseius qianshanensis Liang et Ke 千山植綏蟎 (Liang et Ke, 1981:236)

Phytoseius qianshanensis Liang et Ke, 1981:236.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：遼寧(千山)。

Phytoseius (Dubininellus) rugatus Tseng (Chang et Tseng, 1978:341; Tseng, 1975:445; 1976:94)

Phytoseius (*Dubininellus*) *rugatus* Tseng, 1976:94-96.

棲 息：番石榴、棗、人心果、桑。

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Phytoseius ruidus Wu et Li 粗糙植綏蟎 (Wu et Li, 1984:460; Zeng, et al., 1991:130)

Phytoseius ruidus Wu et Li, 1984:460.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：廣西(大明山)。

Phytoseius (s. str.) **scabiosus** Xin et al. 粗皺植綏蟎 (Xin et al., 1983:46)

Phytoseius (s. str.) *scabiosus* Xin et al., 1983:46-47.

棲 息：黃豆、女貞、板栗、柳樹。

捕 食 性。

分 佈：江蘇、山東。

Phytoseius (s. str.) **shanghaiensis** Xin et al. 上海植綏蟎 (Xin et al., 1983:48)

Phytoseius (s. str.) *shanghaiensis* Xin et al., 1983:48-49.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：上海(植物園)。

Phytoseius (Dubininellus) silvaticus Wu et Li 森林植綏蟎 (Wu et Lan, 1992:695; Wu et Li, 1984:458)

Phytoseius (*Dubininellus*) *silvaticus* Wu et LI, 1984:458.
棲 息：柚木、野葡萄。
捕 食 性。
分 佈：湖北(神農架)。

Phytoseius songshanensis Wang et Xu 松山植綏蟎 (Wang et Xu, 1985:76)
Phytoseius songshanensis Wang et Xu, 1985:76.
棲 息：核桃楸 (*Juglans mandshurico* Maxim.)。
捕 食 性。
分 佈：北京。

Phytoseius (s. str.) **subtilis** Wu et Li 細小植綏蟎 (Wu et Li, 1984:99)
Phytoseius (s. str.) *subtilis* Wu et Li, 1984:99.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：

Phytoseius (Dubininellus) vaginatus Wu 帶鞘植綏蟎 (Wu, 1983:268)
Phytoseius (*Dubininellus*) *vaginatus* Wu, 1983:268-269.
棲 息：鹽膚木、竹。
捕 食 性。
分 佈：江西(井崗山、南昌梅嶺)。

Phytoseius (Pennaseius) wuxianensis Xin et al. 吳縣植綏蟎 (Xin et al., 1983:45)
Phytoseius (*Pennaseius*) *wuxianensis* Xin et al., 1983:45-46.
棲 息：柑橘。
捕 食 性。
分 佈：江蘇(吳縣)。

Phytoseius xilingensis Wang et Xu 西陵植綏蟎 (Wang et Xu, 1985:75)
Phytoseius xilingensis Wang et Xu, 1985:75.
棲 息：桑 (*Morus alba* Linnaeus)。
捕 食 性。
分 佈：河北。

Platyseiella (Noeledius) formosanus Tseng 寶島植綏蟎 (Tseng, 1976:104)
Okiseius formosanus Tseng, 1972:2-3.
Platyseiella (*Noeledius*) *formosanus* Tseng, 1976:104.
棲 息：*Morus* sp. 桑。
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Platyseiella (Noeledius) subtropicus Ehara 亞熱植綏蟎 (Tseng, 1976:102)
Okiseius subtropicus Ehara, 1967:77-78.
Platyseiella (*Neoledius*) *subtropicus,* Tseng, 1976:102-104.

棲 息：*Morus* sp. 桑。
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Shiehia multispinosa Tseng 多刺希綏蟎 (Tseng, 1975:48)
Shiehia multispinosa Tseng, 1975:48-52.
棲 息：*Acasia confuse*
捕 食 性。
分 佈：臺灣(蘭嶼)。

Typhlodromus agilis (Chaudhri) 敏捷盲走蟎 (Wu et Lan, 1994:430)
Orientiseius agilis Chaudhri, 1975:189-190.
棲 息：柚(*Citrus granlis* (Linnaeus))、梨(*Pyrus* sp.)及灌木等。
捕 食 性。
分 佈：雲南；巴基斯坦。

Typhlodromus ailanthi Wang et Xu 椿盲走蟎 (Wang et Xu, 1985:71)
棲 息：臭椿 (*Ailanthus altissiima* (Mill.) Swingle, 花曲柳 (*Fraxinus rhynchophylla* Hance)。
捕 食 性。
分 佈：北京。

Typhlodromus (Anthoseius) borealis Ehara 多孔盲走蟎 (Wu, 1988:103; Zeng, et al., 1991:129; Zhang, 1987[ed.] 2:95)
別 名：*北方盲走蟎*。
棲 息：落葉松、油茶。
捕 食 性。
分 佈：江西、廣西、遼寧、黑龍江；日本(北海道)。

Typhlodromus brevimedius Wu et al. 短中毛盲走蟎 (Wu et Lan, 1994:430)
Typhlodromus brevimedius Wu, Lan et Liu, 1991:86.
棲 息：板栗。
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山)。

Typhlodromus brisbanensis Schicha 布里斯班盲走蟎 (ASZI, 1987, 2:782; Xin, 1988:126)
棲 息：女貞、榆、側柏、西南粗糠樹、青竹、蕨、菊科的一種及薔薇屬的一種。
捕 食 性。
分 佈：雲南、貴州。

Typhlodromus cannabis Ke et Xin 大麻盲走蟎 (Ke et Xin, 1983:186; Wu et Lan, 1994:430)
Typhlodromus cannabis Ke et Xin, 1983:186-187.
棲 息：鐵線蓮屬一種、大麻、蕨菜。

捕 食 性。
分 佈：雲南、四川(峨嵋山、古藺)。

Typhlodromus caudilans Schuster 尾腺盲走蟎 (Wu et al., 1993, 15(1):30; Xin, 1988:124)
Typhlodromus caudilaus Schuster, 1959:88-90.
棲 息：蘋果、榛子、柳、榆。
捕 食 性。
分 佈：華北、黑龍江；蘇聯(阿塞拜疆)、西歐、美國、加拿大。

Typhlodromus (Anthoseius) cervix Wu et Li 頸盲走蟎 (Hun., 1992:1367; Wu, 1985:86; Wu et Li, 1984:44)
Typhlodromus (*Anthoseius*) *cervix* Wu et Li, 1984:44-45.
棲 息：蘋果、馬尾松、柳、毛竹。
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、湖南、湖北(神農架)、華北、東北；蘇聯(阿塞拜疆)、西歐、美國、加拿大、澳洲、新西蘭。

Typhlodromus (s. str.) **changi** Tseng 張氏盲走蟎 (Tseng, 1975:57)
Typhlodromus (s. str.) *changi* Tseng, 1975:57-60.
棲 息：*Areca catechu.*
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Typhlodromus (Diadromus) contiguus Chant 鄰近盲走蟎 (Deng, et al., 1989:187; Xin, 1988:122; Zeng, et al., 1991:129)
棲 息：柑橘、檬果、柳樹。
捕 食 性。
分 佈：廣東、香港、廣西；日本、菲律賓、馬達加斯加。

Typhlodromus (Anthoseius) coryphus Wu 頭狀盲走蟎 (Wu, 1985:83)
Typhlodromus (*Anthoseius*) *coryphus* Wu, 1985:83.
棲 息：龍眼、鹽膚木、梔子。
捕 食 性。
分 佈：福建。

Typhlodromus (s. str.) **eleglidus** Tseng 長形盲走蟎 (Wu et al., 1991:91)
Typhlodromus (s. str.) *eleglidus* Tseng, 1985:
棲 息：荔枝。
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Typhlodromus euphori Zeng, et al. 龍眼盲走蟎 (Zeng, et al., 1991:129)
棲 息：龍眼。
捕 食 性。

分 佈：廣西。

Typhlodromus disopyrosi Zeng, et al. 柿盲走蟎 (Zeng, et al., 1991:129)

棲 息：柿。

捕 食 性。

分 佈：廣西。

Typhlodromus fuchuensis Zeng, et al. 富川盲走蟎 (Zeng, et al., 1991:129)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：廣西。

Typhlodromus fujianensis Wu et Liu 福建盲走蟎 (Wu et Liu, 1991:86)

Typhlodromus fujianensis Wu et Liu, 1991:86.

棲 息：樟、桂花。

捕 食 性。

分 佈：福建(武夷山)。

Typhlodromus (s. str.) **gracilentus** Tseng (Tseng, 1975:61)

Typhlodromus (s. str.) *gracilentus* Tseng, 1975:61-64.

棲 息：*Grevillea robusta.*

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Typhlodromus guangdongensis Wu et Lan 廣東盲走蟎 (Wu et Lan, 1994:428)

Typhlodromus guangdongensis Wu et Lan, 1994:428-429.

棲 息：櫟(*Quercus* sp.)。

捕 食 性。

分 佈：廣東(韶關五指山)。

Typhlodromus gulingensis Zhu 牯嶺盲走蟎 (Zhang, 1987[ed.] 2:96; Zhu, 1985:389)

Typhlodromus gulingensis Zhu, 1985:389.

棲 息：日本五葉松。

捕 食 性。

分 佈：江西(廬山)。

Typhlodromus hechiensis Zeng, et al. 河池盲走蟎 (Zeng, et al., 1991:129)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：廣西。

Typhlodromus hibiscusi Zeng, et al. 朱槿盲走蟎 (Zeng, et al., 1991:129)

棲 息：

捕 食 性。
分 佈：廣西。

Typhlodromus (Anthoseius) higoensis Ehara 肥厚盲走蟎 (Hun., 1992:1368; Lao et Liang, 1994:315; Wu et Lan, 1992:695)
Typhlodromus (*Anthoseius*) *higoensis* Ehara
棲 息：竹、白檀(*Symplocos paniculata* (Thunberg))、何首烏(*Pologonum multiforum* Thunberg)、糙葉樹(*Aphananthe aspera* (Thunberg))。
捕 食 性。
分 佈：福建、湖南、廣東、上海(佘山)；日本。

Typhlodromus hirashimai Ehara 平島盲走蟎 (Wu et Liu, 1997:153)
Typhlodromus hirashimai Ehara, 1972:140-142.
棲 息：松。
捕 食 性。
分 佈：廣東；日本。

Typhlodromus insularis Ehara 峽盲走蟎 (Zeng, et al., 1991:129; Zhang, 1987[ed.] 2:95)
棲 息：桃、木通。
捕 食 性。
分 佈：江西、廣西。

Typhlodromus (Anthoseius) intermedius Wu 中凹盲走蟎 (Wu, 1988:99)
Typhlodromus (*Anthoseius*) *intermedius* Wu, 1988:99.
棲 息：落葉松。
捕 食 性。
分 佈：吉林(長白山)。

Typhlodromus jingxiuensis Zeng et al. 金秀盲走蟎 (Zeng, et al., 1991:129)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：廣西。

Typhlodromus (s. str.) **lanyuensis** Tseng 蘭嶼盲走蟎 (Tseng, 1975:54)
Typhlodromus (s. str.) *lanyuensis* Tseng, 1975:54-57.
棲 息：雜草。
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Typhlodromus longicervix Wu et Liu 長頸盲走蟎 (Wu et Liu, 1997:149)
Typhlodromus longicervix Wu et Liu, 1997:149-150.
棲 息：馬尾松。
捕 食 性。

分 佈：廣東(韶關)。

Typhlodromus (Paraseius) loricatus (Wainstein) 甲胄盲走蟎 (Lao et Liang, 1994:315)

Typhlodromus (*Paraseius*) *loricatus* (Wainstein)
棲 息：柏樹(*Cupressus* sp.)。
捕 食 性。
分 佈：山東(泰山)。

Typhlodromus (Anthoseius) luensis Lao et Liang 魯盲走蟎 (Lao et Liang, 1994:314)

Typhlodromus (*Anthoseius*) *luensis* Lao et Liang, 1994:314-315.
棲 息：豆科植物。
捕 食 性。
分 佈：山東(泰山)。

Typhlodromus lushanensis Zhu 廬山盲走蟎 (Hun., 1992:1368; Wu et Lan, 1992:696; Zhang, 1987[ed.] 2:96; Zhu, 1985:388)

Typhlodromus lushanensis Zhu, 1985:388-389.
棲 息：側柏、小灌木。
捕 食 性。
分 佈：江西(廬山)、湖南。

Typhlodromus macroides Zhu 類瘦盲走蟎 (Zhang, 1987[ed.] 2:96; Zhu, 1985:389)

Typhlodromus macroides Zhu, 1985:389-391.
棲 息：苧麻。
捕 食 性。
分 佈：江西(廬山)。

Typhlodromus macrum Ke et Xin 瘦盲走蟎 (Ke et Xin, 1983:185)

Typhlodromus macrum Ke et Xin, 1983:185.
棲 息：雜草。
捕 食 性。
分 佈：雲南(中甸)。

Typhlodromus marinus Wu et Liu 沿海盲走蟎 (Wu et Liu, 1991:85)

Typhlodromus marinus Wu et Liu, 1991:85.
棲 息：馬尾松。
捕 食 性。
分 佈：福建、廣東。

Typhlodromus ndibu Pritchard et Baker 思迪布盲走蟎 (Xin, 1988:124)

棲 息：野蒿。
捕 食 性。
分 佈：雲南；剛果。

Typhlodromus occidentalis Nesbitt 西方盲走蟎 (ASZI, 1987, 2:797; Gao et Wang, 1995, 11(4):174-177; Lo, 1997:59; Lo et al., 1990:166-178; Wu et al., 1993, 15(1):31; Xin, 1988:147; Zhang et al., 1983, 10(3):103-108; Zhang et al., 1987, 3(3):97-101; Zhang et al., 1988, 15(2):105-109)

Typhlodromus occidentalis Nesbitt, 1951:29-30.

棲 息：蘋果。

捕 食：*Eotetranychus pruni* Oudemans 李始葉蟎

Tetranychus cinnabarinus Boisdural 朱砂葉蟎

Tetranychus vienensis Zacher 山楂葉蟎。

分 佈：江蘇、陝西、甘肅、寧夏、新疆，1981 年自美國與澳洲引進抗藥性品系；加拿大、美國、新西蘭、南非。臺灣於 1985 由美國加州大學 Hoy 博士協助引進，但未立足。

Typhlodromus pineus Wu et Li 松盲走蟎 (Hun., 1992:1368; Wu et Li, 1984:Zeng, et al., 1991:129)

棲 息：馬尾松、油桐。

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西。

Typhlodromus (Anthoseius) porus Wu 孔盲走蟎 (Wu, 1988:101)

Typhlodromus (*Anthoseius*) *porus* Wu, 1988:101.

棲 息：櫟屬一種。

捕 食 性。

分 佈：黑龍江(哈爾濱)。

Typhlodromus pyri 畸螯蟎 (Dai, 1992:41)

棲 息：茶。

捕 食：*Polyphagotarsonemus latus* 多食跗線蟎。

分 佈：四川。

Typhlodromus (Anthoseius) qianshanensis Wu 千山盲走蟎 (Wu, 1988:102)

Typhlodromus (*Anthoseius*) *qianshanensis* Wu, 1988:102.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：遼寧(千山)。

Typhlodromus quadratoides Wu et Liu 似方盲走蟎 (Wu et Liu, 1997:151)

Typhlodromus quadratoides Wu et Liu, 1997:151-152.

棲 息：蕨、小灌木。

捕 食 性。

分 佈：海南。

Typhlodromus quadratus Wu et Liu 方肛盲走蟎 (Wu et Liu, 1997:150)

Typhlodromus quadratus Wu et Liu, 1997:150-151.
棲 息：蕨、小灌木。
捕 食 性。
分 佈：海南。

Typhlodromus ribei Ke et Xin 茶藨子盲走蟎 (Ke et Xin, 1983:187)
Typhlodromus ribei Ke et Xin, 1983:187.
棲 息：茶藨子屬一種、薔薇屬一種。
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Typhlodromus ryukuensis Ehara 琉球盲走蟎 (Tseng, 1975:60; Xin, 1988:126; Zhang, 1987[ed.] 2:95)
Typhlodromus ryukuensis Ehara, 1967:69.
Typhlodromus (s. str.) *ryukuensis*, Tseng, 1975:60
棲 息：柑橘、山柳、*Calamus margaritae, Reevesia formosana, Hibiscus* sp.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、江西；琉球。

Typhlodromus (Chiliseius) separatus Wu et Li 分開盲走蟎 (Wu et Li, 1985:394)
Typhlodromus (*Chiliseius*) *separatus* Wu et Li, 1985:394-395.
棲 息：漆樹。
捕 食 性。
分 佈：海南(尖峰嶺)。

Typhlodromus (Anthoseius) serrulatus Ehara 鋸胸盲走蟎 (Chang et Tseng, 1978:342; Deng, et al., 1989:190; Hun., 1992:1368; Wu, 1985:84-85; Wu et Lan, 1992:696; Wu et al., 1993, 15(1):30; Xin, 1988: 125; Zeng, et al., 1991:129; Zhang, 1987[ed.] 2:95)
Typhlodromus (*Anthoseius*) *serrulatus* Ehara, 1972:62.
別 名：*鋸齒盲走蟎*。
棲 息：蘋果、桃、橄欖、楊梅、檬果、龍眼、獼猴桃、竹、毛藥紅淡、楓楊、木薯、小葉櫟、苦櫧、紫花杜鵑、蘇毛金合歡、土荊芥、柃木、灌木、喬木。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、湖北、山東、河北、遼寧；日本、泰國。

Typhlodromus subamirabilis Zeng, et al. 似奇盲走蟎 (Zeng, et al., 1991:129)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：廣西。

Typhlodromus (Anthoseius) subequalis Wu 約等盲走蟎 (Wu, 1988:100)
Typhlodromus (*Anthoseius*) *subequalis* Wu, 1988:100.
棲 息：柏、榆。

捕 食 性。
分 佈：黑龍江(哈爾濱)。

Typhlodromus taishanensis Wang et Xu 泰山盲走蟎 (Wang et Xu, 1985:73)
Typhlodromus taishanensis Wang et Xu, 1985:73.
棲 息：山荊子 (*Malus baccata* (Linnaeus) Borkh.
捕 食 性。
分 佈：山東(泰山)。

Typhlodromus takahashii Ehara 高橋盲走蟎 (Zhang, 1987[ed.] 2:95)
棲 息：竹。
捕 食 性。
分 佈：江西。

Typhlodromus talbi Athias-Henriot 塔氏盲走蟎 (Xin, 1988:123)
棲 息：櫻桃。
捕 食 性。
分 佈：山東；阿爾及利亞、埃及、以色列、希臘、西班牙等地。

Typhlodromus (Chiliseius) tengi Wu et Li 鄧氏盲走蟎 (Wu et Li, 1985:393)
Typhlodromus (*Chiliseius*) *tengi* Wu et Li, 1985:393-394.
棲 息：槐樹。
捕 食 性。
分 佈：海南(尖峰嶺)。

Typhlodromus (s. str.) **tridentiger** Tseng 三齒盲走蟎 (Tseng, 1975:64)
Typhlodromus (s. str.) *tridentiger* Tseng, 1975:64-67.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：臺灣(蘭嶼)。

Typhlodromus ulmi Wang et Xu 榆盲走蟎 (Wang et Xu, 1985:72)
Typhlodromus ulmi Wang et Xu, 1985:72.
棲 息：榆樹 (*Ulmus* sp.)。
捕 食 性。
分 佈：北京。

Typhlodromus vulgaris Ehara 普通盲走蟎 (ASZI, 1987, 2:782; Chen et al., 1993:125; Wu et al., 1993, 15(1):30; Xin, 1988:123; Zhang, 1987[ed.] 2:95)
Typhlodromus vulgaris Ehara, 1959:286-288.
棲 息：蘋果、桃、棗、長葉凍綠、琅玡榆、楓楊。在日本的落葉果樹、柑橘、榆等植物上發現。
捕 食：橘全爪蟎

蘋全爪蟎。

分 佈：廣東、香港、江蘇、上海、山東；日本、蘇聯(克拉斯諾達爾)。

Typhlodromus verenae Wu et Lan 馬鞭草盲走蟎 (Wu et Lan, 1994:429)

Typhlodromus verenae Wu et Lan, 1994:429-230.

棲 息：馬鞭草(*Verbena officinalis* Linnaeus)。

捕 食 性。

分 佈：廣東(深圳)。

Typhlodromus xianensis Chen et Chu 西安盲走蟎 (Wu et al., 1993, 15(1):31)

Typhlodromus xianensis Chen et Chu, 1980:11-12.

棲 息：蘋果、桑、榆、木槿、小葉黃楊。

捕 食 性。

分 佈：陝西、山東、北京。

Typhlodromus xingchengensis Wu, Lan et Zhang 興城盲走蟎 (Wu et al., 1993, 15(1)::31)

Typhlodromus xingchengensis Wu, Lan et Zhang, 1991:50-51.

棲 息：蘋果。

捕 食 性。

分 佈：遼寧(興城)。

Typhlodromus (Anthoseius) xinjiangensis Wu et Li 新疆盲走蟎 (Wu et Li, 1987:377; Wu et al., 1993, 15(1):30)

Typhlodromus (*Anthoseius*) *xinjiangensis* Wu et Li, 1987:377-378.

棲 息：蘋果、核桃、哈密瓜、柳樹。

捕 食 性。

分 佈：寧夏、新疆(庫爾勒、石河子、奎屯、于田、烏魯木齊)。

Typhlodromus xiufui Wu et Liu 修復盲走蟎 (Wu et Liu, 1997:148)

Typhlodromus xiufui Wu et Liu, 1997:148-149.

棲 息：灌木、雜草。

捕 食 性。

分 佈：寧夏。

Typhlodromus xizangensis Wu et Lan 西藏盲走蟎 (Wu et Lan, 1994:426)

Typhlodromus xizangensis Wu et Lan, 1994:426-427.

棲 息：大葉柳(*Salix* sp.)。

捕 食 性。

分 佈：西藏(日喀則)。

Typhlodromus yasumatsui Ehara 安松盲走蟎 (Wu et Liu, 1997:152)

Typhlodromus yasumatsui Ehara, 1966:11-12.

棲 息：馬尾松、茶樹、林葉樟、小灌木。

捕 食 性。
分 佈：福建、廣東、海南；朝鮮、日本。

Typhlodromus yinchuanensis Liang et Hu 銀川盲走蟎 (Liang et Hu, 1988:317)
Typhlodromus yinchuanensis Liang et Hu, 1988:317.
棲 息：側柏。
捕 食 性。
分 佈：寧夏(銀川)。

Typhlodromus zhangyensis Wang et Xu 張掖盲走蟎 (Wu et al., 1993:30)
Typhlodromus zhangyensis Wang et Xu, 1991:323-324.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅(張掖)。

Typhlodromus (Anthoseius) zhaoi Wu et Li 趙氏盲走蟎 (Wu et Li, 1983:170)
Typhlodromus (*Anthoseius*) *zhaoi* Wu et Li, 1983:170-171.
棲 息：馬尾松、毛竹。
捕 食 性。
分 佈：福建(三港)。

Otopheidomenidae 蛾蟎科

Hemipteroseius omdocis (Krantz et Khot) 印度半翅綏蟎 (Xin, 1988:148)
捕 食：棉紅蝽 *Dysdercus cingulatus.*。
分 佈：

Hemipteroseius womersleyi Evans 溫氏半翅綏蟎 (Xin, 1988:148)
捕 食：紅蝽科的 *Odontopus sexpunctatus* 。
分 佈：

Kleemannia plumigera Oudemans 老羽克蟎 (Xin, 1988:149)
棲 息：潮濕的倉庫中常發現。
捕 食 性。
分 佈：

Kleemannia plumosus (Oudemans) 羽克蟎 (Xin, 1988:149)
棲 息：在發熱大麥的潮濕表層以及倉庫地面的碎屑中大量發現。在蟻及蜜蜂巢中也發現，也在螟蛾的鼓膜上發現。
捕 食 性。
分 佈：

Otopheidomenis zalelestes (Xin, 1988:148)

寄 主：夜蛾科的 *Zale undularis*。

分 佈：全世界。

Ameroseiidae 美綏蟎科

Ameroseius curvatus Gu et al. 曲美綏蟎 (Gu et al., 1989:48)

Ameroseius curvatus Gu et al., 1989:48-49.

寄 主：子午沙鼠(*Meriones meridianus* Pallas)。

分 佈：寧夏(中寧縣)。

Ameroseius magnisetosa Ishikawa 巨毛美綏蟎 (Wang et al., 1995:85)

Ameroseius magnisetosa Ishikawa

寄 主：長爪沙鼠(*Meriones unguiculstus* (Milne-Edwards))、小毛足鼠(*Phodopus roborouskii* (Satunin)。

分 佈：寧夏；日本、蘇聯。

Ameroseius multus Gu et al. 眾美綏蟎 (Gu et al., 1989:49)

Ameroseius multus Gu et al., 1989:49-50.

寄 主：子午鼠(*Meriones meridianus* Pallas)、小家鼠(*Mus musculinus* Linnaeus)、黑線倉鼠(*Cricetulus barabensis* Pallas)。

分 佈：寧夏(中寧縣)。

Ameroseius pinicola Ishikawa 松美綏蟎 (Deng et Cui, 1992:691; Gu et al., 1989:46)

Ameroseius pinicola Ishikawa, 1972:

寄 主：錫金小家鼠(*Mus pahari* Thomas)體上，也可在昆蟲體上及松鼠巢中。

分 佈：貴州(都勻市)；日本、蘇聯。

Ameroseius plumosoides Gu et al. 擬羽美綏蟎 (Gu et al., 1989:46)

Ameroseius plumosoides Gu et al., 1989:46-47.

寄 主：黃胸鼠(*Rattus flavipectus* Milne-Edwards)。

分 佈：雲南(孟連縣)。

Neocypholaelaps indica Evans 印度蜂蟎 (Lo et Chao, 1975:449; Pan et Teng, 1980:47)

寄 主：意大利蜂 (*Apis mellifera*)、花粉，藉蜜蜂遷散覓食。

分 佈：台灣、江西、廣東、廣西、四川；斯里蘭卡。

Podocinidae 足角蟎科

Podocinum anhuense Wen 安徽足角蟎

Podocinum anhuense Wen, 1965:

寄 主：

分 佈：安徽。

Podocinum changchunense Liang 長春足角蟎 (Liang, 1993:58)

Podocinum changchunense Liang, 1993:58-59.

寄 主：

分 佈：吉林(長春)。

Podocinum hainanense Liang 海南足角蟎 (Liang, 1993:59)

Podocinum hainanense Liang, 1993:59-60.

寄 主：

分 佈：海南(尖峰嶺)。

Podocinum jiangenglingense Liang 尖峰嶺足角蟎 (Liang, 1993:56)

Podocinum jiangenglingense Liang, 1993:56-57.

寄 主：

分 佈：海南(尖峰嶺)。

Podocinum pacificum Berlese 太平洋足角蟎 (Liang, 1993:54)

Podocinum pacificum Berlese, 1886:

寄 主：

分 佈：江蘇(蘇州)；朝鮮、日本、印度、亞洲、歐洲、非洲、澳洲、北美、南美。

Podocinum sagax (Berlese) 跚感足角蟎 (Liang, 1993:55)

Podocinum sagax (Berlese)

寄 主：

分 佈：湖南(長沙)、江蘇(蘇州)；印尼、意大利、墨西哥、波多黎各、危地馬拉、牙賣加、阿根廷。

Podocinum tianmuense Liang 天目足角蟎 (Liang, 1993:57)

Podocinum tianmuense Liang, 1993:57-58.

寄 主：

分 佈：浙江臨安(天目山)。

Eviphididae 真伊蟎科

Alliphis sp.

寄 主：蜣螂(第二若蟎及成蟎)。

分 佈：

Copriphis sp.

寄 主：蜣螂(第二若蟎及成蟎)。

分 佈：

Eviphis cryptognathus Gu et Bai 隱顎猶伊蟎 (Gu et Bai, 1990:449)

Eviphis cryptognathus Gu et Bai, 1990:449-451.

寄 主：*Scarabaeus typhon* Fischer 蜣螂。
分 佈：寧夏(中寧縣)。

Eviphis dalianensis Sun et al. 大達獪伊蟎 (Sun et al., 1992:435)
Eviphis dalianensis Sun et al., 1992:435-437.
寄 主：獨角仙(Dynastidae)。
分 佈：遼寧(大連市)。

Eviphis himalayaensis Ma et Piao 喜馬拉雅獪伊蟎 (Ma et Piao, 1981:147)
Eviphis himalayaensis Ma et Piao, 1981:147.
寄 主：喜馬拉雅旱獺 (*Marmota himalayana* Hodgson)
田鼠 (*Microtus* sp.)。
分 佈：青海、甘肅。

Eviphis huainanensis Wen 淮南獪伊蟎 (Gu et al., 1993:255)
Eviphis huainanensis Wen, 1965:243.
寄 主：蜣螂體上、黑線姬鼠(*Apodemus agratius*)、灰麝鼩(*Crocidura attenuata*)。
分 佈：雲南、貴州。

Eviphis nanchongensis Zhu et al. 南充獪伊蟎 (Zhu et al., 1990:445)
Eviphis nanchongensis Zhu et al., 1990:445-446.
寄 主：
分 佈：四川(南充縣)。

Eviphis ruoergaiensis Zhu et al. 若爾蓋獪伊蟎 (Zhu et al., 1990:445)
Eviphis ruoergaiensis Zhu et al., 1990:445.
寄 主：中華鼢鼠(*Myospalax fontanieri*)。
分 佈：四川(阿壩州若爾蓋縣)。

Eviphis wanglangensis Zhu et al. 王朗獪伊蟎 (Zhu et al., 1990:446)
Eviphis wanglangensis Zhu et al., 1990:446-447.
寄 主：高山姬鼠(*Apodemus chevrieri*)、洮州絨鼠(*Eothenomys eva*)。
分 佈：四川(王朗自然保護區)。

Iphidosoma fimetarium (Muller) 糞堅體蟎 (Liu et Gu, 1992:494)
Iphidosoma fimetarium (Muller, 1859)
寄 主：蜣螂。
分 佈：青海(瑪沁縣)。

Scarabaspis goulouensis Liu et al. 果洛蜣盾蟎 (Liu et al., 1992:431)
Scarabaspis goulouensis Liu et al., 1992:431-433.
寄 主：蜣螂體上。
分 佈：青海(達日縣)。

Scarabaspis sp.
寄 主：蜣螂(第二若蟎及成蟎)。
分 佈：

Macrochelidae 巨螯蟎科

Gamasholaspis sinicus Yin et al. 中國革板蟎 (Pan et Teng, 1980:128)
寄 主：棕背鼫、花鼠。
分 佈：吉林。

Macrocheles bombycis Kishida 家蠶巨螯蟎 (Xin, 1988:151)
寄 主：家蠶等。
分 佈：全國養蠶地區。

Macrocheles decoloratus (C. L. Koch) 褐色巨螯蟎 (Pan et Teng, 1980)
寄 主：達烏爾黃鼠、黑線倉鼠、狹顱田鼠、背紋毛蹠鼠。
分 佈：內蒙古、黑龍江；蘇聯、及歐洲一些國家。

Macrocheles glaber (Müller) 光滑巨螯蟎 (Deng et Cui, 1992:690; Deng et al., 1989:60; Pan et Teng, 1980:127; Xin, 1988:150)
寄 主：雞窩、羊圈、污水溝旁磚下；在獨角仙科 Dynastidae 昆蟲體上亦發現。
分 佈：貴州、河北、青海、遼寧、黑龍江；蘇聯、歐洲。

Macrocheles matrius (Hull) 宮卵巨螯蟎 (Pan et Teng, 1980:125)
寄 主：布氏田鼠、長爪沙鼠、達烏爾黃鼠、大林姬鼠。
分 佈：內蒙古、吉林、黑龍江；蘇聯及歐洲。

Macrocheles merdarius (Berlese) 糞巨螯蟎 (Pan et Teng, 1980:124)
寄 主：羊糞。
分 佈：河北；蘇聯、歐洲一些國家。

Macrocheles muscaedomesticae (Scopoli) 家蠅巨螯蟎 (Deng et Cui, 1992:690; Deng et al., 1989:59; Ho, 1989:181-187; Lo, 1996:104; Pan et Teng, 1980:127; Xin, 1988:150; Xue, 1984: ;Xue et Zhang, 1986:383-387)
寄 主：家蠅(卵)
廄蠅
家蠶。
分 佈：貴州、我國大多數地區均有發現，世界性。

Macrocheles plumiventris Hull 羽腹巨螯蟎 (Pan et Teng, 1980:125)
寄 主：雞窩、羊圈內。
分 佈：河北、遼寧；蘇聯及歐洲一些國家。

Macrocheles sinicus Ye et al. 中華巨螯蟎 (Ye et al., 1994:309)

Macrocheles sinicus Ye et al., 1994:309-312.

寄 主：林睡鼠(*Dyromys nitedula*)、天山林鼶(*Clethrionomys frater*)、小林姬鼠(*Aoidenus agrarius*)、普通田鼠(*Microtus arvalis*)。

分 佈：新疆(新源縣)。

Macrocheles transbaicalicus Bregetova 外貝加爾巨螯蟎 (Pan et Teng, 1980:126)

寄 主：布氏田鼠、長爪沙鼠。

分 佈：黑龍江；蘇聯。

Neopodocinum dehongense Li et Chang 德宏新足蟎 (Li et Chang, 1979:357; Li et Gu, 1987: 138)

Neopodocinum dehongense Li et Chang, 1979:357.

寄 主：蜣螂。

分 佈：雲南。

Neopodocinum gigantum Gu et Li 巨新足蟎 (Gu et Li, 1987:165)

Neopodocinum gigantum Gu et Li, 1987:165-168.

寄 主：蜣螂。

分 佈：雲南(賓川縣雞足山)。

Neopodocinum jaspersi (Oudemans) 賈氏新足蟎 (Li et Chang, 1979:360)

寄 主：

分 佈：雲南。

Neopodocinum mrciaki Sellnick 莫氏新足蟎 (Ye et Ma, 1994:194)

Neopodocinum mrciaki Sellnick, 1968:

寄 主：

分 佈：新疆(庫爾干塔什)；蘇聯(外喀爾巴阡)、捷克。

Neopodocinum sinicum Li et Gu 中華新足蟎 (Li et Gu, 1987:133)

Neopodocinum sinicum Li et Gu, 1987:133.

寄 主：蜣螂。

分 佈：雲南、貴州。

Neopodocinum vanderhammeni Krantz 哈門新足蟎 (Li et Gu, 1987:137)

寄 主：蜣螂。

分 佈：貴州。

Neopodocinum yunnanense Li et Gu 雲南新足蟎 (Li et Gu, 1987:135)

Neopodocinum yunnanense Li et Gu, 1987:135.

寄 主：蜣螂。

分 佈：雲南。

Parholaspulus ventricosus Yin et al. 巨腹派倫螨 (Pan et Teng, 1980:128)

寄 主：東北鼢鼠。

分 佈：吉林。

Parholaspidae 派盾螨科

Gamasholaspis eothenomydis Gu 絨鼠革板螨 (Gu, 1984:375)

Gamasholaspis eothenomydis Gu, 1984:375-376.

寄 主：黑線絨鼠(*Eothenomys melanogaster* Milne-Edwards)。

分 佈：貴州(綏陽)。

Laelapidae 厲螨科

Androlaelaps casalis (Berlese) 茅舍陽厲螨 (Deng et al., 1989:37; Xin, 1988:152)

寄 主：黃毛鼠、針毛鼠、隱紋花松鼠華南亞種等和一些鳥類，也生活于雞窩、草堆、稻穀、大麥、小麥、米糠、古巴糖等處，以雜食爲生兼營吸血種類，在穀物、碎屑中的粉螨有關。

分 佈：中國大多數省區；全世界。

Androlaelaps euryplatamus Yang et Li 寬板陽厲螨 (Yang et Li, 1992:428)

Androlaelaps euryplatamus Yang et Li, 1992:428-429.

寄 主：樹麻雀(*Passer montanus* Linnaeus)巢內。

分 佈：青海(貴南縣)。

Androlaelaps glasgowi (Ewing) 格氏陽厲螨 (Deng et al., 1989:37)

寄 主：黑線姬鼠、黃胸鼠、褐家鼠、小家鼠、黑線倉鼠、大倉鼠、達烏爾黃鼠等及鳥、蝙蝠以及小的肉食類之黃鼬。

分 佈：我國大部分省區；朝鮮、日本、蘇聯、歐洲、美洲、大洋洲。

Androlaelaps hsui Wang 徐氏陽厲螨 (Pan et Teng, 1980:53)

寄 主：黃毛鼠華南亞種。

分 佈：福建。

Androlaelaps orientalis (Teng et Pan) 東方陽厲螨 (Deng et al., 1989:39)

寄 主：隱紋花松鼠、長吻松鼠、黃毛鼠等及食蟲目的毛蝟、樹鼩。

分 佈：福建、雲南。

Androlaelaps pavlovskii Bregetova 巴陽厲螨 (Pan et Teng, 1980:56)

寄 主：黑線倉鼠、大林姬鼠、大倉鼠、社鼠、背紋鼶鼠、達烏爾黃鼠、長尾倉鼠。

分 佈：福建、江蘇、山西、河北、青海、內蒙古、寮寧、吉林、黑龍江；蘇聯。

Androlaelaps singularis Wang 單陽厲螨 (Liao, 1994:159; Pan et Teng, 1980:54)

Androlaelaps singularis
寄 主：黃毛鼠(*Rattus rattoides exiguus* Howell)、臭鼩。
分 佈：福建。

Androlaelaps singuloides Gu et Duan 擬單陽厲蟎 (Gu et Duan, 1993:48)
Androlaelaps singuloides Gu et Duan, 1993:48-49.
寄 主：*Gryllus* sp. 蟋蟀體上。
分 佈：雲南(隴川縣)。

Androlaelaps triangularis (Wang) 三角陽厲蟎 (Deng et al., 1989:38)
寄 主：大倉鼠。
分 佈：福建、四川、山西、河北。

Androlaelaps trifurcatus Wang 二叉陽厲蟎 (Pan et Teng, 1980:55)
寄 主：黃毛鼠華南亞種。
分 佈：福建。

Coleolaelaps agrestis (Berlese) 田野鞘厲蟎 (Teng, 1984:48)
Coleolaelaps agrestis (Berlese)
寄 主：大雲鰓金龜(*Polyphylla laticollis*)。
分 佈：遼寧(朝陽)。

Coleolaelaps liui Samsinak 劉鞘厲蟎 (Pan et Teng, 1980:44)
寄 主：獨角仙科 Dynastidae。
分 佈：華南。

Coleolaelaps longisetatus Ishikawa 長毛鞘厲蟎 (Deng et al., 1989:41)
寄 主：*Polyphylla laticollis* Lewis 大雲鰓金龜(成蟲、幼蟲體上)。
分 佈：遼寧；日本。

Cosmolaelaps acutiscutus Teng 尖背廣厲蟎 (Teng, 1982:162)
Cosmolaelaps acutiscutus Teng, 1982:162-163.
寄 主：一種甲蟲上。
分 佈：江蘇(贛榆縣)。

Cosmolaelaps chini Bai et Gu 金氏廣厲蟎 (Bai et Gu, 1993:40)
Cosmolaelaps chini Bai et Gu, 1993:40-42.
寄 主：*Myrmos* sp. 蟻巢內。
分 佈：寧夏。

Cosmolaelaps liae Bai et Gu 李氏廣厲蟎 (Bai et Gu, 1993:42)
Cosmolaelaps liae Bai et Gu, 1993:42-43.
寄 主：*Myrmos* sp. 蟻巢內。

分 佈：寧夏。

Cosmolaelaps miles (Berlese) 兵廣厲蟎 (Pan et Teng, 1980:57)

=*Cosmolaelaps gurabensis* Fox

寄 主：達烏爾黃鼠、草原鼢鼠、小家鼠、黑家鼠、五趾跳鼠。

分 佈：浙江、湖北、河北、遼寧、吉林、黑龍江；蘇聯、美國、歐洲一些國家。

Cosmolaelaps ningxiaensis Bai et Gu 寧夏廣厲蟎 (Bai et Gu, 1993:44)

Cosmolaelaps ningxiaensis Bai et Gu, 1993:44-45.

寄 主：*Myrmos* sp. 蟻巢內。

分 佈：寧夏。

Cosmolaelaps wangae Bai et Gu 王氏廣厲蟎 (Bai et Gu, 1993:43)

Cosmolaelaps wangae Bai et Gu, 1993:43-44.

寄 主：*Myrmos* sp. 蟻巢內。

分 佈：寧夏。

Cosmolaelaps vacuum (Michael) 空洞廣厲蟎 (Teng, 1982:163)

寄 主：黑線姬鼠 *Apodemus agrarius*)、黑線倉鼠(*Cricetulus barabensis*)。

分 佈：黑龍江。

Cosmolaelaps sp. 廣厲蟎 (Liao, 1994:159)

Cosmolaelaps sp, Liao, 1994:159.

寄 主：黃毛鼠(*Rattus rattoides exiguus* Howell)。

分 佈：福建。

Cyrtolaelaps qinghaiensis Ma 青海曲厲蟎 (Ma, 1988:149)

Cyrtolaelaps qinghaiensis Ma, 1988:149-150.

寄 主：喜馬拉雅旱獺(*Marmota himalayana* Hodgson)。

分 佈：青海(興海縣)。

Dianolaelaps gryllus Gu et Duan 蟋蟀滇厲蟎 (Gu et Duan, 1990:436)

Dianolaelaps gryllus Gu et Duan, 1990:436-438.

寄 主：*Gryllus* sp. 蟋蟀。

分 佈：雲南(隴川縣)。

Dipolaelaps chimmarogalis Gu 水鼩地厲蟎 (Gu, 1983:271)

Dipolaelaps chimmarogalis Gu, 1983:271-273.

寄 主：水麝鼩(*Chimmarogale platycephala* Temminck)。

分 佈：貴州(凱里縣)。

Dipolaelaps hoi Chang et Hsü 何氏地厲蟎 (Pan et Teng, 1980:41)

寄 主：田鼠。

分 佈：四川。

Dipolaelaps jiangkouensis Gu 江口地厲蟎 (Gu, 1985:276)

Dipolaelaps jiangkouensis Gu, 1985:276-277.

寄 主：社鼠(*Rattus niviventer* Hodgson)。

分 佈：貴州(江口縣)。

Dipolaelaps longisetosus Huang 長毛地厲蟎 (Huang, 1985:281)

Dipolaelaps longisetosus Huang, 1985:281-282.

寄 主：四川長尾鼩(*Soriculus hypsibius* de Winton)。

分 佈：陝西(寧陝縣)。

Dipolaelaps soriculi Huang 長尾鼩地厲蟎 (Huang, 1985:280)

Dipolaelaps soriculi Huang, 1985:280-281.

寄 主：四川長尾鼩(*Soriculus hypsibius* de Winton)。

分 佈：陝西(寧陝縣)。

Dipolaelaps taibaiensis Huang 太白地厲蟎 (Huang, 1985:279)

Dipolaelaps taibaiensis Huang, 1985:279-280.

寄 主：四川短尾鼩(*Anourosorex squamipes* Milne-Edwards)。

分 佈：陝西(太白自然保護區放羊寺)。

Dipolaelaps ubsunaris Zemskaya et Piontkovskaya 烏蘇地厲蟎 (Pan et Teng, 1980:40)

寄 主：五趾跳鼠。

分 佈：河北、吉林；蘇聯。

Echinolaclaps echidninus (Berlese) 毒棘厲蟎 (Gu et Wang, 1979:381; Liao, 1994:159; Liu et al., 1994:229-231)

Echinolaclaps echidninus (Berlese, 1887)

寄 主：黃胸鼠(*Rattus flavipectus* (Milne-Edwards))、黃毛鼠(*Rattus losea* (Swinhoe))、褐家鼠(*Rattus norvegicus* (Berkenhout))、社鼠(*Rattus niviventer* (Hodgson))、白腹巨鼠(*Rattus coxingi* (Swinhoe))、小泡巨鼠(*Rattis edwardsi* (Thomas))、大足鼠(*Rattis motodis* (Hodgson))、黃毛鼠(*Rattis rattoides exiguus* Howell)。

分 佈：福建、海南。

Echinolaclaps fukienensis Wang 福建棘厲蟎 (Gu et Wang, 1979:381; Liu et al., 1994:229-231)

Echinolaclaps fukienensis Wang, 1963:

寄 主：社鼠(*Rattus niviventer* (Hodgson))、小泡巨鼠(*Rattus edwardsi*)。

分 佈：海南。

Echinonyssu melogalius Gu et al. 鼬獾棘刺蟎 (Gu et al., 1987:383)

Echinonyssu melogalius Gu et al., 1987:383-385.

寄 主：鼬獾(*Nelogale moschata* Gray)。

分 佈：貴州(赤水縣)。

Eulaelaps cricetuli Vitzthum 倉鼠真厲蟎 (Deng et al., 1989:46)

寄 主：黑線倉鼠、大倉鼠、五趾跳鼠、羽尾跳鼠、長爪沙鼠、子午沙鼠、背紋毛蹠鼠、黑線姬鼠、大林姬鼠、達烏爾黃鼠、小毛足鼠等。

分 佈：青海、山西、河北、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蘇聯。

Eulaelaps linggangis Wen et Yan 菱肛猶厲蟎 (Wen et Yan, 1985:247)

Eulaelaps linggangis Wen et Yan, 1985:247.

寄 主：*Callosciuru erythraeus michianus* 麗江赤腹麗松鼠。

分 佈：雲南(昆明西山)。

Eulaelaps shanghaiensis Wen 上海猶厲蟎 (Wen, 1964:193-200)

Eulaelaps shanghaiensis Wen, 1962:

寄 主：

分 佈：上海。

Eulaelaps stabularis (Koch) 廄真厲蟎 (ASZI, 1987, 2:779; Deng et al., 1989:46; Xin, 1988:153)

寄 主：廣泛，黃毛鼠、黃胸鼠、褐家鼠、黑線姬鼠、黑線倉鼠、大倉鼠等體上吸血。

分 佈：全世界，中國大多數省區；日本、蘇聯、歐洲、北非、北美洲。

Haemogamasus kitanoi Asanuma 北野血革蟎 (Deng et al., 1989:44)

寄 主：廣泛，三趾跳鼠、子午沙鼠、長爪沙鼠、背紋毛蹠鼠、布氏田鼠、長尾倉鼠、東北鼢鼠、飛鼠、旱獺、達烏爾鼠等。

分 佈：四川、青海、新疆、內蒙古、吉林、黑龍江；蘇聯。

Haemogamasus mandschuricus Vitzthum 東北血革蟎 (Deng et al., 1989:45)

寄 主：廣泛，黑線倉鼠、五趾跳鼠、長爪沙鼠、布氏田鼠、東方田鼠、大倉鼠、達烏爾黃鼠、三趾跳鼠、黑線姬鼠、小毛足鼠、東北鼢鼠、草原鼢鼠等。

分 佈：青海、甘肅、新疆、山西、河北、內蒙古、吉林、黑龍江；日本、蘇聯。

Haemogamasus monticola Wang et Li 山區血革蟎 (Gu et Wang, 1979:381; Liao, 1994:159)

Haemogamasus monticola Wang et Li, 1995:

寄 主：黃毛鼠(*Rattus rattoides exiguus* Howell)、豬尾鼠(*Typhlomys cinereus chapensis* Osgood, 1932)。

分 佈：福建、貴州(綏陽)。

Haemogamasus oliviformis Teng et Pan 橄形血革蟎 (Dang et al., 1989:44)

寄 主：大耳姬鼠、黑線姬鼠、白腹巨鼠、褐家鼠等。

分 佈：雲南、四川。

Haemogamasus pontiger (Berlese) 拱胸血革蟎 (ASZI, 1987, 2:778; Xin, 1988:153)

捕 食：粉蟎(倉中)、昆蟲的幼蟲。

分 佈：湖南、安徽；全世界。

Haemogamasus serdjukovae Bregetova 賽氏血革蟎 (Deng et al., 1989:43)

寄 主：很廣，棕背䶄、紅背䶄、大耳姬鼠、東方田鼠、社鼠、黑線倉鼠、花鼠、東北鼢鼠、草原鼢鼠等及烏鴉。

分 佈：四川、青海、山西、河北、遼寧、吉林、黑龍江；蘇聯。

Haemolaelaps androgynus Bregetova 陰陽血厲蟎 (Ye et Ma, 1994:194)

Haemolaelaps androgynus Bregetova, 1952:

寄 主：灰倉鼠(*Cricetulus migratorius* (Pallas))；波斯沙土鼠(蘇聯)、小家鼠(蘇聯)。

分 佈：新疆(哈密)；蘇聯(亞美尼亞、土庫曼尼亞)。

Haemolaelaps anomalis Wang et al. 異樣血厲蟎 (Wang et al., 1981:105)

Haemolaelaps anomalis Wang et al., 1981:105.

寄 主：花松鼠(*Tamiops swinhoei*)。

分 佈：福建(邵武)。

Haemolaelaps anourosorecis Gu et Wang 短尾鼩血厲蟎 (Gu et Wang, 1981:390)

Haemolaelaps anourosorecis Gu et Wang, 1981:390-392.

寄 主：四川短尾鼩(*Anourosorex squamipes* Milne-Edwards)。

分 佈：貴州(綏陽)。

Haemolaelaps casalis (Berlese) 小村血厲蟎 (Liu et al., 1994:229-231; Meng, 1964:436-443; Pan et Teng, 1980:38; Wang, 1963:201)

Haemolaelaps casalis (Berlese, 1887:)

別 名：*茅舍血厲蟎*。

寄 主：家鴿(*Columba domestica*)、家雞(*Gallus domesticus*)、麻雀(*Passer montanus*)、羅賽鼠(*Rattus losea exiguus*)、黃胸鼠(*Rattus flavipectus* (Milne-Edwards)。

分 佈：福建(漳州)、海南。

Haemolaelaps cehengensis Gu 冊亨血厲蟎 (Gu, 1983:157)

Haemolaelaps cehengensis Gu, 1983:157-159.

寄 主：紅白鼯鼠(*Petaurista alborufus* Milne-Edwards)。

分 佈：

Haemolaelaps chinensis Wang 中華血厲蟎 (Liao, 1994:159; Liu et al., 1994:229-231; Pan et Teng, 1980:38; Wang, 1963:201)

Haemolaelaps chinensis Wang, 1963:201.

寄 主：黃毛鼠(*Rattus rattoides exiguus* Howell)。

分 佈：福建。

Haemolaelaps cordatus Teng et Pan 心形血厲蟎 (Pan et Teng, 1980:39)

寄 主：黃毛鼠西南亞種。

分 佈：雲南。

Haemolaelaps fragilis Chen, et al. 脆弱血厲蟎 (Chen, et al., 1995:228)

Haemolaelaps fragilis Chen, et al., 1995:228.

寄 主：五趾跳鼠(*Allactaga sibirica* (Forster, 1778))。

分 佈：寧夏。

Haemolaelaps glasgowi (Ewing) 格氏血厲蟎 (Ma, 1987:61-67; Pan et Teng, 1980:37; Wang, 1963:202)

Haemolaelaps glasgowi (Ewing, 1925:)

寄 主：五趾跳鼠(*Allactaga sibirica* (Forster, 1778))、達烏爾黃鼠(*Citellus dauricus*)、黑線倉鼠(*Cricetulus barabensis*)、小家鼠(*Mus musculus* Linnaeus)、黃胸鼠、褐家鼠 *Rattus norvegicus*)、大倉鼠(*Cricetulus triton* de Winton)、三趾跳鼠(*Dipus sagitta* Pallas)、香鼬(*Mustela altaica* Pallas)、根田鼠(*Microtus oeconomus* Pallas)、烏線姬鼠(*Apodemus agrarius ningpoensis*)、鳥、蝙蝠、黃鼬。

分 佈：福建(邵武)、甘肅、吉林、全國各省廣佈；朝鮮、日本、歐洲、美洲、大洋洲。

Haemolaelaps latiporus Bai et Gu 側孔血厲蟎 (Bai et Gu, 1993:39)

Haemolaelaps latiporus Bai et Gu, 1993:39-40.

寄 主：*Myrmos* sp. 蟻巢內。

分 佈：寧夏。

Haemolaelaps liae Wang 李氏血厲蟎 (Pan et Teng, 1980:33; Wang, 1963:200)

Haemolaelaps liae Wang, 1863:200.

寄 主：刺毛黃鼠(*Rattus fulvescens* Huang)、羅賽鼠(*Rattus losea exiguus*)、針毛鼠、黃毛鼠。

分 佈：福建(崇安)。

Haemolaelaps minutiventralis Gu 小腹血厲蟎 (Gu, 1983:159)

Haemolaelaps minutiventralis Gu, 1983:159-160.

寄 主：紅白鼯鼠(*Petaurista alborufus* Milne-Edwards)。

分 佈：貴州(冊亨)。

Haemolaelaps orientalis Teng et Pan 東方血厲蟎 (Pan et Teng, 1980:35)

寄 主：樹鼩、隱紋花松鼠、隱紋花松鼠華南亞種、長吻松鼠、毛蝟、黃毛鼠。

分 佈：福建、雲南。

Haemolaelaps petauristae Gu et Wang 鼯鼠血厲蟎 (Gu et Wang, 1980:46)

Haemolaelaps petauristae Gu et Wang, 1980:46-47.

寄 主：小鼯鼠(*Petaurista elegans* ssp.)。

分 佈：廣西(桂林)。

Haemolaelaps praeporus Gu et Wang 前孔血厲蟎 (Gu et Wang, 1981:392)

Haemolaelaps praeporus Gu et Wang, 1981:392-393.
寄 主：黃毛鼠(*Rattus losea* Swinhoe)。
分 佈：貴州(榕江縣)。

Haemolaelaps sanduensis Gu et Wang 三都血厲蟎 (Gu et Wang, 1981:393)
Haemolaelaps sanduensis Gu et Wang, 1981:393-394.
寄 主：錫金小家鼠(*Mus pahari* Thomas)。
分 佈：貴州(三都縣)。

Haemolaelaps semidesertus Bregetova 半漠血厲蟎 (Pan et Teng, 1980:36)
寄 主：五趾跳鼠、三趾跳鼠、小毛足鼠、布氏田鼠。
分 佈：內蒙古、黑龍江；蘇聯。

Haemolaelaps traubi (Strandtmann) 特血厲蟎 (Pan et Teng, 1980:33)
寄 主：赤腹松鼠、藍腹松鼠、巨松鼠、青鼬。
分 佈：雲南；日本、馬來西亞、緬甸。

Haemolaelaps triangularis Wang 三角血厲蟎 (Pan et Teng, 1980:34; Wang, 1963:202)
Haemolaelaps triangularis Wang, 1963:202.
寄 主：大倉鼠。
分 佈：福建(邵武)、四川、山西、河北。

Haemolaelaps zhongweiensis Bai et al. 中衛血厲蟎 (Bai et al., 1987:387)
Haemolaelaps zhongweiensis Bai et al., 1987:387-388.
寄 主：鼠洞、牧場金龜(*Aphodius rectus* Motsch.)。
分 佈：寧夏(中衛縣)。

Hyperlaelapis microti (Ewing) 田鼠上厲蟎 (Pan et Teng, 1980:43)
寄 主：莫氏田鼠、沼澤田鼠、黑線姬鼠。
分 佈：新疆、內蒙古、吉林、黑龍江；蘇聯、英國。

Hypoaspis aculeifer Canestrini 尖狹下盾蟎 (Chen, 1999:35-42; Yu et Chen, 2000, (12):32-33)
寄 主：*Rhizoglyphus robini* Clapareda 羅賓根蟎(球根作物：蔥、蒜、唐菖蒲、百合等)
粉蟎
線蟲
跳蟲。
分 佈：臺灣、中國大陸；日本、蘇聯、意大利、荷蘭、德國、英國、瑞典。

Hypoaspis (Geolaelaps) aculeiferoides Teng 類尖下盾蟎 (Teng, 1982:161)
Hypoaspis (*Geolaelaps*) *aculeiferoides* Teng, 1982:161-162.
寄 主：達烏爾黃鼠(*Citellus dauricus* Brandt) 鼠巢。
分 佈：北京。

Hypoaspis chianensis Gu 黔下盾蟎 (Gu, 1990:441)

Hypoaspis chianensis Gu, 1990:441-442.

寄 主：錫金小家鼠(*Mus pahari* Thomas)。

分 佈：貴州(興義縣)。

Hypoaspis (Geolaelaps) concinna Teng 秀越下盾蟎 (Teng, 1982:160; Teng et al., 1989:40)

Hypoaspis (*Geolaelaps*) *concinna* Teng, 1982:160-161.

寄 主：大倉鼠(*Cricetus triton* de Winton)的巢內。

分 佈：北京。

Hypoaspis haiyuanensis Bai, et al. 海原下盾蟎 (Bai, et al., 1994:296)

Hypoaspis haiyuanensis Bai, et al., 1994:296.

寄 主：*Myrmos* sp. 蟻巢內。

分 佈：寧夏。

Hypoaspis hrdyi Samsinak 力下盾蟎 (Pan et Teng, 1980:51)

寄 主：白蟻窩。

分 佈：廣東。

Hypoaspis linteyini Samsinak 林下盾蟎 (Pan et Teng, 1980:52)

寄 主：家白蟻(*Coptotermes fromosanus*)。

分 佈：廣東。

Hypoaspis longchuanensis Gu et Duan 隴川下盾蟎 (Gu et Duan, 1993:50)

Hypoaspis longchuanensis Gu et Duan, 1993:50-51.

寄 主：*Xylotrupes* sp. 獨角仙體上(Dynastidae)。

分 佈：雲南(隴川縣)。

Hypoaspis lubrica Voigts et Oudemans 溜下盾蟎 (Deng et Cui, 1992:690; Deng et al., 1989:39; Pan et Teng, 1980:52)

=*Hypoaspis murinus* Strandtmann et Menzies

寄 主：黑線倉鼠、黑線姬鼠、沼澤田鼠、子午沙鼠，並常生活在鼠窩、雞窩、白蟻巢內。

分 佈：貴州、四川、江蘇、內蒙古、遼寧、黑龍江；蘇聯、英國、美國。

Hypoaspis (Geolaelaps) praesternalis Willmann 胸前下盾蟎 (Teng, 1982:162)

Hypoaspis (*Geolaelaps*) *praesternalis* Willmann

寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)。

分 佈：黑龍江。

Hypoaspis (s. str.) **rhinocerotis** Qudemans 椰甲下盾蟎 (Deng et al., 1989:40; Teng et Luo, 1983:433)

寄 主：*Oryctes rhonoceros* Linnaeus 椰蛀犀金龜(取食其卵)。

分 佈：海南、華南；東南亞、南太平洋諸島嶼。

Hypoaspis spinacrassus Rosario 粗毛下盾蟎 (Gu et al., 1992:430)

Hypoaspis spinacrassus Rosario, 1981:65.
寄 主：*Gryllus* sp. 蟋蟀。
分 佈：雲南(玉溪市)；菲律賓。

Hypoaspis submontana Bai, et al. 擬山下盾蟎 (Bai, et al., 1994:295)

Hypoaspis submontana Bai , et al., 1994:295.
寄 主：*Myrmos* sp. 蟻巢內。
分 佈：寧夏。

Hy… aspis taitzujungi Samsinak 戴下盾蟎 (Pan et Teng, 1980:50)

寄 主：家白蟻(*Coptotermes formosanus*)。
分 佈：廣東。

Hypoaspis weni Bai, et al. 溫氏下盾蟎 (Bai, et al., 1994:297)

Hypoaspis weni Bai, et al., 1994:297.
寄 主：昆蟲幼蟲體。
分 佈：寧夏。

Laelaps algericus Hirst 阿爾及利亞厲蟎 (Deng et al., 1989:35; Pan et Teng, 1980:24)

寄 主：小家鼠。
分 佈：福建、新疆、遼寧；蘇聯、阿爾及利亞、埃及。

Laelaps cheni Li 陳氏厲蟎 (Pan et Teng, 1980:21)

寄 主：小泡巨鼠。
分 佈：廣東。

Laelaps chini Wang et Li 金氏厲蟎 (Pan et Teng, 1980:29)

寄 主：黃胸鼠、絨鼠、黑線姬鼠。
分 佈：雲南。

Laelaps clethryionomydis Lange 平厲蟎 (Pan et Teng, 1980:28)

寄 主：沼澤田鼠、莫氏田鼠、黑線姬鼠、棕背鼮、紅背鼮。
分 佈：內蒙古、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯。

Laelaps digitalis Teng 趾穎擬厲蟎 (Teng, 1981:397)

Laelaps digitalis Teng, 1981:397-398.
寄 主：黑線倉鼠(*Cricetulus barabensis* Pallas)
分 佈：內蒙古(呼倫貝爾盟)。

Laelaps echidninus Berlese 毒厲蟎 (Deng et al., 1989:33; Pan et Teng, 1980:20)

寄 主：嚙齒類動物：黃毛鼠、褐家鼠、針毛鼠、黃胸鼠、社鼠、青毛鼠、小泡巨鼠、小家鼠、黑線姬鼠等。

宿 主：毒厲蟎是鼠類寄生原蟲 *Hepatzoon muris* 的中間宿主，並從其體內曾離出阿根廷出血熱的病毒。

分 佈：臺灣、廣東、四川；全世界。

Laelaps extremi Zachvatkin 極厲蟎 (Pan et Teng, 1980:32)

寄 主：倉鼠。

分 佈：新疆；蘇聯。

Laelaps fukienensis Wang 福建厲蟎 (Pan et Teng, 1980:23)

寄 主：針毛鼠、社鼠、黃毛鼠、褐家鼠。

分 佈：福建、廣東。

Laelaps guizhouensis Gu et Wang 貴州厲蟎 (Gu et Wang, 1981:281)

Laelaps guizhouensis Gu et Wang, 1981:281-283.

寄 主：錫金小家鼠(*Mus pahari* Thomas)。

分 佈：貴州。

Laelaps hongaiensis Grochovskaya et Nguyen-Xuan-Xoe 鴻基厲蟎 (Sun et al., 1986:125)

Laelaps hongaiensis Grochovskaya et Nguyen-Xuan-Xoe

寄 主：白腹巨鼠。

分 佈：福建(福州鼓山、武夷山三港)。

Laelaps hsui Li 徐氏厲蟎 (Pan et Teng, 1980:27)

寄 主：社鼠。

分 佈：廣東。

Laelaps jettmari Vitzthum 耶氏厲蟎 (Deng et al., 1989:36; Pan et Teng, 1980:34)

=*Laelaps povlovskyi* Zachvathin, 1948:

=*Laelaps huaihoensis* Wen, 1965:

寄 主：黑線姬鼠、大林姬鼠、大耳姬鼠、莫氏田鼠、沼澤田鼠、棕背鼶、小家鼠等。

分 佈：臺灣、福建、廣東、雲南、四川、江蘇、安徽、湖北、青海、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯。

Laelaps liui Wang 柳氏厲蟎 (Pan et Teng, 1980:30)

寄 主：青毛鼠。

分 佈：福建。

Laelaps miltispinosus Banks 多刺厲蟎 (Pan et Teng, 1980:25)

寄 主：麝鼠。

分 佈：新疆、遼寧；蘇聯、德國、加拿大、美國。

Laelaps muris (Ljungh) 鼠厲蟎 (Pan et Teng, 1980:26)

寄 主：水鼷。

分 佈：新疆；蘇聯、英國、德國、荷蘭、澳洲。

Laelaps nuttalli Hirst 納氏厲蟎 (Deng et al., 1989:35; Liao, 1994:159; Liu et al., 1994:229-231; Pan et Teng, 1980:29)

寄 主：褐家鼠、黃毛鼠(*Rattus rattoides exiguus* Howell)、社鼠、小家鼠、大林姬鼠、黑線姬鼠、黃胸鼠(*Rattus flavipectus* (Milne-Edwards))、溝鼠(*Rattus norvegicus* (Berkenhout))、施氏屋頂鼠等及食蟲類的臭鼩。

分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、雲南、江蘇、湖北、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、印度、非洲、美洲、大洋洲。

Laelaps (Hyperlaelaps) orientalis Wang et al. 東方上厲蟎 (Wang et al., 1981:103)

Laelaps (*Hyperlaelaps*) *orientalis* Wang et al., 1981:103.

寄 主：東方田鼠(*Microtus fortis*)。

分 佈：福建(光澤、浦城)。

Laelaps pachysternus Wang et al. 厚胸厲蟎 (Wang et al., 1980:52)

Laelaps pachysternus Wang et al., 1980:52-54.

寄 主：中華竹鼠(*Rhizomys sinensis davidi*)。

分 佈：福建(邵武)。

Laelaps paucisetosa Gu et Wang 貧毛厲蟎 (Gu et Wang, 1981:279)

Laelaps paucisetosa Gu et Wang, 1981:279-281.

寄 主：錫金小家鼠(*Mus pahari* Thomas)、齊氏姬鼠(*Apodemus chevrieri* Milne-Edwards)。

分 佈：貴州。

Laelaps sinensis Bai et Gu 中華擬厲蟎 (Bai et Gu, 1993:438)

Laelaps sinensis Bai et Gu, 1993:438-439.

寄 主：*Myrmos* sp. 蟻巢內。

分 佈：寧夏。

Laelaps taingueni Grochovskaya et Nguyen-Xuan-Hoe 太原厲蟎 (Pan et Teng, 1980:28)

寄 主：小家鼠、黃毛鼠。

分 佈：福建、廣東、雲南；越南。

Laelaps traubi Domrow 特氏厲蟎 (Deng et al., 1989:34; Pan et Teng, 1980:22; Teng, 1982:462)

寄 主：嚙齒類動物：針毛鼠(*Rattus fulvescens*)、黃毛鼠(*Rattus losea*)、社鼠(*Rattus niviventer*)、褐家鼠、白腹巨鼠(*Rattus coxingi*)。

分 佈：臺灣、福建、廣東、雲南、西藏(山南地區)、四川、陝西、河北；越南、馬來西亞、泰國。

Laelaps turkestanicus Lange 土爾克斯坦厲蟎 (Deng et al., 1989:35; Gu et Wang, 1979:381; Liu et al., 1994:229-231; Pan et Teng, 1980:25)

Laelaps turkestanicus Lange, 1955:

寄 主：社鼠(*Rattus confucianus* Milne-Edwards)、小家鼠(*Mus musculus* Linnaeus)、黑線姬鼠(*Apodemus peninsulae*)、黃毛鼠(*Rattus losea* (Swinhoe))、針毛鼠(*Rattus buang* Bonhote)、白腹巨鼠(*Rattus coxingi* (Swinhoe))、小泡巨鼠(*Rattus edwardsi* (Thomas))、大耳姬鼠、絨鼠等及食蟲類的鼩鼱、豬尾鼠(杪巴亞種)(*Typhlomys cinereus chapensis* Osgood, 1932)。

分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、雲南、貴州、四川、江蘇、河北；蘇聯。

Laelaps xingyiensis Gu et Wang 興義厲蟎 (Gu et Wang, 1981:283)

Laelaps xingyiensis Gu et Wang, 1981:283-284.

寄 主：錫金小家鼠(*Mus pahar* Thomas)。

分 佈：貴州。

Laelaps zhongweiensis Bai et Gu 中衛擬厲蟎 (Bai et Gu, 1993:439)

Laelaps zhongweiensis Bai et Gu, 1993:439-440.

寄 主：*Myrmos* sp. 蟻巢洞穴中。

分 佈：寧夏。

Laelaspis equitans (Michael) 騎擬厲蟎 (Bai et Gu, 1993:441)

Laelaspis equitans (Michael, 1891:)

寄 主：*Myrmos* sp. 蟻巢洞穴內。

分 佈：寧夏；歐洲。

Laelaspis laevis (Michael) 光滑擬厲蟎 (Bai et Gu, 1994:181)

Laelaspis laevis (Michael, 1891:)

寄 主：*Myrmos* sp. 蟻洞道及巢穴內。

分 佈：寧夏。

Laelaspis ningxiaensis Bai et Gu 寧夏擬厲蟎 (Bai et Gu, 1994:181)

Laelaspis ningxiaensis Bai et Gu, 1994:181-183.

寄 主：*Myrmos* sp. 蟻巢穴內。

分 佈：寧夏。

Mysolaelaps cunicularis Wang et Liao 洞窩鼠厲蟎 (Pan et Teng, 1980:57)

寄 主：黃毛鼠華南亞種窩中。

分 佈：福建。

Neocypholaelaps indica Evans 印度新曲厲蟎 (Teng et Pang, 1964:771-772)

Neocypholaelaps indica Evans, 1963:

寄 主：蜜蜂。

分 佈：廣西。

Ololaelaps ussuriensis Bregetova et Koroleva 烏蘇里土厲蟎 (Li et Liu, 1982:377)

Ololaelaps ussuriensis Bregetova et Koroleva, 1964:

寄 主：東方田鼠(*Microtus fortis*)窩巢內。

分 佈：遼寧；蘇聯遠東沿海地帶。

Oryctolaelapis bibikoivae Lange 比鼴厲蟎 (Pan et Teng, 1980:46)

寄 主：鼢鼠、鼯鼴、褐家鼠。

分 佈：河北、寮寧、吉林；蘇聯。

Pachylaelaps gansuensis Ma 甘肅厚厲蟎 (Ma, 1985:338)

Pachylaelaps gansuensis Ma, 1985:338.

寄 主：*Mcirotus* sp. 田鼠。

分 佈：甘肅。

Pachylaelaps xinghaiensis Ma 興海厚厲蟎 (Ma, 1985:337)

Pachylaelaps xinghaiensis Ma, 1985:337.

寄 主：*Microtus* sp. 田鼠。

分 佈：青海。

Pachylaelaps xenillitus Ma 小梳厚厲蟎 (Ma, 1985:338)

Pachylaelaps xenillitus Ma, 1985:338.

寄 主：*Microtus* sp. 田鼠。

分 佈：甘肅。

Qinghailaelaps marmotae Gu et Yang 旱獺青厲蟎 (Gu et Yang, 1984:371)

Qinghailaelaps marmotae Gu et Yang, 1984:371-373.

寄 主：喜馬拉雅旱獺(*Marmota himalayana* Hodgson)。

分 佈：青海(黃南、河南)。

Rhyzolaelaps lodianensis Gu et Wang 羅甸竹厲蟎 (Gu et Wang, 1979:408)

Rhyzolaelaps lodianensis Gu et Wang, 1979:408-411.

寄 主：白花竹鼠(*Rhizomys pruinosus latouchei* Thomas, 1915)。

分 佈：貴州(羅甸)。

Rhyzolaelaps rhizomydis Wang et al. 竹鼠根厲蟎 (Wang et al., 1980:51)

Rhyzolaelaps rhizomydis Wang et al., 1980:51-52.

寄 主：中華竹鼠(*Rhizomys sinensis davidi*)。

分 佈：福建(邵武)。

Sinolaelaps typhlomydis Gu et Wang 豬尾鼠華厲蟎 (Gu et Wang, 1979:381)

Sinolaelaps typhlomydis Gu et Wang, 1979:381-383.

寄 主：豬尾鼠(沙巴亞種)(*Typhlomys cinereus chapensis* Osgood, 1932)。

分 佈：貴州(綏陽)。

Sinolaelaps yunnanensis Tian 雲南華厲蟎 (Tian, 1988:278)

Sinolaelaps yunnanensis Tian, 1988:278-280.

寄 主：豬尾鼠(景東亞種)(*Typhlomys cinereus jindongeus* Wu et Deng)。

分 佈：雲南(景東縣)。

Tricholaelaps myonysognathus 鼠顎毛厲蟎 (Liao, 1994:159; Pan et Teng, 1980:45)

Tricholaelaps myonyssognathus

寄 主：黃毛鼠(*Rattus rattoides exiguus* Howell)、針毛鼠、臭鼩、黑家鼠。

分 佈：福建、雲南、四川、湖北；越南。

Tricholaelaps typhlomydis Gu et Shen 豬尾鼠毛厲蟎 (Gu et Shen, 1981:276)

Tricholaelaps typhlomydis Gu et Shen, 1981:276-277.

寄 主：豬尾鼠(*Typhlomus cinereus* ssp.)。

分 佈：貴州(綏陽)。

Tylolaelaps rhizomydis Gu et Wang 竹鼠疣厲蟎 (Gu et Wang, 1979:63)

Tylolaelaps rhizomydis Gu et Wang, 1979:63-64.

寄 主：白花竹鼠(*Rhizomys pruinosus latouchei* Thomas, 1915)。

分 佈：廣西、貴州。

Hirstionyssidae 赫刺蟎科

Hirtionyssus ansaiensis Huang 安塞赫刺蟎 (Huang, 1990:307)

Hirtionyssus ansaiensis Huang, 1990:307-308.

寄 主：中華鼢鼠(*Myospalax fontanieri* Milne-Edwards)。

分 佈：陝西(安塞縣龍石頭)。

Hirtionyssus butantanensis (Fonseca) 布坦赫刺蟎 (Huang, 1990:305)

別 名：*鼷鼠赫刺蟎*(*Hirtionyssus musculi* (Johnston))。

寄 主：大倉鼠(*Cricetulus triton*)、長毛倉鼠(*Cricetulus longicaudatus*)、小家鼠(*Mus musculus*)、褐家鼠(*Rattus norvegicus*)、黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)。

分 佈：陝西(秦嶺以北各地)。

Hirtionyssus citelli Huang 黃鼠赫刺蟎 (Huang, 1990:308)

Hirtionyssus citelli Huang, 1990:308-309.

寄 主：達烏爾黃鼠(*Citellus dauricus* Brande)。

分 佈：陝西(定邊縣)。

Hirstionyssus confucianus (Hirst) 社鼠赫刺蟎 (Huang, 1990:305)

寄 主：中華鼢鼠。

分 佈：陝西(榆林縣)。

Hirstionyssus criceti (Sulzer) 倉鼠赫刺蟎 (Deng et al., 1989:47; Huang, 1990:306)

寄 主：大倉鼠(*Cricetulus tritan* de Winton)、達烏爾黃鼠、棕背䶄、紅背䶄等。

分 佈：陝西、山西、河北、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蘇聯、德國。

Hirstionyssus huanglungensis Liu et Yuan 黃龍赫刺蟎 (Huang, 1990:306)

Hirstionyssus huanglungensis Liu et Yuan

寄 主：中華鼢鼠、羅氏鼢鼠(*M. rothschildi*)。

分 佈：陝西。

Hirstionyssus isabellinus (Oudemans) 淡黃赫刺蟎 (Huang, 1990:306)

寄 主：東方田鼠(*Microtus fortis*)、黑線姬鼠、大倉鼠、根田鼠(*Microtus oeconomus*)。

分 佈：陝西。

Hirstionyssus montanus Huang 山區赫刺蟎 (Huang, 1990:309)

Hirstionyssus montanus Huang, 1990:309-311.

寄 主：中華鼢鼠(*Myospalax fontanierii* Milne-Edwards)、羅氏鼢鼠(*Myospalax rothschildi*)。

分 佈：陝西。

Hirstionyssus musculi (Johnston) 鼷鼠赫刺蟎 (Deng et al., 1989:47)

寄 主：黑家鼠、小家鼠、東方田鼠、大倉鼠、黑線倉鼠等。

分 佈：青海、山西、河北、新疆、遼寧、吉林、黑龍江；蘇聯。

Hirstionyssus mustelae Teng et Pan 鼬赫刺蟎 (Deng et al., 1989:48)

寄 主：艾虎、草原鼢鼠、東北鼢鼠、黑線倉鼠等。

分 佈：內蒙古、吉林、黑龍江。

Hirstionyssus ochotonae Lange et Petrova 鼠兔赫刺蟎 (Huang, 1990:306; Teng, 1996:319)

Hirstionyssus ochotonae Lange et Petrova, 1958:

寄 主：拉達克鼠兔(*Ochotona ladacensis* Günther)、藏鼠兔(*Ochotona thibetana*)、根田鼠。

分 佈：西藏、四川、陝西、青海；蘇聯。

Hirstionyssus selliformis Liu 鞍形赫刺蟎 (Huang, 1990:306)

Hirstionyssus selliformis Liu

寄 主：中華鼢鼠。

分 佈：陝西。

Hirstionyssus shensiensis Liu et Yuan 陝西赫刺蟎 (Huang, 1990:306)

Hirstionyssus shensiensis Liu et Yuan

寄 主：中華鼢鼠。

分 佈：陝西。

Hirstionyssus sunci Wang 鼩鼱赫刺蟎 (Deng et al., 1989:47; Huang, 1990:306)

=*Hirstionyssus sinicus* Teng et Pan, 1962:

寄 主：黑線倉鼠、大倉鼠、黑線姬鼠、林姬鼠(*Apodemus sylvaticus*)、大林姬鼠(*Apodemus speciosus*)、大耳姬鼠、褐家鼠、大足鼠(*Rattus nitidus*)、黃胸鼠(*Rattus flavipectus*)、社鼠(*Rattus niviventer*)、小家鼠、白腹巨鼠、施氏屋頂鼠、柯嵐絨鼠(*Eothenomys inez*)、臭鼩(*Suncus murinus*)等。

分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、陝西、河北、遼寧、黑龍江；日本、蘇聯。

Hirstionyssus transiliensis neimongkuensis Yao 內蒙伊赫刺蟎 (Huang, 1990:306)

Hirstionyssus transiliensis neimongkuensis Yao

寄 主：長爪砂鼠(*Meriones unguiculatus*)。

分 佈：陝西。

Hirstionyssus trogopteri Teng et Pan 鼯鼠赫刺蟎 (Gu et Wang, 1980:47)

Hirstionyssus trogopteri Teng et Pan,,1962:

寄 主：高山鼯鼠(*Trogopterus xanthipes xanthipes* Milne-Edwards)、小鼯鼠(*Petaurista elegans* ssp.)。

分 佈：廣西、四川。

Hirstionyssus zaisanica Senothusova 齋桑赫刺蟎 (Huang, 1990:306)

Hirstionyssus zaisanica Senothusova

寄 主：三趾跳鼠(*Dipus sagitta*)、小毛足鼠(*Phodopus roborovskii*)。

分 佈：陝西。

Haemogamasidae 血革蟎科

Eulaelaps cricetuli Vitzthum 倉鼠真厲蟎 (Pan et Teng, 1980:75)

寄 主：黑線倉鼠、五趾跳鼠、長爪沙鼠、背紋牛蹠鼠、黑線姬鼠、大林姬鼠、達烏爾黃鼠、大倉鼠、子午沙鼠、羽尾跳鼠、小毛足鼠。

分 佈：青海、山西、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蘇聯。

Eulaelaps dongfangis Wen 東方真厲蟎 (Pan et Teng, 1980:76)

寄 主：黑線姬鼠、黑線倉鼠、灰倉鼠、大倉鼠窩。

分 佈：浙江、安徽、河南、山東、山西、河北、遼寧、吉林、黑龍江。

Eulaelaps heptacanthus Yang et Gu 七棘真厲蟎 (Yang et Gu, 1985:55)

Eulaelaps heptacanthus Yang et Gu, 1985:55-56.

寄 主：子午沙土鼠(*Meriones meridianus* Pallas)。

分 佈：青海(海西州烏蘭縣)。

Eulaelaps huzhuensis Yang et Gu 互助真厲蟎 (Yang et Gu, 1985:57)

Eulaelaps huzhuensis Yang et Gu, 1985:57-58.

寄 主：大林姬鼠(*Apodemus speciosus* Temminck)、小鼯鼠(*Pteromys volans* Linnaeus)、長尾倉鼠(*Cricetulus longicaudatus* Milne-Edwards)。
分 佈：青海(互助縣、湟中縣)。

Eulaelaps novus Vitzthum 新真厲蟎 (Pan et Teng, 1980:75)
=*Eulaelaps kolpakovae* Bregetova
寄 主：背紋毛蹠鼠、布氏田鼠、五趾跳鼠、達烏爾黃鼠、沙鼠。
分 佈：河北、內蒙古、黑龍江；蘇聯、德國、英國。

Eulaelaps pratentis Zhou 草原真厲蟎 (Zhou, 1981:387)
Eulaelaps pratentis Zhou, 1981:287.
寄 主：鼠巢。
分 佈：四川(若爾蓋縣)、黑龍江。

Eulaelaps silvestris Zhou 森林真厲蟎 (Zhou, 1981:386)
Eulaelaps silvestris Zhou, 1981:386-387.
寄 主：高山姬鼠(*Apodemus chevieri* Milne-Edwards)、社鼠(*Rattus niviventer* Hodgson)、白腹鼠(*Rattis cpxomgo* Swinhoe)。
分 佈：四川(黑水縣)。

Eulaelaps sinensis Tian 中華真厲蟎 (Tian, 1990:454)
Eulaelaps sinensis Tian, 1990:454-455.
寄 主：小林姬鼠(*Apodemus sylvaticus orestes* Thomas)。
分 佈：雲南(景東縣哀牢山自然保護區)。

Eulaelaps stabularis (Koch) 廄真厲蟎 (Pan et Teng, 1980:77)
寄 主：黃毛鼠、黃胸鼠、褐家鼠、黑線姬鼠、黑線倉鼠、大倉鼠、米、米糠。
分 佈：全國大多數省份；朝鮮、日本、蘇聯、歐洲、北非、北美。

Eulaelaps stabularis ssp. 廄真厲蟎 (Teng, 1982:464)
Eulaelaps stabularis ssp. Teng, 1982:464.
Eulaelaps stabularis (Koch, 1836)
寄 主：鼠洞、根田鼠(*Microtus oeconomus* Pallas)、喜馬拉雅旱獺(*Marmota himalayana* Hodgson)。
分 佈：西藏(察隅)、青海(河南)。

Eulaelaps substabularis Yang et Gu 擬廄真厲蟎 (Yang et Gu, 1986:391)
Eulaelaps substabularis Yang et Gu, 1986:391-392.
寄 主：間顱鼠兔(*Ochotona cansus* Lyon)、大林姬鼠(*Apodemus speciosus* Temmick)、松田鼠(*Pitymys rene* Thomas)。
分 佈：青海。

Haemogamasus ambulans (Thorell) 按步血革蟎 (Pan et Teng, 1980:70)

寄 主：棕背鼴、紅背鼴、沼澤田鼠、莫氏田鼠、黑線倉鼠、長尾倉鼠、黑線姬鼠、草原鼢鼠、東北鼢鼠。
分 佈：青海、內蒙古、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、歐洲、北美。

Haemogamasus concavus Teng et Pan 凹胸血革蟎 (Pan et Teng, 1980:71; Teng, 1982:462)
寄 主：鼠兔(*Ochotona* sp.)。
分 佈：西藏(亞東)。

Haemogamasus daliensis Tian 大理血革蟎 (Tian, 1990:453)
Haemogamasus daliensis Tian, 1990:453-454.
寄 主：西南絨鼠(*Eothenomys custos* Thomas)。
分 佈：雲南(大理蒼山)。

Haemogamasus dauricus Bregetova 達呼爾血革蟎 (Pan et Teng, 1980:66; Yang et Gu, 1985:53)
Haemogamasus dauricus Bregetova, 1950:
寄 主：根田鼠(*Microtus oeconomus* Pallas)、間顱鼠兔(*Ochotona cansus* Lyon)、褐家鼠、紅背鼴、東北鼢鼠、草原鼢鼠。
分 佈：四川、青海(河南)、吉林；蘇聯。

Haemogamasus dorsalis Teng et Pan 背穎血革蟎 (Pan et Teng, 1980:68)
寄 主：白腹巨鼠、林姬鼠。
分 佈：雲南、四川。

Haemogamasus emeiensis Zhou 峨嵋血革蟎 (Zhou, 1981:383)
Haemogamasus emeiensis Zhou, 1981:383-384.
寄 主：四川短尾鼩(*Anourosorex squamipes* Milne-Edwards)。
分 佈：四川(峨嵋山)。

Haemogamasus gongshanensis Tian et Gu 貢山血革蟎 (Tian et Gu, 1989:177)
Haemogamasus gongshanensis Tian et Gu, 1989:177-179.
寄 主：多齒鼩鼹(*Nasillus gracilis* Thomas)。
分 佈：雲南(貢山縣)。

Haemogamasus gui Tian 顧氏血革蟎 (Tian, 1990:313)
Haemogamasus gui Tian, 1990:313-315.
寄 主：小林姬鼠(四串亞種)(*Apodemus sylvaticus orestes* Thomas)。
分 佈：雲南(景東縣)。

Haemogamasus hodosi Buiakova et Goncharova 荷血革蟎 (Teng, 1982:463)
寄 主：鼠兔(*Ochotona* sp.)、旱獺(*Marmota sibirica*)巢穴內。
分 佈：西藏(亞東)；西伯利亞。

Haemogamasus huangzhongensis Yang et Gu 湟中血革蟎 (Yang et Gu, 1986:389)

Haemogamasus huangzhongensis Yang et Gu, 1986:389-391.
寄 主：達烏爾黃鼠(*Citellus dauricus* Brande)巢中。
分 佈：青海(湟中縣總寨地區)。

Haemogamasus kitanoi Asanuma 北野血革蟎 (Pan et Teng, 1980:69; Yang et Gu, 1985:53)
Haemogamasus kitanoi Asanuma, 1948:
寄 主：長尾倉鼠(*Cricetulus longicaudatus* Milne-Edwards)、三趾跳鼠、子午沙鼠、長爪沙鼠、背紋毛蹠鼠、布氏田鼠、飛鼠、旱獺、達烏爾鼠兔、東北鼢鼠。
分 佈：四川、青海(湟中縣)、內蒙古、吉林、黑龍江；蘇聯。

Haemogamasus kusumotoi Asanuma 楠本血革蟎(Pan et Teng, 1980:71)
寄 主：褐家鼠、小家鼠、黑線姬鼠、黑線倉鼠、大林姬鼠、草原鼢鼠
分 分：河北、吉林、黑龍江；蘇聯。

Haemogamasus liponyssoides Ewing 脂刺血革蟎 (Pan et Teng, 1980:61)
Haemogamasus liponyssoides Ewing, 1925:
寄 主：沼澤田鼠、莫氏田鼠、黑線姬鼠、黑線倉鼠、大林姬鼠、棕北鼩、紅背鼩、東北鼢鼠、草原鼢鼠、小毛蹠鼠(*Phodopus roborowskii* Satunin)
分 佈：內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、蘇聯、歐洲、加拿大、美國。

Haemogamasus mandschuricus Vitzthum 東北血革蟎 (Pan et Teng, 1980:73; Yang et Gu, 1985:53)
Haemogamasus mandschuricus Vitzthum, 1930:
寄 主：喜馬拉雅旱獺(*Marmota himalayana* Hodgson)、高原鼢鼠(*Myospalax bailcyi* Thomas)、香鼬(*Mustela altaica* Pallas)、長毛倉鼠(*Cricetulus longicaudatus* Milne-Edwards)、黑線倉鼠、五趾跳鼠、長爪沙鼠、布氏田鼠、沼澤田鼠、大倉鼠、達烏爾黃鼠、三趾跳鼠、黑線姬鼠、小毛足鼠、東北鼢鼠、草原鼢鼠。
分 佈：青海(河南、湟中)、甘肅、山西、河北、內蒙古、吉林、黑龍江；日本、蘇聯。

Haemogamasus monticola Wang 山區血革蟎 (Pan et Teng, 1980:62)
寄 主：黃毛鼠。
分 佈：福建。

Haemogamasus nanpingensis Zhou et al. 南平血革蟎 (Zhou et al., 1982:388)
Haemogamasus nanpingensis Zhou et al., 1982:388-389.
寄 主：鼩鼴(*Uropsilus soricipes* Milne-Edwards)。
分 佈：四川(南坪縣九寨溝)。

Haemogamasus nidiformes Bregetova 巢仿血革蟎 (Pan et Teng, 1980:67; Yang et Gu, 1985:53)
Haemogamasus nidiformes Bregetova, 1955:
寄 主：香鼬(*Mustela altaica* Pallas)、間顱兔(*Ochotona cansus* Lyon)、棕背鼩。
分 佈：青海(河南)、吉林；蘇聯。

Haemogamasus oliviformis Teng et Pan 橄形血革蟎 (Pan et Teng, 1980:66)
寄 主：大耳姬鼠、黑線姬鼠、白腹巨鼠、褐家鼠。
分 佈：雲南、四川。

Haemogamasus paradauricus Teng et Pan 擬達呼爾血革蟎 (Pan et Teng, 1980:74)
寄 主：棕背鼮。
分 佈：吉林。

Haemogamasus parascaptoris Wang et Li 白尾鼴血革蟎 (Pan et Teng, 1980:60)
寄 主：白尾鼴。
分 佈：雲南。

Haemogamasus pingi Chang 秉氏血革蟎 (Pan et Teng, 1980:68; Yang et Gu, 1985:53)
Haemogamasus pingi Chang, 1964:
寄 主：高原鼢鼠(*Myospalax bailcyi* Thomas)、中華鼢鼠。
分 佈：湖北、青海(海晏縣)。

Haemogamasus pontiger (Berlese) 拱胸血革蟎 (Pan et Teng, 1980:60)
寄 主：黑家鼠巢。
分 佈：湖南、安徽；蘇聯、歐洲、北美、非洲和大洋洲一些國家。

Haemogamasus qinghaiensis Yang et Gu 青海血革蟎 (Yang et Gu, 1985:54; Yang et al., 1993:253)
Haemogamasus qinghaiensis Yang et Gu, 1985:54-55.
寄 主：高原鼢鼠(*Myospalax bailcyi* Thomas)。
分 佈：青海(黃南州河南)。

Haemogamasus quadratus Teng et Pan 方形血革蟎 (Pan et Teng, 1980:64)
寄 主：黃毛鼠。
分 佈：雲南。

Haemogamasus quadrisetatus Vitzthum 四毛血革蟎 (Pan et Teng, 1980:61)
寄 主：社鼠巢。
分 佈：雲南、河北；日本、印尼。

Haemogamasus serdjukovae Bregetova 賽血革蟎 (Pan et Teng, 1980:63)
寄 主：棕背鼮、紅背鼮、大耳姬鼠、沼澤田鼠、社鼠、黑線倉鼠、花鼠、東北鼢鼠、草原鼢鼠。
分 佈：四川、青海、山西、河北、遼寧、吉林、黑龍江；蘇聯。

Haemogamasus szechwanensis Chang 四川血革蟎 (Pan et Teng, 1980:65)
寄 主：田鼠。
分 佈：四川。

Haemogamasus tangkeensis Zhou 唐克血革蟎 (Zhou, 1981:384)

Haemogamasus tangkeensis Zhou, 1981:384-386.

寄 主：中華鼢鼠(*Myospalax fontanierii* Milen-Edwards)、喜馬拉雅旱獺(*Marmota bobak himalayana* Hodgson)、藏鼠兔(*Ochotona thibetana* Milne-Edwards)。

分 佈：四川(若爾蓋縣)。

Haemogamasus trapezpideus Teng et Pan 梯形血革蟎 (Pan et Teng, 1980:72)

寄 主：白腹巨鼠。

分 佈：四川。

Haemogamasus zachvatkini altaicus Zemakaya et Piont-kovskaya 阿爾泰札血革蟎 (Pan et Teng, 1980:63)

寄 主：艾虎、東北鼢鼠、草原鼢鼠。

分 佈：遼寧、吉林；蘇聯。

Spinturnicidae 蝠蟎科

Ancystropus zeleborii Kolenati 澤距蟎 (Pan et Teng, 1980:122; Pang et Teng, 1973:84)

Ancystropus zeleborii Kolenati, 1856:

寄 主：犬蝠(*Cynopterus sphinx sphinx*)。

分 佈：福建(鼓浪嶼)；東洋區、非洲區。

Eyndhovenia brachypus Sun et al. 短足埃蟎 (Sun et al., 1986:`94)

Eyndhovenia brachypus Sun et al., 1986:194-196.

寄 主：魯氏菊頭蝠(*Rhinolophus rouxi*)。

分 佈：福建(武夷山三港)。

Eyndhovenia euryalis (Canestrini) 寬埃蟎 (Pang et Teng, 1973:85; Wang, et al., 1986:314)

Eyndhovenia euryalis (Canestrini, 1844:)

寄 主：魯氏菊頭蝠(*Rhinolophus rouxi sinicus*)。

分 佈：福建(崇安)；東洋區、非洲區、古北區。

Meristaspis lateralis (Kolenati) 側裂蟎 (Pan et Teng, 1980:121; Pang et Teng, 1973:84)

Meristaspis lateralis (Kolenati, 1856)

寄 主：蝙蝠。

分 佈：北京；東洋區、非洲區。

Paraperiglischrus analis Pan et Teng 肛擬弱蟎 (Pan et Teng, 1980:116; Pang et Teng, 1973:83)

Paraperiglischrus analis Pang et Teng, 1973:83.

寄 主：普氏蹄蝠(*Hipposideros pratti pratti*)。

分 佈：福建(南平)。

Paraperiglischrus rhinolophinus (Koch) 里擬弱蟎 (Pan et Teng, 1980:117; Pang et Teng, 1973:84)

Paraperiglischrus rhinolophinus (Koch, 1841)

寄 主：魯氏菊頭蝠(*Rhinolophus rouxi sinicus*)。

分 佈：福建(龍巖)；日本、印度、埃及、荷蘭、非洲。

Paraperiglischrus strandtmanni Baker et Delfinado (Pang et Teng, 1973:82)

寄 主：

分 佈：

Sinolaelaps wuyiensis Wang 武夷華厲蟎 (Wang, 1982:64)

Sinolaelaps wuyiensis Wang, 1982:64-65.

寄 主：豬尾鼠(*Typhlomys cinereus cinereus*)。

分 佈：福建(挂墩)。

Spinturnix acuminatus (Koch) 尖蝠蟎 (Gu et Wang, 1984:167; Pan et Teng, 1980:120; Pang et Teng, 1973:86; Teng, 1981:465)

Spinturnix acuminatus (Koch, 1836:)

寄 主：大黃蝠(*Scotophilus heathii*)。

分 佈：雲南(西雙版納)；印尼、斯里蘭卡、德國、英國、丹麥。

Spinturnix bevisetosus Gu et Wang 短毛蝠蟎 (Wang et Wang, 1984:165)

Spinturnix bevisetosus Gu et Wang, 1984:165-167.

寄 主：蝙蝠。

分 佈：貴州(從江縣)。

Spinturnix kolenatii Oudemans 柯氏蝠蟎 (Gu et Wang, 1984:167; Pang et Teng, 1973:82)

寄 主：

分 佈：臺灣。

Spinturnix myoti (Kolenati) 鼠耳蝠蟎 (Gu et Wang, 1984:163)

Spinturnix myoti (Kolenati, 1856)

寄 主：大鼠耳蝠華南亞種(*Myotis myotis chinensis* (Tomes))，歐美各地寄主有：*Myotis myotis myotis, Myotis nattereri, Myotis daubentoni* 及 *M. capaccinii* 鼠耳蝠。

分 佈：貴州(興義縣)。

Spinturnix plecotinus (C. L. Coch) 大耳蝠蟎 (Gu et al., 1986:336)

寄 主：大耳蝠(*Plecotus auritus* Linnaeus)。

分 佈：寧夏(海原縣)。

Spinturnix psi (Kolenati) 賽蝠蟎 (Gu et Wang, 1984:167; Pan et Teng, 1980:119; Pang et Teng, 1973:86; Teng, 1981:465)

Spinturnix psi (Kolenati, 1856:)

寄 主：長翼蝠(*Miniopterus shreibersii fulifinosus*)、長翼蝠(*Miniopterus schreibersii chinensis*)。

分 佈：臺灣、福建、河北、北京；世界各地。

Spinturnix scuticornis Dusbabek 盾蝠螨 (Gu et Wang, 1984:167; Pan et Teng, 1980:118; Teng, 1981:465)
=*Spinturnix setosus* Pan et Deng
寄 主：鼠耳蝠。
分 佈：福建；阿富汗。

Spinturnix setosus Pang et Teng 毛蝠螨 (Pang et Teng, 1973:85)
Spinturnix setosus Pang et Teng, 1973:85.
寄 主：鼠耳蝠(*Myotis* sp.)。
分 佈：福建(崇安)。

Spinturnix sinicus Gu et Wang 中華蝠螨 (Gu et Wang, 1984:163)
Spinturnix sinicus Gu et Wang, 1984:163-165.
寄 主：長翼南蝠(*Ia longimana* Pen)。
分 佈：貴州(織金縣)。

Spinturnix tibetensis Teng 藏蝠螨 (Gu et Wang, 1984:167; Teng, 1981:465)
Spinturnix tibetensis Teng, 1981:465.
寄 主：蝙蝠。
分 佈：西藏(察隅)。

Dermanyssidae 皮刺螨科

Allodermanyssus sanguineus (Hirst) 血紅異皮螨 (Pan et Teng, 1980:104)
寄 主：鼠兔。
分 佈：青海；蘇聯、非洲、歐洲、北美洲一些國家。

Dermanyssus gallinae (Degeer) 雞皮刺螨 (Pan et Teng, 1980:103)
寄 主：家禽和鳥類。
分 佈：全國多數省份；世界各大洲。

Dermanyssus muris Hirst 鼠皮刺螨 (Pan et Teng, 1980:104)
寄 主：黑家鼠、黃胸鼠、褐家鼠、臭鼩。
分 佈：臺灣、福建、雲南；印度、斯里蘭卡、非洲。

Echinonyssus longisetosus Mo 長毛棘刺螨 (Mo, 1964:445)
Echinonyssus longisetosus Mo, 1964:445.
寄 主：海南樹鼩(*Tupaia belangeri modesta* Allen, 1906) 。
分 佈：海南(吊羅山)。

Echinonyssus nasatus Hirst 鼻棘刺螨 (Pan et Teng, 1980:112)
=*Echinonyssus longisetosus* Mo, 1964:

寄 主：樹鼩。
分 佈：廣東、雲南；越南、馬來西亞。

Hirstionyssus callosciuri Bregetova et Grokhovskaya 越中赫刺蟎 (Pan et Teng, 1980:85; Teng et Pan, 1963:670)
Hirstionyssus calloseiuri Bregetova et Grokhovskaja, 1961:228.
寄 主：紅腹松鼠(*Callosciurus erythraeus erythraeus, Callosciurus erythraeus imitator*)、巨松鼠。
分 佈：雲南；越南。

Hirstionyssus confucianus (Hirst) 社鼠赫刺蟎 (Pan et Teng, 1980:95; Teng et Pan, 1963:671)
=*Liponyssus berlesei* Hirst, 1921:362. *nec* Canestrini, 1888.
Liponyssus confucianus Hirst, 1921:789.
Hirstionyssus confucianus, Fonseca, 1948:297.
寄 主：鼢鼠(*Myospalax scansus, M. psilurus, M. dybowskit*)、鼴鼠。
分 佈：陝西、河北、遼寧、吉林；蘇聯(遠東地區)。

Hirstionyssus criceti (Sulzer) 倉鼠赫刺蟎 (Pan et Teng, 1980:93; Teng et Pan, 1963:671)
Acarus criceti Sulzer, 1774:33.
Hirstionyssus criceti, Zemaskaja, 1955:360.
寄 主：黃鼠(*Citellus citellus, C. major, C. pygmaeus, C. suslicus*)、倉鼠(*Cricetulus barabensis, C. triton*)、原倉鼠(*Cricetus auratus, C. cricetus, C. eversmanni*)、田鼠(*Microtus* sp.)、奚鼠(*Mus musculus*)、褐家鼠(*Rattus norvegicus*)、達烏爾黃鼠、棕背鼮、紅背鼮。
分 佈：山西、河北、北京、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蘇聯、德國。

Hirstionyssus gansuensis Ma et Piao 甘肅赫刺蟎 (Ma et Piao, 1987:145)
Hirstionyssus gansuensis Ma et Piao, 1987:145.
寄 主：中華鼢鼠(*Myospalax fontanieri* Milne-Edwards)。
分 佈：甘肅。

Hirstionyssus geogicus Bregetova 喬治亞赫刺蟎 (Pan et Teng, 1980:97)
寄 主：鼢鼠。
分 佈：山西、河北；蘇聯。

Hirstionyssus huangheensis Ma et Piao 黃河赫刺蟎 (Ma et Piao, 1987:146)
Hirstionyssus huangheensis Ma et Piao, 1987:146.
寄 主：喜馬拉雅旱獺(*Marmota himalayana* Hodgson)。
分 佈：甘肅。

Hirstionyssus huanglungensis Liu et Yuan 黃龍赫刺蟎 (Pan et Teng, 1980:84)
寄 主：鼢鼠。
分 佈：陝西。

Hirstionyssus hupehensis Hsu et Ma 湖北赫刺蟎 (Pan et Teng, 1980:81)

寄 主：黑線姬鼠、沼澤田鼠。

分 佈：湖北。

Hirstionyssus hwanglungensis Liu et Yüan 黃龍赫刺蟎 (Teng et Pan, 1963:671)

Hirstionyssus hwanlungensis Liu et Yüan, 1963:435.

寄 主：東北鼢鼠(*Myospalax psilurus*)。

分 佈：陝西。

Hirstionyssus indosinensis Bregetova et Grokhovskaja 中印赫刺蟎 (Pan et Teng, 1980:84; Teng et Pan, 63:671)

Hirstionyssus indosinensis Bregetova et Grokhovskaja, 1961:231.

寄 主：鼠(*Rattus rattus flavipectus, R. sabanus* spp.?)、臭鼩(*Suncus murinus*)、紅腹松鼠(*Callosciurus macelellandi, C. swinhoei*)、明紋花松鼠、隱紋花松鼠。

分 佈：雲南；越南。

Hirstionyssus isabellinus (Oudemans) 淡黃赫刺蟎 (Pan et Teng, 1980:82; Teng et Pan, 1963:671)

Liponyssus isabellinus Oudemans, 1913:384.

Hirstionyssus isabellinus, Fonseca, 1948:297.

=*Hirstionyssus arvicolae* Zemskaja, 1955:366.

寄 主：姬鼠(*Apodemus agrarius, A. flavicollis, Apodemus sylvaticus*)、水䶄(*Arvicola terrestris, A. amphibius*)、䶄(*Clethrionomys rufocanus, C. rutilus*)、黑線倉鼠(*Croceti;is barabemsos*)、花鼠(*Eutamias sibiricus*)、兔尾鼠(*Lagurus curtatus*)、旅鼠(*Lemmus lemmus*)、田鼠(*Microtus arvalis, M. fortis, M. montaunus, M. oeconomus, M. pennsylvanicus*)、奚鼠(*Mus musculus*)、鼬(*Mustela erminca, M. nivalis, M.* sp.)、巢鼠(*Micromys minutus*)、麝鼠(*Ondatra zibethica*)、褐家鼠(*Rattus norvegicus, Rattus norvegicus earaco*)、晏鼠(*Talpa europaea*)。

分 佈：內蒙古、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、德國、荷蘭、英國、加拿大、美國。

Hirstionyssus kirinensis Cheng et al. 吉林赫刺蟎 (Pan et Treng, 1980:99)

寄 主：東北鼢鼠。

分 佈：吉林。

Hirstionyssus laterispinatus Ma et Piao 側刺赫刺蟎 (Ma et Piao, 1987:149)

Hirstionyssus laterispinatus Ma et Piao, 1987:149.

寄 主：中華鼢鼠(*Myospalax fontanieri* Milne-Edwards)。

分 佈：甘肅。

Hirstionyssus microti Hsu et Ma 田鼠赫刺蟎 (Pan et Teng, 1980:91)

寄 主：沼澤田鼠。

分 佈：湖北。

Hirstionyssus minor Zemskaja et Piontkovskaja 小型赫刺蟎 (Teng et Pan, 1963:671)

Hirstionyssus minor Zemskaja et Piontkovskaja, 1957:44.

寄 主：鼢鼠(*Myospalax myospalax, M. aspalas*)(巢內)。

分 佈：吉林；蘇聯(哈薩克斯坦)。

Hirstionyssus musculi (Johston) 鼷鼠赫刺蟎 (Pan et Teng, 1980:94; Teng et Pan, 1963:671)

Dermanyssus musculi Johston, 1849:3654. (*nec* Koch, 1836)

Hirstionyssus musculi, 1953:329.

寄 主：姬鼠(*Apodemus agratius, A. speciosus, A. sylvaticus*)、倉鼠(*Cricetulus migratorius, C.* sp.)、棕背䶄(*Clethrionomys rufocanus*)、狹顱田鼠(*Microtus gregalis*)、沼澤田鼠、巢鼠(*Micromys minutus*)、鼠(*Rattus norvegicus caraco, R. turkestanicus*)。

分 佈：山西、河北、青海、新疆、遼寧、吉林、黑龍江；蘇聯。

Hirstionyssus mustelae Teng et Pan 鼬赫刺蟎 (Pan et Teng, 1980:98; Teng et Pan, 1963:672, 673)

Hirstionyssus mustelae Teng et Pan, 1963:673.

=*Histionyssu pontiger* Wang et al., 1965:

寄 主：艾虎(*Mustela putorius* Linnaeus)、草原鼢鼠、東北鼢鼠、黑線倉鼠。

分 佈：內蒙古、吉林、黑龍江。

Hirstionyssus myospalacis Zemskaja et Piontkovskaja 鼢鼠赫刺蟎 (Teng et Pan, 1963:672)

Hirstionyssus myospalacis Zemskaja et Piontkovskaja, 1957:39.

寄 主：鼢鼠(*Myospalax myospalax, M. aspalax*)。

分 佈：吉林；蘇聯(哈薩克斯坦)。

Hirstionyssus neosinicus Teng et Pan 新華赫刺蟎 (Teng et Pan, 1962:280; 1963:672)

Hirstionyssus neosinicus Teng et Pan, 1962:280.

寄 主：白腹鼠(*Rattus coxingi andersoni* Thomas)、社鼠(*Rattus niviventer confucianus* Milne-Edwards)、大耳林姬鼠(*Apodemus flavicolis latronum* Thomas)。

分 佈：四川。

Hirstionyssus ochotonae Lange et Petrova 鼠兔赫刺蟎 (Pan et Teng, 1980:88; Teng, 1982:464; Teng et Pan, 1963: 672)

Hirstionyssus ochotonae Lange et Petrova, 1958:216.

寄 主：鼠兔(*Ochotona* sp.)、紅耳鼠兔(*Ochotona rutila*)、黃鼬(*Mustela sibirica*)。

分 佈：西藏(亞東)、四川、青海；蘇聯(中亞地區)。

Hirstionyssus pratentis Gu et Yang 草原赫刺蟎 (Gu et Yang, 1986:58)

Hirstionyssus pratentis Gu et Yang, 1986:58-59.

寄 主：中華鼢鼠(*Myospalax fontanieri* Milne-Edwards)。

分 佈：青海(河南)。

Hirstionyssus punctatus Gu et Yang 刻點赫刺蟎 (Gu et Yang, 1986:60)

Hirstionyssus punctatus Gu et Yang, 1986:60-61.

寄 主：根田鼠(*Microtus oeconomus* Pallas)。
分 佈：青海(河南)。

Hirstionyssus qinghaiensis Gu et Yang 青海赫刺螨 (Gu et Yang, 1986:57)

Hirstionyssus qinghaiensis Gu et Yang, 1986:57.
寄 主：根田鼠(*Microtus oeconomus* Pallas)、香鼬(*Mustela altaica* Pallas)。
分 佈：青海(河南)。

Hirstionyssus sciurinus (Hirst) 松鼠赫刺螨 (Pan et Teng, 1980:81; Teng et Pan, 1963:672)

Liponyssus sciurinus Hirst, 1921:785.
Hirstionyssus sciurinus, Fonseca, 1948:298.
寄 主：松鼠(*Scinrus velgaris*)、花鼠(*Eutamias sibiricus*)、灰鼠。
分 佈：黑龍江；蘇聯、法國。

Hirstionyssus selliformis Liu 鞍形赫刺螨 (Pan et Teng, 1980:96)

寄 主：東北鼢鼠。
分 佈：陝西。

Hirstionyssus shensiensis Liu et Yuan 陝西赫刺螨 (Pan et Teng, 1980:98; Teng et Pan, 1963:672)

Hirstionyssus shensiensis Liu et Yuan, 1963:433.
寄 主：東北鼢鼠(*Myospalax psilurus*)。
分 佈：陝西、山西。

Hirstionyssus sinicus Teng et Pan 中華赫刺螨 (Teng et Pan, 1962:278)

Hirstionyssus sinicus Teng et Pan, 1962:278.
寄 主：社鼠(*Rattus niviventer confucianus* Milne-Edwards)、白腹鼠(*Rattus coxingi andersoni* Thomas)、大耳林姬鼠(*Apodemus flavicolis latronum* Thomas)。
分 佈：四川。

Hirstionyssus soricis (Turk) 鼩鼠赫刺螨 (Pan et Teng, 1980:90)

寄 主：鼩鼱。
分 佈：黑龍江；蘇聯、英國。

Hirstionyssus subminor Cheng, et al. 擬小赫刺螨 (Pan et Teng, 1980:95)

寄 主：草原鼢鼠。
分 佈：吉林。

Hirstionyssus sunci Wang 鼩鼱赫刺螨 (Pan et Teng, 1980:92; Teng et Pan, 1963:672)

Hirstionyssus sunci Wang, 1962:413.
=*Hirstionyssus sinicus* Teng et Pan, 1962:278.
=*Hirstionyssus apodemi* Zuevsky, 1970:
寄 主：臭鼩(*Suncus murinus*)、大耳林姬鼠(*Apodemus flavicolis latronum*)、大耳姬鼠、黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)、黑線倉鼠(*Cricetulus barabensis*)、社鼠(*Rattus*

niviventer confucianus)、白腹鼠(*Rattus coxingi andersoni*)、司氏屋頂鼠(*Rattus rattus sladeni*)、褐家鼠(*Rattus norvegicus*)。
分 佈：福建、雲南、四川、浙江、上海、河北、北京、遼寧、黑龍江；日本、蘇聯。

Hirstionyssus szechuanicus Teng et Pan 四川赫刺蟎 (Pan et Teng, 1980:87; Teng et Pan, 1963:672)
Hirstionyssus szechuanicus Teng et Pan, 1963:672, 674-675.
寄 主：花松鼠(隱紋花松鼠)(*Tamiops swinhoei*)。
分 佈：四川。

Hirstionyssus tamiopis Wang 線鼠赫刺蟎 (Pan et Teng, 1980:86; Teng et Pan, 1963:672)
Hirstionyssus tamiopis Wang, 1962:411.
寄 主：花松鼠(*Tamiops swinhoei monticolus*)、隱紋花松鼠華南亞種。
分 佈：福建。

Hirstionyssus transiliensis neimongkuensis Yao 內蒙伊赫刺蟎 (Pan et Teng, 1980:89)
寄 主：黑線倉鼠、長尾倉鼠、布氏田鼠、達烏爾黃鼠、沙鼠。
分 佈：青海、內蒙古、黑龍江。

Hirstionyssus trogopteri Teng et Pan 鼯鼠赫刺蟎 (Pan et Teng, 1980:83; Teng et Pan, 1962:277; 1963:672)
Hirstionyssus trogopteri Teng et Pan, 1962:277.
寄 主：高山鼯鼠(*Trogopterus xanthipes xanthipes* Milne-Edwards)。
分 佈：四川。

Hirstionyssus ventricosus Wang et al. 巨腹赫刺蟎 (Pan et Teng, 1980:80; Teng et Pan, 1963:672)
Hirstionyssus ventricosus Wang et al. 1962:910.
寄 主：草原鼢鼠(*Myospalax aspalax*)、東北鼢鼠。
分 佈：內蒙古、吉林、黑龍江。

Hirstionyssus xinghaiensis Ma et Piao 興海赫刺蟎 (Ma et Piao, 1987:148)
Hirstionyssus xinghaiensis Ma et Piao, 1987:148.
寄 主：中華鼢鼠(*Myospalax fontanieri* Milne-Edwards)。
分 佈：青海。

Langeonyssus tieni Grochovskaya et Nguyen-Xuan-Hoe 田蘭刺蟎 (Pan et Teng, 1980:112)
寄 主：蝙蝠。
分 佈：福建；越南。

Myonyssus ochotonae Chang et Hsü 鼠兔鼠刺蟎 (Pan et Teng, 1980:113)
寄 主：藏鼠兔。
分 佈：湖北。

Myonyssus shibatai Asanuma 柴田鼠刺蟎 (Pan et Teng, 1980:114)
寄 主：高山鼠兔、棕背䶄、沼澤田鼠巢內。

分 佈：吉林、黑龍江。

Ornithonyssus bacoti (Hirst) 柏禽刺螨 (Pan et Teng, 1980:100)
寄 主：褐家鼠、小家鼠。
分 佈：全國各地；世界各大洲。

Ornithonyssus bursa (Berlese) 囊禽刺螨 (Pan et Teng, 1980:102)
寄 主：家禽和鳥類。
分 佈：全國多數省份；世界溫、熱帶地區。

Ornithonyssus sylviarum (Canestrini et Fanzago) 林禽刺螨 (Pan et Teng, 1980:101)
寄 主：家禽、鴟及其他一些鳥類。
分 佈：吉林；朝鮮、日本、蘇聯、歐洲、北美、非洲和大洋洲一些國家。

Pellonyssus stenosternus (Wang) 狹胸膚刺螨 (Pan et Teng, 1980:110)
寄 主：麻雀窩。
分 佈：福建、雲南。

Pellonyssus viator (Hirst) 游旅膚刺螨 (Pan et Teng, 1980:110)
寄 主：家燕。
分 佈：福建；蘇聯、印度、埃及、摩洛哥。

Steatonyssus abramus Wang 伏翼肪刺螨 (Pan et Teng, 1980:107)
寄 主：普通伏翼、大黃蝠。
分 佈：福建、雲南。

Steatonyssus dalianensis Li 大連肪刺螨 (Pan et Teng, 1980:106)
寄 主：普通伏翼。
分 佈：遼寧。

Steatonyssus hsui Li 徐氏肪刺螨 (Pan et Teng, 1980:109)
寄 主：伏翼。
分 佈：廣東。

Steatonyssus longispinosus Wang 長刺肪刺螨 (Pan et Teng, 1980:106)
寄 主：伏翼。
分 佈：福建、江蘇；日本。

Liponyssidae 棘刺螨科

Steatonyssus abramus Wang 伏翼肪刺螨 (Wang, 1963:57)
Steatonyssus abramus Wang, 1863:57.

寄 主：蝙蝠(*Pipistrellus abramus*)。
分 佈：福建(福州)。

Steatonyssus longispinosus Wang 長刺肪刺蟎 (Wang, 1963:58)
Steatonyssus longispinosus Wang, 1963:58.
寄 主：蝙蝠(?)窩內。
分 佈：福建(福州)。

Steatonyssus nyctali Gu et Wang 山蝠肪刺蟎 (Gu et Wang, 1982:49)
Steatonyssus nyctali Gu et Wang, 1982:49-51
寄 主：*Nyctalus noctula* Schreber 山蝠。
分 佈：貴州(貴陽)。

Steatonyssus stenosternus Wang 狹胸肪刺蟎 (Wang, 1963:54)
Steatonyssus stenosternus Wang, 1963:54.
寄 主：麻雀(*Passer montanus*)(窩內)。
分 佈：福建(福清)。

Steatonyssus viator Hirst 遊旅肪刺蟎 (Wang, 1963:56)
Steatonyssus viator Hirst, 1921:
寄 主：家燕(*?Hirundo rustica gutturalis*)。
分 佈：福建(漳州)。

Macronyssidae 巨刺蟎科

Ichoronyssus scutatus (Kolenati) 盾板漿刺蟎 (Gu et Wang, 1985:156)
Ichoronyssus scutatus (Kolenati, 1856)
寄 主：大鼠耳蝠(華南亞種)(*Myotis myotis chinensis* (Tomes))、蝙蝠(*Vespertilio*)、菊頭蝠(*Rhinolophus*)、長翼蝠(*Miniopterus*)。
分 佈：貴州(興義)。

Macronyssus flavus (Kolenati) 黃巨刺蟎 (Gu et Wang, 1985:157)
Macronyssus flavus (Kolenati, 1856)
寄 主：山蝠(*Nyctalus noctula*)。也寄生于鼠耳蝠(*Myotis*)、伏翼(*Pipistrellus*)、蝙蝠(*Vespertilio*)等屬蝙蝠。
分 佈：貴州(從江縣)；日本、蘇聯(遠東地區)、歐洲、北美。

Macronyssus laifengensis Wang et Shi 來鳳巨刺蟎 (Wang et Shi, 1986:55)
Macronyssus laifengensis Wang et Shi, 1986:55.
寄 主：皮氏菊頭蝠(*Rhinolophus pearsoni*)。
分 佈：湖北(鄂西自治州)。

Macronyssus miraspinosus Gu et Wang 異棘巨刺蟎 (Gu et Wang, 1985:157)
Macronyssus miraspinosus Gu et Wang, 1985:157-158.

寄 主：大鼠耳蝠(華南亞種)(*Myotis myotis chinensis* (Tomes))。
分 佈：貴州(興義)。

Macronyssus tashanensis Li et Teng 塔山巨刺蟎 (Li et Teng, 1985:50)
Macronyssus tashanensis Li et Teng, 1985:50-51.
寄 主：馬鐵菊頭蝠(*Rhinolophus ferrumequinum*)。
分 佈：遼寧(錦西塔山)。

Macronyssus zhijinensis Gu et Wang 織金巨刺蟎 (Gu et Wang, 1985:158)
Macronyssus zhijinensis Gu et Wang, 1985:158-159.
寄 主：長翼南蝠(*Ia longimana* Pen)。
分 佈：貴州(織金)。

Varroidae 瓦蟎科

Tropilaelaps clarecae Delfinado et Baker 小蜂蟎 (Huang et al., 1991, 13(2):96-100; Huang et al., 1996, 18(2):83-85; Jiangxi ARI et al., 1975, (20:74-77; Pang et Teng, 1966:158; 1980:48)
Tropilaelaps clarecae Delfinado et Baker, 1961:
寄 主：*Apis mellifera* 蜜蜂
鼠。
分 佈：長江以南蜂場、北京、華北(各地區蜂場)；菲律賓。

Varroa jacobsoni Oudemans 大蜂蟎 (Huang et al., 1991, 13(2):96-100; Huang et al., 1996, 18(2):83-85; Jiangxi ARI et al., 1975, (2):74-77; Lo et Chao, 1975:449; Pang et Teng, 1966:158; Pan et Teng, 1980:49)
寄 主：*Apis mellifera* 蜜蜂。
分 佈：臺灣、中國大陸；馬來西亞、印尼。

Diplogynidae 雙雌蟎科
(Xin, 1988:155)

本科在黑蜣及閻甲 (Histeridae) 以及金龜上極普遍。

Celaenopsidae 黑面蟎科
(Xin, 1988:155)

很多種類與小蠹科有關，曾從小蠹科屬及 *Dendroctonus* 屬的坑道中採得 *Pleuronectocelaeno drymoeceles.*

Euzerconidae 真穴蟎科
(Xin, 1988:155)

與黑蜣有關聯。

Schizogyniidae 縫雌蟎科

(Xin, 1988:155)

與黑蜣及小蠹有關。

Megisthanidae 巨寄蟎科

(Xin, 1988:155)

與黑蜣有關，可能取食黑蜣的腺體分泌物。有些種類在實驗室觀察到取食線蟲、卵及小型昆蟲。

Fedrizziidae 費蟎科

(Xin, 1988:155)

與黑蜣有關。

Klinokowstroemiidae 克林蟎科

(Xin, 1988:155)

與黑蜣有關。

Paramegistidae 副巨蟎科

(Xin, 1988:155)

與黑蜣及步甲有關。

Promegistidae 原巨蟎科

(Xin, 1988:155)

與黑蜣及步甲有關。

Ixodidae 硬蜱科

Amblyomma formosanum Schulze 臺灣花蜱 (Teng, 1978:130)

寄 主：閉殼龜(*Cyclemys* sp.)。
分 佈：臺灣。

Amblyomma geoemydae (Cantor) 嗜龜花蜱 (Teng et Jiang, 1991:282)

Ixodes geoemydae Cantor, 1847:608.
=*Amblyomma malayanum* Neumann, 1908:
=*Amblyomma formosanum* Schulze, 1933:
寄 主：黃緣團殼龜(*Cuora flavoverginata*)(頸部)。
分 佈：臺灣、湖南；日本、菲律賓、馬來西亞、新加坡、泰國、印尼。

Amblyomma hainanensis Teng 海南花蜱 (Teng et Jiang, 1991:187)

Amblyomma hainanensis Teng, 1981:399-401.
寄 主：蛇。
分 佈：海南。

Amblyomma javanense (Supino) 爪哇花蜱 (Teng, 1978:129; Teng et Jiang, 1991:285)
Rhipicephalus javanensis Supino, 1897:233.
=*Amblyomma sublaeve* Neumann, 1899:
寄 主：穿山甲(*Manis pentadactyla*)、蟒蛇(*Python molurus*)、巨蜥(*Varanus salvator*)、龜(*Geoemyda tricarinata*)等爬蟲類。
分 佈：福建、廣東、海南、雲南；菲律賓、越南、柬埔寨、馬來西亞、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼。

Amblyomma testudinarium Koch 龜形花蜱 (Teng, 1978:127; Teng et Jiang, 1991:278)
Amblyomma testudinarium Koch, 1844:226.
=*Amblyomma infestum* Koch, 1844:
=*Amblyomma compactum* Neumann, 1901:
=*Amblyomma fallax* Schulze, 1932:
=*Amblyomma infestum taivanicum* Schulze, 1935:
=*Amblyomma yajimae* Kishida, 1935:
寄 主：水牛、黃牛、馬、山羊、犬、野豬(*Sus* spp.)、鹿(*Cervus* sp.)、虎(*Felis tigris*)、人。
分 佈：臺灣、廣東、雲南、浙江；日本、菲律賓、越南、寮國、柬埔寨、馬來西亞、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼。

Amblyomma yajimai Kishida 龜擬花蜱 (Teng, 1978:131)
寄 主：黃牛(*Bos sinensis*)、水牛(*Bubalus bubalus*)。
分 佈：臺灣。

Anomalohimalaya cricetuli Teng et Huang 倉鼠異扇蜱 (Huang et Teng, 1980:94; Teng et Huang, 1981:99; Teng et Jiang, 1991:340)
Anomalohimalay cricetuli Teng et Huang, 1981:99-102.
寄 主：灰倉鼠(*Cricetulus migratorius* Pallas)。
分 佈：新疆(喀什)。

Anomalohimalaya lama Hoogstraal et al. 喇嘛異扇蜱 (Teng et Jiang, 1991:337)
Anomalohimalaya lama Hoogstraal, Kaiser et Mitchell, 1970:1576-1585.
寄 主：藏倉鼠(*Cricetulus kamensis* Satunin)。
分 佈：西藏；尼泊爾。

Aponomma barbouri Anastos 巴氏盲花蜱 (Teng et Jiang, 1991:294)
Aponomma barbouri Anastos, 1950:121-122.
寄 主：蟒蛇(*Python* sp.)。
分 佈：廣西；印尼。

Aponomma crassipes Neumman 厚體盲花蜱 (Teng et Jiang, 1991:292)

Aponomma crassipes Neumman, 1901:294.

寄 主：穿山甲(*Manis pentdactyla*)、巨蜥(*Varanus salvator*)、黃牛

分 佈：雲南；越南、寮國、泰國。

Aponomma lucasi Warburton 巨蜥盲花蜱 (Teng, 1978:133; Teng et Jiang, 1991:289)

Aponomma lucasi Warburton, 1910:404-407.

寄 主：巨蜥(*Varanus salvator, Varanus* spp.)、蟒蛇、眼鏡蛇。

分 佈：海南、雲南；越南、寮國、柬埔寨、新加坡、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼。

Aponomma pseudolaeve Schulze 僞鈍盲花蜱 (Teng, 1978:135; Teng et Jiang, 1991:292)

Aponomma pseudolaeve Schulze, 1935:327-328.

寄 主：烏蛇(*Zamenis mucosus*)、黃頷蛇(*Coluber phyllophis*)。

分 佈：廣東、浙江。

Boophilus microplus (Canestrini) 微小牛蜱 (Chao, 1952:226; Luh and Woo, 1950:201; Teng, 1978:155; Teng et Jiang, 1991:345)

Haemaphysalis micropla Canestrini, 1887:104-105.

=*Rhicephalus australis* Canestrini, 1887:

=*Rhicephalus annulatus* var. *caudatus* Neumann, 1897:413.

=*Boophilus annulatus* var. *micropla* Neumann, 1901:280.

=*Rhipicephalus annulatus* var. *micropla* Neumann, 1901:318.

=*Boophilus distans* Minning, 1934:25.

=*Boophilus sinensis* Minning, 1934:25-27.

寄 主：牛及其變種(*Bos taurus* var. *kankage*)、水牛(*Bos bubalus*)、犛牛、牦牛、馬(*Equus caballus*)、驢、山羊(*Cupra hircus*)、緬羊(*Ovis argali*)、豬、犬(*Canis familaris*)、貓、水鹿(*Cervus unicolor*)、青羊(*Naemorhedus goral*)、野兔、家雞(*Gallus domesticus*)、鳥類、人。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、遼寧；日本、菲律賓、越南、寮國、柬埔寨、馬來西亞、緬甸、印度、印尼、巴布亞新幾內亞、澳洲、中、南美洲、東非和南非一些國家。

Dermacentor abaensis Teng 阿壩革蜱 (Deng et Cui, 1992:1443; Teng, 1978:118; Teng et Jiang, 1991:265)

Dermacentor abaensis Teng, 1963:225-228.

寄 主：成蜱寄生綿羊、牦牛、黑熊(*Selenarctos thibetanus*)、馬麝(*Moschus sifanicus*)等大型哺乳動物，幼蜱和若蜱寄生林姬鼠(黃喉姬鼠)(*Apodemus flavicolis latronum*)、藏鼠兔(*Ochotona thibetena*)。

分 佈：四川、青海。

Dermacentor asper Arthur 糙盾革蜱 (Teng, 1978:122)

寄 主：刺猬。

分 佈：山東。

Dermacentor auratus Supino 金澤革蜱 (Teng, 1978:122; Teng et Jiang, 1991:270)

Dermacentor auratus Supino, 1897:235.
=*Dermacentor compactus* Neumann, 1901:
=*Dermacentor atrosignatus* Neumann, 1906:
=*Indocentor steini* Schulze, 1933:
=*Indocentor bellulus* Schulze, 1935:
=*Dermacentor bellulus* (Schulze, 1935:

寄 主：成蟲寄生水牛、犬、家豬、野豬 *Sus scrofa*)、豬獾(*Arctonyx collaris*)、黑熊 *Selenarctos thibetanus*)、人；幼蜱和若蜱寄生中、小型動物，包括靈掌類、嚙齒類、食蟲類、食肉類、雞、家雞、鳥類。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南、雲南；菲律賓、寮國、越南、馬來西亞、泰國、緬甸、印度、印尼、巴布亞新幾內亞。

Dermacentor coreus Itagaki et al. 朝鮮革蜱 (Teng, 1978:108; Teng et Jiang, 1991:246)

Dermacentor coreus Itagaki, Noda et Yamaguchi, 1944:87-88.

寄 主：馬、犬、野兔。

分 佈：吉林、黑龍江；朝鮮。

Dermacentor everestianus Hirst 西藏革蜱 (Teng, 1978:120; Teng et Jiang, 1991:269)

Dermacentor everestianus Hirst, 1926:671.
=*Dermacentor birulai* Olenev, 1927:

寄 主：成蜱寄生綿羊、岩羊、犏牛、馬、野兔；幼蜱和若蜱寄生嚙齒類。

分 佈：西藏；尼泊爾。

Dermacentor marginatus (Sulzer) 邊緣革蜱 (Teng, 1978:116; Teng et Jiang, 1991:262))

Acarus marginata Sulzer, 1776:245.

寄 主：成蜱寄生牛、馬、綿羊等；幼蜱和若蜱寄生嚙齒類及小型哺乳動物。

分 佈：新疆；蘇聯、阿富汗、土耳其、敘利亞、伊朗、意大利、西班牙、中歐和北非一些國家。

Dermacentor montanus Filippova et Panova 高山革蜱 (Teng et Jiang, 1991:259)

Dermacentor montanus Filippova et Panova, 1974:470-476.

寄 主：成蜱寄生山羊、綿羊；幼蜱和若蜱寄生嚙齒類，如林姬鼠(*Apodemus sylvaticus*)、高山鼯(*Alticola argentatus*)。

分 佈：新疆；蘇聯(中亞地區)。

Dermacentor niveus Neumann 銀盾革蜱 (Huang et Teng, 1980:93; 1978:112; Teng, 1996:319; Teng et Jiang, 1991:251)

Dermacentor niveus Neumann, 1897:365.
=*Dermacentor reticulatus niveus* Neumann, 1911:
=*Dermacentor niveus* var. *daghestanicus* Olenev, 1929:
=*Dermacentor daghestanicus* Olenev, 1946:

寄 主：成蜱寄生牛、馬、綿羊、山羊、駱駝、騾、鹿、獾等大、中型動物、人，幼蜱和若蜱寄生嚙齒類及刺猬等，如草兔(*Lepus capensis*)、塔里木兔(*Lepus yarkandensis*)，子午沙鼠(*Neruibes neruduabys*)，大耳猬 (*Hemiechinus auritus*)

等。

分 佈：西藏、甘肅、新疆、內蒙古；蒙古、蘇聯、阿富汗、土耳其、伊朗、歐洲和北非一些國家。

Dermacentor nuttalli Olenev 草原革蜱 (Teng, 1978:103; Teng et Jiang, 1991:239)

Dermacentor nuttalli Olenev, 1929:305-314.
=*Dermacentor birulai kukunoriensis* Olenev, 1929:
=*Dermacentor chacassicus* Degtarev, 1934:

寄 主：成蜱寄生牛、馬、駱駝、綿羊、山羊、人、犬、兔；幼蜱和若蜱寄生嚙齒類及小型獸類，如黑線倉鼠(*Cricetulus barabensis*)、草原黃鼠(*Citellus dauricus*)、蒙古兔(*Lepus tolai*)、鼬(艾虎)(*Mustela putorius*)、貓、犬。

分 佈：陝西、河北、北京、青海、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、蒙古、蘇聯。

Dermacentor pavlovskyi Olenev 脛距革蜱 (Teng, 1978:114; Teng et Jiang, 1991:256)

Dermacentor pavlovskyi Olenev, 1927:84-85.

寄 主：成蜱寄生綿羊、山羊、牛、馬、駱駝；幼蜱和若蜱寄生嚙齒類及野兔。

分 佈：新疆；蘇聯(中亞地區)。

Dermacentor reticulatus (Fabricius) 網紋革蜱 (Luh and Woo, 1950:202; Teng et Jiang, 1991:235)

Acarus reticulatus Fabricius, 1794:428.
=*Cynorhaester pictus* Hermann, 1804:64.
=*Ixodes marmoratus* Risso, 1826:183.
=*Crotonus variegatus* Duméril, 1829:402.
=*Dermacentor pardalinus* Koch, 1844:235.
=*Dermacentor albicollis* Koch, 1844:236.
=*Dermacentor ferrugieneus* Koch, 1844:236.
=*Ixodes holstus* Kolenati, 1857:24.
=*Ixodes hungaricus* Karpelles, 1893:43.
Dermacentor reticulatus reticulatus, Neumann, 1911:99.

寄 主：長指蝠(*Minioperus schreibersi*)、葉鼻蝠(*Rhinolophus clivosus*)、土撥鼠(*Marmota* sp.)、兔(*Lepus* sp.)、野兔、刺猬、馬(*Equus caballus*)、牛(*Bos taurus*)、緬羊(*Ovis argali*)、山羊(*Cupra hircus*)、犬、野豬、鹿(*Cervus elaphus, Cervus capraeolus*)、狐、非洲犀牛(*Rhinoceros bicornis*)、河馬(*Hippotamus amphibius*)、豚(*Sus acrofa*)、旱獺(*Arctomy babae*)、人；幼蜱和若蜱寄生嚙齒類、食蟲類和兔類。

分 佈：新疆、內蒙古、東北；朝鮮、日本、蘇聯、波蘭、匈牙利、捷克、羅馬尼亞、南斯拉夫、德國、瑞士、比利時、法國、西班牙、英國、伊朗、土耳其斯坦、非洲。

Dermacentor silvarum Olenev 森林革蜱 (Teng, 1978:106; Teng et Jiang, 1991:243)

Dermacentor silvarum Olenev, 1931:84-85.

寄 主：成蜱寄生牛、馬、山羊、綿羊、豬和大型野生動物、人，幼蜱和若蜱寄生松鼠、花鼠、黑線姬鼠等嚙齒類及野兔、刺猬等小型野生動物、花尾榛雞(*Bonasa bonasia*)、灰頭鵐(*Emberiza spodocephala*)。

分 佈：陝西、山西、河北、北京、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍

江；蒙古、西伯利亞。

Dermacentor sinicus Schulze 中華革蜱 (Teng, 1978:110; Teng et Jiang, 1991:248)

Dermacentor sinicus Schulze, 1931:52-54.
=*Dermacentor sinicus paltidior* Schulze, 1931:
=*Ixodes angutatus* Kishida, 1939:
=*Dermacentor asper* Arthur, 1960:

寄 主：成蜱寄生馬、騾、牛、駱駝、山羊、綿羊、犬、蒙古兔、刺猬，幼蜱和若蜱寄生刺猬及嚙齒類。

分 佈：山東、山西、河北、北京、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Dermacentor taiwanensis Sugimoto 臺灣革蜱 (Teng, 1978:124; Teng et Jiang, 1991:274)

Dermacentor taiwanensis Sugimoto, 1935:1-7.

寄 主：成蜱寄生野豬(*Sus scrofa*)、熊貓、黑熊；幼蜱和若蜱寄生大板齒鼠(*Bandicota indica nemorivaga*)、黃毛鼠(*Rattus losea*)、短耳鼠(*Lepus sinensis*)、鼬獾(*Melogale mosehata subaurantiaca*)、灰胸竹雞(*Bambusicola thoracica*)。

分 佈：臺灣、四川；日本。

Haemaphysalis aborensis Warburton 阿波爾血蜱 (Teng et Jiang, 1991:142)

Haemaphysalis aborensis Warburton, 1913:121-130.

寄 主：成蜱寄生犏牛、豪豬、野豬、虎、赤麂(*Muntiacus muntjok*)、水鹿(*Cervus unicolor*)；幼蜱和若蜱寄原生雞(*Gallus gallus*)、山雀(*Parus monticolus*)、普通樹鼩(*Tupaia glis*)、豬獾(*Arctonyx collaris*)等小型獸類。

分 佈：雲南；越南、寮國、泰國、緬甸、印度、尼泊爾。

Haemaphysalis anomaloceraea Teng 異角血蜱 (Deng et Cui, 1992:1443; Teng et Jiang, 1991:205)

Haemaphysalis anomaloceraea Teng, 1984:37-40.

寄 主：

分 佈：雲南。

Haemaphysalis aponommoides Warburton 長鬚血蜱 (Teng, 1978:97; Teng et Jiang, 1991:112)

Haemaphysalis inermis var. *aponommoides* Warburton, 1913:128-130.

寄 主：黃牛、水牛、犛牛(*Bos grunnicens*)、犏牛、馬、山羊、綿羊、野鹿、蘇門羚(*Capricornis sumatraensis*)、黑熊(*Selenaretos thibetanus*)、犬、人。

分 佈：臺灣、福建、雲南、西藏；印度、尼泊爾、錫金。

Haemaphysalis asiatica (Supino) 亞洲血蜱 (Teng, 1978:87; Teng et Jiang, 1991:226)

Opisthodon asiaticus Supino, 1897:252.
=*Haemaphysalis gestros* (Supino, 1897:
=*Haemaphysalis denupalpis* Warburton et Nuttall, 1909:

寄 主：大靈貓(*Viverra zibetha*)、豹貓(*Felis bengalensis*)。

分 佈：臺灣、雲南；越南、馬來西亞、泰國、緬甸。

Haemaphysalis bandicota Hoogstraal et Kohls 板齒鼠血蜱 (Teng, 1978:93; Teng et Jiang, 1991:221)

Haemaphysalis bandicota Hoogstraal et Kohls, 1965:460-466.
寄 主：皮齒鼠(*Bandicota* sp.)。
分 佈：臺灣；緬甸、泰國。

Haemaphysalis birmaniae Supino 緬甸血蜱 (Teng, 1978:83; Teng et Jiang, 1991:172)
Haemaphysalis birmaniae Supino, 1897:251.
寄 主：赤麂(*Muntiacus muntjak*)、掃尾豪豬(*Atherurus macrourus*)、蘇門羚(*Capricornis sumatraensis*)、犛牛(*Bas grunicus*)等偶蹄類。
分 佈：臺灣、雲南；越南、馬來西亞、緬甸、印度、尼泊爾、斯里蘭卡、印尼。

Haemaphysalis bispinosa Neumann 二刺血蜱 (Chao, 1952:227; Luh and Woo, 1950:205; Teng, 1978:69; Teng et Jiang, 1991:185)
Haemaphysalis bispinosa Neumann, 1897:341-342.
=*Haemaphysalis neumanni* Dönitz, 1905:127-129, 134.
=*Haemaphysalis birmaniae* Neumann, 1911:109. (in part, *nec* Supino, 1897:
寄 主：野兔(*Lepus europeans, Lepus caniculus*)、玄鼠(*Rattus rattus*)、棕鼠(*Rattus norvigricus*)、車鼠(*Mus masculus*)、鼬(*Pulprius arminea, Pulprius vulgaris*)、地鼠(*Talpa* sp.)、猴(*Macacus sinicus*)、人、中國猿(*Macacus sinicus*)、山羊(*Cupra hircus*)、緬羊(*Ovis argali*)、馬(*Equus caballus*)、驢 *Equus asinus*)、黃牛、水牛(*Bos bubalus*)、牛(*Bos taurus*)、豬、鹿(*Cervus* sp.)、中國水鹿(*Hydropotes inermis*)、獐(*Hydropotes inermis*)、野羊(*Hemitrogus hylocius*)、羚羊(*Nemorhaedus cinereus*)、犬(*Canis aureus*)、香狸(靈貓)(*Veverricula malaccensis*)、家貓(*Felis domestica*)、虎(*Felis tigris*)、獅(*Felis leo*)、家雞。
分 佈：臺灣、湖南、江蘇；海參威、越南、寮國、柬埔寨、馬來西亞、緬甸、印度、巴基斯坦、尼泊爾、斯里蘭卡、印尼、新西蘭。

Haemaphysalis campanulata Warburton 鈴頭血蜱 (Chao, 1952:227; Luh et Woo, 1951:206; Teng, 1978:59; Teng et Jiang, 1991:253)
Haemaphysalis campanulata Warburton, 1908:513-514.
=*Haemaphysalis campanulata hoeppliana* Schulze, 1931:
寄 主：鼠(*Rattus* spp.)、牛(*Bos taurus*)、馬(*Equus caballus*)、鹿(*Cervus* sp.)、犬(*Canis familaris*)、貓、家鼠。
分 佈：四川、江蘇、湖北、山東、山西、河北、北京、內蒙古、威海衛；朝鮮、日本、越南、印度。

Haemaphysalis canestrinii (Supino) 坎氏血蜱 (Teng et Jiang, 1991:230)
Opisthodon canestrinii Supino, 1897:237.
寄 主：成蜱寄生大靈貓(*Viverra zibetha*)、小靈貓(*Veverricula indica*)、紅頰獴(*Herpestes auropunciatus*)、豬獾(*Arctonyx collaris*)、緬甸鼬獾(*Melogale personata*)、亞洲胡狼(*Canis aureus*)、孟加拉狐(*Vulpes bengalensis*)、叢林貓(*Pelis chaus*)、漁貓(*Felis viverrina*)、虎(*Panthera tigris*)、豹(*Panthera pardus*)、緬甸兔(*Lepus peguensis*)、原雞(*Gallus gallus*)；若蜱寄生普通樹鼩(*Tupiia glis*)、小靈貓(*Veverricula indica*)、棕櫚松鼠(*Funambulus pennenti*)、小家鼠(*Mus* sp.)、

鼠類(*Rattus* spp.)。

分 佈：臺灣、雲南；越南、泰國、緬甸、印度、尼泊爾、巴基斯坦。

Haemaphysalis concinna Koch 嗜群血蜱 (Teng, 1978:55; Teng et Jiang, 1991:146)

Haemaphysalis concinna Koch, 1844:237-238.

寄 主：成蜱寄生大型哺乳動物(包括有偶蹄類及食肉類)、人；幼蜱和若蜱寄生小型哺乳動物及鳥類。

分 佈：甘肅、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、伊朗、土耳其、波蘭、捷克、保加利亞、南斯拉夫、羅馬尼亞、匈牙利、德國、法國。

Haemaphysalis cornigera Neumann 具角血蜱 (Teng, 1978:85; Teng et Jiang, 1991:206)

Haemaphysalis cornigera Neumann, 1897:350-352.

=*Haemaphysalis cornigera taiwana* Sugimoto, 1936:

寄 主：水牛、黃牛。

分 佈：臺灣、福建、海南、廣西、雲南；菲律賓、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、印尼。

Haemaphysalis danieli Cerne et Hoogstraal 丹氏血蜱 (Teng et Jiang, 1991:124)

Haemaphysalis danieli Cerne et Hoogstraal, 1977:567-574.

=*Haemaphysalis xinjiangensis* Teng, 1980:86-89.

寄 主：野羊、山羊；幼蜱寄生囓齒類。

分 佈：青海、新疆；巴基斯坦、阿富汗。

Haemaphysalis doenitzi Warbuton et Nuttall 鈍刺血蜱 (Teng, 1978:89; Teng et Jiang, 1991:213)

Haemaphysalis doenitzi Warbuton et Nuttall, 1909:64-65.

=*Haemaphysalis centropi* Kohl, 1949:

=*Haemaphysalis weideneri* Sandos Dias, 1958:

寄 主：鷓鴣(*Francolinus piniadeanus*)、鴉鵑(*Centnropus* spp.)、白頭鵯(*Rycnonotus sinensis*)、竹雞(*Bambusicola thoracica*)、華南兔(*Lepus sinensis*)。

分 佈：臺灣、福建、海南、雲南；日本、菲律賓、寮國、馬來西亞、新加坡、泰國、緬甸、印度、尼泊爾、斯里蘭卡、巴布亞新幾內亞、澳洲。

Haemaphysalis erinacei Pavesi 短墊血蜱 (Teng, 1978:61)

Haemaphysalis erinacei Pavesi

=*Haemaphysalis numidiana* Neumann, 1897:

=*Haemaphysalis numidiana turanica* Posplova-Shtrom, 1950:

寄 主：大沙鼠(*Rhombomys opimus*)、艾虎(*Mustela putorius*)、刺猬(*Erinaceus algirus*)。

分 佈：新疆；蘇聯、歐洲及北非一些國家。

Haemaphysalis erinacei turanica Posplova-Strom 短墊血蜱 (Teng et Jiang, 1991:224)

Haemaphysalis numidiana turanica Posplova-Strom, 1939:89.

寄 主：大沙鼠(*Rhombomys opimus*)、達烏爾黃鼠(*Citellus dauricus*)、花鼠(*Eitamias sibiricus*)、艾虎(*Mustela putorius*)。

分 佈：山西、寧夏、新疆；蘇聯、阿富汗、伊朗。

Haemaphysalis flava Neumann 褐黃血蜱 (Teng, 1978:77; Teng et Jiang, 1991:166)
Haemaphysalis flava Neumann, 1897:333-336.
寄 主：豬、豬獾、犬、黃牛、馬、綿羊、錦雞
分 佈：臺灣、四川、江蘇、湖北、甘肅；朝鮮、日本、蘇聯(遠東沿海地區)、越南、印度、斯里蘭卡。

Haemaphysalis formosensis Neumann 臺灣血蜱 (Teng, 1978:81; Teng et Jiang, 1991:139)
Haemaphysalis formosensis Neumann, 1913:134-137.
寄 主：野豬(*Sus scrofa*)、犬。
分 佈：臺灣、福建、海南；日本、菲律賓、越南、緬甸。

Haemaphysalis garhwalensis Dhanda et Bhat 加瓦爾血蜱 (Teng et Jiang, 1991:129)
Haemaphysalis garhwalensis Dhanda et Bhat, 1968:674-678.
寄 主：綿羊。
分 佈：西藏；印度、尼泊爾。

Haemaphysalis goral Hoogstrall 青羊血蜱 (Teng, 1978:84; Teng et Jiang, 1991:169)
寄 主：青羊(*Naemorhedus goral*)。
分 佈：浙江。

Haemaphysalis hystricis Supino 豪豬血蜱 (Teng, 1978:71; Teng et Jiang, 1991:191)
Haemaphysalis hystricis Supino, 1897:251, 252.
=*Haemaphysalis nishiyamai* Suginoto, 1935:
=*Haemaphysalis iwasakii* Sugimoto, 1937:
=*Haemaphysalis trispinosa* Toumanoff, 1941:
=*Haemaphysalis genevrayi* Toumanoff, 1944:
寄 主：犬、水牛、野豬 *Sus scrofa*)、豬獾(*Arctonyx collaris*)、水鹿(*Cervus unicolor*)、小麂(*Muntiacus reevesi*)、豪豬(*Hystrix benglensis*)、黃喉貂(*Martes flaviguta*)、虎(*Felis tigris*)、人。
分 佈：臺灣、福建、海南、雲南；日本、越南、寮國、馬來西亞、泰國、緬甸、印度、印尼。

Haemaphysalis inermis Birula 缺角血蜱 (Teng, 1978:95)
寄 主：黃牛、狐。
分 佈：四川；蘇聯、伊朗、法國及東歐一些國家。

Haemaphysalis japonica Warburton 日本血蜱 (Teng, 1978:57; Teng et Jiang, 1991:149)
Haemaphysalis japonica Warburton, 1908:512-513.
=*Haemaphysalis japonica douglasi* Nuttall et Warburton, 1915:
寄 主：成蜱寄生犛牛(*Bas grunnicens*)、馬、山羊、野豬(*Sus scrofa*)、人；幼蜱和若蜱寄生鳥類和嚙齒類。
分 佈：陝西、山西、河北、青海、甘肅、寧夏、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯(遠東地區)。

Haemaphysalis kitaokai Hoogstraal 北崗血蜱 (Teng et Jiang, 1991:109)

Haemaphysalis kitaokai Hoogstraal, 1969:211-221.

寄 主：黃牛、馬、鹿。

分 佈：臺灣(?)四川、甘肅；日本。

Haemaphysalis lagrangei Larrousse 拉氏血蜱 (Teng et Jiang, 1991:200)

Haemaphysalis lagrangei Larrousse, 1925:301-305.

寄 主：赤麂(*Muntiacus mantjak*)、麂(*Muntiacus* sp.)。

分 佈：海南；越南。

Haemaphysalis longicornis Neumann 長角血蜱 (Deng et Cui, 1992:1442; Teng, 1978:67; Teng et Jiang, 1991:181)

Haemaphysalis longicornis Neumann, 1901:261.

=*Haemaphysalis neumanni* Donitz, 1905:

寄 主：牛、馬、綿羊、山羊、羯羊、犬、豬、鹿、熊、獾(*Meles meles*)、獐(*Hydropotes inermis*)、狐(*Vulpes vulpes*)、野兔(*Lepus* spp.)、刺猬(*Erinaceus europaeus*)、人、黃鼠(*Citellus dauricus*)；幼蜱寄生花鼠(*Eutamias sibiricus*)、環頸雉。

分 佈：臺灣、貴州、西藏、四川、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯(遠東地區)、澳洲、新西蘭、南太平洋一些島嶼。

Haemaphysalis mageshimaensis Saito et Hoogstraal 日島血蜱 (Teng et Jiang, 1991:187)

Haemaphysalis mageshimaensis Saito et Hoogstraal, 1973:569-578.

寄 主：麂(*Muntiacus* sp.)、小麂(*Muntiacus reevesi*)、果子狸(*Paguma larvata*)、豹貓(*Felis bengalensis*)、虎(*Panthera tigris*)、黃牛、水牛、山羊、豬、犬、貓、人；幼蜱寄生鼠(*Rattus* sp.)、栗耳短腳鵯(*Hypsipetes amaurotis nagamichii*)、暗綠綉眼(*Zosterops japoonica batanis*)。

分 佈：臺灣、福建、香港、安徽；日本。

Haemaphysalis megaspinosa Saito 大刺血蜱 (Teng et Jiang, 1991:156)

Haemaphysalis megaspinosa Saito, 1969:87-96.

寄 主：黃牛、大熊貓。

分 佈：四川、甘肅；日本。

Haemaphysalis menglaensis Pang et al. 勐臘血蜱 (Teng et Jiang, 1991:198)

Haemaphysalis menglaensis Pang, Chen et Xiang, 1982:47-49.

寄 主：鹿(*Cervus* sp.)。

分 佈：雲南。

Haemaphysalis montgomeryi Nuttall 猛突血蜱 (Deng et Cui, 1992:1443; Teng, 1978:75; Teng et Jiang, 1991:178)

Haemaphysalis montgomeryi Nuttall, 1912:50-60.

寄 主：山羊、綿羊、馬、黃牛、水牛、犬、人。

分 佈：貴州、雲南、西藏、四川；越南、寮國、柬埔寨、印度、尼泊爾、巴基斯坦。

Haemaphysalis moschisuga Teng 嗜麝血蜱 (Deng et Cui, 1992:1442; Teng et Jiang, 1991:162)

Haemaphysalis moschisuga Teng, 1980:146.

寄 主：灰尾兔、白馬雞、林麝、犛牛。

分 佈：雲南、西藏、四川、青海、甘肅。

Haemaphysalis nepalensis Hoogstraal 尼泊爾血蜱 (Teng et Jiang, 1991:136)

Haemaphysalis nepalensis Hoogstraal, 1962:195-203.

寄 主：犏牛、人。

分 佈：西藏；印度、尼泊爾。

Haemaphysalis ornithophila Hoogstraal et Kohls 嗜鳥血蜱 (Teng et Jiang, 1991:219)

Haemaphysalis ornithophila Hoogstraal et Kohls, 1959:417-420.

寄 主：栗色八色鵣(*Pitta oatesi*)、原雞、紅腹錦雞、黃鼬、岩羊。

分 佈：臺灣、雲南、甘肅；越南、寮國、泰國、緬甸、印度、尼泊爾、蘇聯(西伯利亞)。

Haemaphysalis phasiana Saito et al. 雉雞血蜱 (Teng et Jiang, 1991:216)

Haemaphysalis phasiana Saito, Hoogstraal et Wassef, 1974:198-208.

寄 主：雉(*Phasianus versicolor*)、環頸雉(*Phasianus colchicus*)、栗鵐 (*Emberiza rutila*)、藍磯鶇(*Monticola solitarius pandoo*)。

分 佈：江西、雲南；朝鮮、日本、蘇聯。

Haemaphysalis primitiva Teng 川原血蜱 (Deng et Cui, 1992:1443; Teng et Jiang, 1991:118)

Haemaphysalis primitiva Teng, 1982:46.

寄 主：

分 佈：雲南、四川。

Haemaphysalis punctata Canestrini et Panzago 刻點血蜱 (Teng, 1978:63; Teng et Jiang, 1991:131)

Haemaphysalis punctata Canestrini et Panzago, 1877:121.

寄 主：成蟲寄生牛、馬、羊等大型及小型動物或鳥類；幼蟲及若蟲寄生鳥類及小型野生動物。

分 佈：新疆；蘇聯、伊朗、土耳其、羅馬尼亞、匈牙利、希臘、意大利、德國、法國、西班牙、荷蘭、丹麥、瑞典、英國、埃及、阿爾及利亞。

Haemaphysalis qinghaiensis Teng 青海血蜱 (Deng et Cui, 1992:1442; Teng et Jiang, 1991:158)

Haemaphysalis qinghaiensis Teng, 1980:144-146.

寄 主：山羊、綿羊、黃牛、犏牛、馬、騾、驢；幼蜱寄生高原兔(*Lepus oiostolus*)。

分 佈：雲南、西藏、四川、青海、甘肅、寧夏。

Haemaphysalis sinensis Zhang 中華血蜱 (Teng et Jiang, 1991:170)

Haemaphysalis sinensis Zhang, 1981:169-173.

寄 主：黃牛、山羊。

分 佈：湖北、陝西。

Haemaphysalis spinigera Neumann 距刺血蜱 (Teng, 1978:79; Teng et Jiang, 1991:203)

Haemaphysalis spinigera Neumann, 1897:352-354.

寄 主：黃牛、水鹿(*Cervus unicolor*)、虎、熊、豹。

分 佈：雲南；越南、寮國、柬埔寨、印度、尼泊爾、斯里蘭卡。

Haemaphysalis sulcata Canestrini et Fanzago 具溝血蜱 (Huang et Teng, 1980:93; Teng et Jiang, 1991:134)

Haemaphysalis sulcata Canestrini et Fanzago, 1877:188.

寄 主：成蜱寄生山羊、綿羊、牛、駱駝；幼蜱和若蜱寄生蜥蜴、蛇等。

分 佈：新疆；蘇聯、印度、阿富汗、巴基斯坦、希臘、伊朗、土耳其、伊拉克、也門、敘利亞、黎巴嫩、巴勒斯坦、捷克、保加利亞、羅馬尼亞、亞爾巴利亞、意大利、法國、西班牙、埃及、阿爾及利亞、突尼斯、摩洛哥。

Haemaphysalis tibetensis Hoogstraal 西藏血蜱 (Teng, 1978:101; Teng et Jiang, 1991:127)

Haemaphysalis tibetensis Hoogstraal, 1965:452-459.

寄 主：犬、綿羊、犛牛(*Bos grunitens*)、黃牛。

分 佈：西藏、甘肅。

Haemaphysalis warburtoni Nuttall 汶川血蜱 (Teng, 1978:99; Teng et Jiang, 1991:120)

Haemaphysalis warburtoni Nuttall, 1912:55-57.

寄 主：蘇門羚(*Capricornis sumatraensis*)、青羊(*Naemorhedus goral*)、犛牛(*Bos grunniens*)、羚羊(*Hemitragus jemlahicus*)、綿羊。

分 佈：西藏、四川；越南、尼泊爾。

Haemaphysalis wellingtoni Nuttall et Warburton 微形血蜱 (Teng, 1978:91; Teng et Jiang, 1991:175)

Haemaphysalis wellingtoni Nuttall et Warburton, 1908:397-398.

寄 主：家雞、白鷴(*Lophura nycthemera*)、犬、水牛。

分 佈：雲南；日本、越南、寮國、柬埔寨、馬來西亞、緬甸、印度、印尼、巴布亞新幾內亞。

Haemaphysalis verticalis Itagaki et al. 草原血蜱 (Teng, 1978:65; Teng et Jiang, 1991:209)

Haemaphysalis verticalis Itagaki, Noda et Yamaguchi, 1944:58-75.

寄 主：草原黃鼠(*Citellus dauricus*)、長爪沙鼠(*Meriones unguiculatus*)、黑線倉鼠(*Cricetulus barabensis*)、大倉鼠(*Cricetulus triton*)、沼澤田鼠(*Microtus fortis*)、草原鼢鼠(*Myospalax aspalax*)、五趾跳鼠(*Allactaga sibiriai*)、香鼬(*Mustela altaica*)、艾虎(*Mustela putorius*)、蒙古兔(*Lepus totai*)、刺猬(*Erinaceus europaeus*)、黃羊(*Procapra gutturosa*)、黃牛、犬、麻雀(*Passer montanus*)。

分 佈：山西、河北、寧夏、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蒙古。

Haemaphysalis vietnamensis Hoogstraal et Wilson 越南血蜱 (Teng et Jiang, 1991:116)

Haemaphysalis vietnamensis Hoogstraal et Wilson, 1966:614-617.

寄 主：水牛、黃牛。

分 佈：福建、雲南；越南。

Haemaphysalis yeni Toumanoff 越原血蜱 (Teng, 1978:73; Teng et Jiang, 1991:194)

Haemaphysalis yeni Toumanoff, 1944:74-75.

寄 主：水鹿(*Cervus unicolor*)、犬、豺(*Cuon alpinus*)。

分 佈：福建、湖南、海南；越南、日本(九州)。

Hyalomma anatoicum anatolicum Koch 小亞璃眼蜱 (Teng, 1978:142; Teng et Jiang, 1991:307)

Hyalomma anatoicum anatolicum Koch, 1844:220-221.

寄 主：牛、馬、騾、綿羊、駱駝等家畜。

分 佈：新疆；蘇聯、印度、尼泊爾、巴基斯坦、中亞和北非、東南歐一些國家。

Hyalomma asiaticum asiaticum Schulze et Schlottke 亞洲璃眼蜱 (Teng, 1978:138; 1996:319; Teng et Jiang, 1991:299)

Hyalomma dromedarii asiaticum Schulze et Schlottke, 1929:34-43.

寄 主：成蜱寄生駱駝、牛、馬、綿羊、山羊、刺猬、野兔、人；幼蜱和若蜱寄生野兔、刺猬、小林鼠(*Apodemus sylvaticus* Linnaeus)、野鼠等小型動物。

分 佈：陝西、寧夏、甘肅、新疆、內蒙古、吉林；蒙古、蘇聯(中亞地區)、巴基斯坦、阿富汗、敘利亞、伊朗、伊拉克。

Hyalomma asiaticum kozlovi Olenev 東亞璃眼蜱 (Huang, 1978:455-456; Huang et Teng, 1980:94; Teng, 1978:139; Teng et Jiang, 1991:302)

Hyalomma asiaticum kozlovi Olenev, 1931:258-259.

Hyalomma kozlovi Olenev, 1931:

=*Hyalomma asiaticum citripes* Schulze, 1935:

寄 主：成蜱寄生駱駝、綿羊、山羊、牛、馬、驢、豬等家畜、大耳猬(*Hemiechinus auritus*)、人，幼蜱和若蜱寄生於塔里木兔(*Lepus yarkandensis*)、子午沙鼠(*Neruibes neruduabys*)，大耳猬(*Hemiechinus auritus*)，短耳沙鼠(*Brachiones przewalskii*)，長耳跳鼠(*Euchoreutes naso*)，三趾跳鼠(*Dipus sagitta*)，五趾跳鼠(*Allactaga sibirica*)，灰倉鼠(*Cricetulus migratorius*)，小家鼠(*Mus musculus*)、印度地鼠(*Nesokia indica*)等。

分 佈：陝西、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、吉林；蒙古、蘇聯(中亞地區)。

Hyalomma detritum Schulze 殘緣璃眼蜱 (Teng, 1978:136; Teng et Jiang, 1991:296)

Hyalomma detritum Schulze, 1919:193-196.

=*Hyalomma detritum albipictum* Schulze, 1919:

=*Hyalomma perstrigatum* Schulze, 1930:

寄 主：成蜱寄生牛、馬、綿羊、山羊、駱駝、豬；幼蜱和若蜱寄生嚙齒類。

分 佈：湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蒙古、蘇聯、印度、尼泊爾、巴基斯坦、阿富汗、伊朗、土耳其、敘利亞、巴勒斯坦、羅馬尼亞、保加利亞、捷克、南斯拉夫、希臘、意大利、西班牙、北非及東非一些國家。

Hyalomma dromedarii Koch 嗜駝璃眼蜱 (Teng, 1978:140; Teng et Jiang, 1991:304)

Hyalomma dromedarii Koch, 1844:220.
=*Hyalomma aegyptium* var. *dromedarii* Neumann, 1901:
寄 主：成蜱寄生駱駝、牛、馬、綿羊、山羊、犬、人；幼蜱和若蜱寄生駱駝、牛及洞穴型小獸類。
分 佈：新疆；蘇聯、阿富汗、印度、巴基斯坦、伊朗、土耳其、伊拉克、巴勒斯坦、沙烏地阿拉伯、也門、非洲一些國家。

Hyalomma marginatum Koch 邊緣離眼蜱 (Deng et Cui, 1992:1443)
Hyalomma marginatum Koch, 1844:
寄 主：犏牛、山羊。
分 佈：雲南、四川；蘇聯、伊朗、巴勒斯坦、南歐、北非。

Hyalomma marginatum indosinense Toumanoff 印支邊緣璃眼蜱 (Teng et Jiang, 1991:317)
Hyalomma marginatum indosinensis Toumanoff, 1944:27.
寄 主：黃牛、水牛。
分 佈：海南；越南。

Hyalomma marginatum isaaci Sharif 伊氏邊緣璃眼蜱 (Teng et Jiang, 1991:315)
Hyalomma marginatum isaaci Sharif, 1928:307.
寄 主：黃牛、犏牛、山羊。
分 佈：雲南、四川；印度、尼泊爾、孟加拉、克什米爾、斯里蘭卡。

Hyalomma marginatum marginatum Koch 邊緣璃眼蜱 (Teng, 1978:145)
寄 主：山羊。
分 佈：四川；蘇聯、中東、近東、南歐、北非一些國家。

Hyalomma rufipes Koch 麻點璃眼蜱 (Teng, 1978:143; Teng et Jiang, 1991:310)
Hyalomma rufipes Koch, 1844:221.
寄 主：成蜱寄生山羊、綿羊、牛、馬、雙峰駝；幼蜱和若蜱寄生鳥類、兔類、刺猬。
分 佈：山西、寧夏、新疆、內蒙古；蘇聯、土耳其、伊拉克、敘利亞、巴勒斯坦、也門、非洲一些國家。

Hyalomma scupense Schulze 盾糙璃眼蜱 (Teng, 1978:144; Teng et Jiang, 1991:312)
Hyalomma scupense Schulze, 1918:62.
寄 主：牛、馬、驢、綿羊、駱駝。
分 佈：新疆；蘇聯、羅馬尼亞、南斯拉夫、保加利亞、捷克、法國、希臘。

Ixodes acutitarsus (Karsch) 銳跗硬蜱 (Deng et Cui, 1992:1442; Teng, 1973:73; 1978:45; Teng et Jiang, 1991:91)
Haemalaster acutiarsus Karsch, 1880:142.
寄 主：牛、犏牛、山羊、岩羊、犬、大熊貓、黑熊、野豬(*Sus scrofa*)、斑羚(*Naemorhedus goral*)、林麝(*Moschus berezovskii*)、紅嘴藍鵲(*Kitta erythrorhyncha*)、人；幼蜱寄生嚙齒和食蟲類動物
分 佈：臺灣、雲南、西藏、湖北、甘肅；日本、緬甸、印度、尼泊爾、錫金。

Ixodes angulatus Kishida (Teng, 1973:73)

寄 主：

分 佈：

Ixodes arboricola Schulze et Schlottke 嗜鳥硬蜱 (Teng, 1973:80; 1978:39: Teng et Jiang, 1991:62)

Ixodes arboricola Schulze et Schlottke, 1929:95-112.

寄 主：麻雀(*Passer* spp.)、紫翅椋鳥(*Sturnus vulgaris*)、赭紅尾鴝(*Phoenicurus ochruros*)、斑鶲(*Muscicapa striata*)、大山雀(*Parus major newtoni*)、普通繡(*Sitta europaea affinis*)、倉鴞(*Tyto alba alba*)。

分 佈：西藏、新疆、內蒙古；蘇聯、阿富汗、羅馬利亞、保加利亞、匈牙利、捷克、荷蘭、法國、瑞士、德國、波蘭、奧地利、英國、挪威、瑞典、丹麥、芬蘭、埃及。

Ixodes canisuga Johnston 原野硬蜱 (Teng, 1973:80)

Ixodes cannisuga Johnston, 1849:

寄 主：旱獺(*Marmota bobak*)、草狐(*Vulpes vulpes*)、獾(*Meles meles*)、犬、長尾黃鼠(*Citellus undulatus*)、雲雀、麻雀(*Passer* sp.)。

分 佈：四川、青海、新疆；歐洲。

Ixodes crenulatus Koch 草原硬蜱 (Deng et Cui, 1992:1441; Teng, 1978:38; Teng et Jiang, 1991:59)

Ixodes crenulatus Koch, 1844:39.

=*Ixodes canisuga* Johnston, 1849:

=*Ixodes kaiseri* Arthur, 1957:

寄 主：喜馬拉雅旱獺(*Marmota babak*)、天山旱獺(*Marmota baibacina*)、草狐(*Vulpes vulpes*)、獾(*Meles meles*)、長尾黃鼠(*Citellus undulatus*)、普通刺猬(*Erinaceus europaeus*)、香鼬(*Muslela altaica*)、高原兔(*Lepus oiostolus*)、犬、麝(*Moschus* sp.)、紫翅椋鳥(*Sturnus vulgaris*)、雲雀(*Alauda* sp.)、麻雀(*Passer* sp.)

分 佈：西藏、四川、青海、甘肅、新疆、內蒙古、吉林、黑龍江；蒙古、蘇聯、阿富汗、印度、克什米爾、伊朗、黎巴嫩、巴勒斯坦、羅馬尼亞、保加利亞、西班牙、意大利、瑞士、德國、法國、波蘭、匈牙利、英國、丹麥、埃及。

Ixodes granulatus Supino 粒形硬蜱 (Deng et Cui, 1992:1442; Teng, 1973:73; 1978:47; Teng et Jiang, 1991:95)

Ixodes granulatus Supino, 1897:230-238.

寄 主：大耳鼠兔(*Ochotona macrotis*)、黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)、針毛鼠(*Ruttus fulvescens*)、黃胸鼠(*Ruttus flavipectus*)、社鼠(*Ruttus confucianus*)、大家鼠(*Ruttus norvegicus*)、長吻松鼠(*Dremomys rufigenis*)、黑腹絨鼠(*Eothonomys melanogaster*)、倉鼠(*Cricetulus* sp.)、樹鼩(*Tupaia glis*)、鼬(*Herpesses* sp.)。

分 佈：臺灣、福建、廣東、雲南、西藏、四川、浙江、湖北；朝鮮、日本、菲律賓、柬埔寨、寮國、馬來西亞、泰國、印尼。

Ixodes (s. str.) **hyatti** Clifford, Hoogstral et Kohls 哈氏硬蜱 (Deng et Cui, 1992:1441; Teng, 1986:51; Teng et Jiang, 1991:56)

Ixodes (s. str.) *hyatti* Clifford, Hoogstral et Kohls, 1971:
=*Ixodes ochotonartus* Teng, 1973:
寄 主：藏鼠兔(*Ochotona thibetana*)、高山鼮(*Alticola* sp.)、黃喉姬鼠(*Apodemus flavicolis latronum*)、白腹鼠(*Rattus coxingi andersoni*)。
分 佈：四川；尼泊爾、巴基斯坦。

Ixodes japonensis Neumann 日本硬蜱 (Lun et Woo, 1950:210; Teng, 1973:73)
Ixodes japonensis Neumann, 1904:458-459.
寄 主：兔(*Lepus brachyurus brachyurus*)、馬(*Equus caballus*)、牛(*Bos taurus*)、鹿(*Cervus* sp.)。
分 佈：雲南、西藏；緬甸、印度、日本。

Ixodes (s. str.) **kashmiricus** Pomerantzev 克什米爾硬蜱 (Teng, 1986:50; Teng et Jiang, 1991:82)
Ixodes (s. str.) *kashmiricus* Pomerantzev, 1948:20-24.
寄 主：成蜱寄生于犏牛，綿羊、犬等家畜，若蜱寄生于林姬鼠(*Apodemus sylvaticus*)等。
分 佈：西藏(波密)；印度、克什米爾、蘇聯(吉爾吉斯)。

Ixodes kuntzi Hoogstraal et Kohls 鼯鼠硬蜱 (Teng, 1978:51; Teng et Jiang, 1991:98)
Ixodes kuntzi Hoogstraal et Kohls, 1965:209-214.
寄 主：雌蟲寄生鼯鼠(*Petaurista lena, P. grandis*)，幼期寄生紅腹松鼠(*Callosciurus erythraeus centralis*)、豹鼠(*Tamiops swinhoei formosanus*)、姬鼠(*Apodemus semotus*)、屋頂鼠(*Rattus rattus*)、普通鳾(*Sitta europaea*)。
分 佈：臺灣；尼泊爾。

Isodes (s. str.) **moscharius** Teng 嗜麝硬蜱 (Teng, 1986:51; Teng et Jiang, 1991:65)
Isodes (s. str.) *moscharius* Teng, 1982:452.
寄 主：林麝(*Moschus berezovskii*)。
分 佈：西藏(樟木、聶拉木)。

Ixodes (s. str.) **moschiferi** Nemenz 寄麝硬蜱 (Deng et Cui, 1992:1441; Teng, 1986:51; Teng et Jiang, 1991:68)
Ixodes (s. str.) *moschiferi* Nemenz, 1968:19-26.75-77.
=*Ixodes rangtangensis* Teng, 1973:
寄 主：麝類(*Moschus* spp.)，包括麝(*Moschus moschiferus*)、林麝(*Moschus berezovskii*)、馬麝(*Moschus sifanicus*)。
分 佈：西藏、四川、青海；尼泊爾。

Ixodes (**Pholeoixodes**) **myospalacis** Teng 鼢鼠硬蜱 (Teng, 1986:48; Teng et Jiang, 1991:81)
Ixodes (*Pholeoixodes*) *myospalacis* Teng, 1986:46-53.
寄 主：中華鼢鼠(*Myospalax fontanieri* Milne-Edwards)。
分 佈：陝西、甘肅(平涼縣)、寧夏。

Ixodes nuttallianus Schulze 擬篦硬蜱 (Teng, 1978:32)
Ixodes ricinoides Nuttall, 1913:136-138. (a preempted name)

=*Ixodes nuttallianus* Schulze, 1930:294-303.

寄 主：鹿(Swamp deer)、麝(Musk deer)、犬、山羊、黃牛、犏牛。

分 佈：西藏、四川；尼泊爾。

Ixodes ochotonarius Teng 鼠兔硬蜱 (Teng, 1973:77; 1978:28)

Ixodes ochotonarius Teng, 1973:77.

寄 主：藏鼠兔(*Ochotona thibetana*)，幼蟲和若蟲寄生黃喉姬鼠(*Apodemus flavicollis latronum*)、白腹鼠(*Rattus coxingi andersoni*)。

分 佈：四川(馬爾康)。

Ixodes ovatus Neumann 卵形硬蜱 (Deng et Cui, 1992:1441; Teng, 1978:41; Teng et Jiang, 1991:87)

Ixodes ovatus Neumann, 1899:

=*Ixodes japonensis* Neumann, 1904:107-294.

=*Ixodes frequens* Ogura et Takada, 1927:

=*Ixodes carinatus* Kishida, 1930:

=*Ixodes taiwanensis* Sugimoto, 1937:

=*Ixodes shinchikuensis* Sugimoto, 1937:

寄 主：牛、犏牛、馬、驢、山羊、綿羊、豬、毛冠鹿(*Elaphodus cephalophus*)、林麝(*Moschus berezovskii*)、馬麝(*Moschus sifanicus*)、麝(*Moschus* sp.)、斑羚(*Naemorhedus goral*)、龜紋豹(*Pantherra* sp.)、大熊貓(*Ailuropoda melanoleuca*)、黃鼬(*Mustela sibirica*)、野貓、灰尾兔(*Lepus oiostolus*)、姬鼠、絨鼠、人。

分 佈：臺灣、貴州、雲南、西藏、四川、湖北、陝西、青海、甘肅；日本、泰國、緬甸、印度、尼泊爾、錫金。

Ixodes persulcatus Schulze 全溝硬蜱 (Teng, 1973:73; 1978:26; Teng et Jiang 1991:47)

Ixodes persuleatus Schulze, 1930, 90:294-303.

寄 主：成蟲寄生各種家畜及野生動物，包括食肉類、嚙齒類，人；幼蟲及若蟲寄生小型哺乳動物及鳥類。

分 佈：西藏山西、新疆、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯(亞洲地區)、波蘭。

Ixodes pomerantzevi Serdukova 鈍跗硬蜱 (Teng, 1973:79; 1978:33; Teng et Jiang, 1991:70)

Ixodes pomerantzevi Serdukova, 1941:519-522.

寄 主：草狐(*Vulpes vulpes*)、花鼠(*Eutamias sibiricus*)，國外包括棕背䶄(*Clethrionomys rufocanus*)、花鼠(*Eutamias asiaticus*)、刺猬(*Erinaceus amurensis*)、鼩鼱(*Sores* sp.)。

分 佈：山西、甘肅；朝鮮(?)蘇聯。

Ixodes rangtangensis Teng 壤塘硬蜱 (Teng, 1973:75; 1978:43)

Ixodes rangtangensis Teng, 1973:75.

寄 主：林麝(*Moschus berezovskii* Flerov)、馬麝(*Moschus sifanicus*)。

分 佈：四川(壤塘)、四川、西藏、青海。

Ixodes ricinoides Nuttall (Luh et Woo, 1950:210; Teng, 1973:73)

Ixodes ricinoides Nuttall, 1913:136-138.

寄 主：鹿。

分 佈：海南(文昌)。

Ixodes ricinus (Linnaeus) (Chao, 1952:228; Luh et Woo, 1950:210; Teng, 1973:73)

Acarus ricinus Linnaeus, 1746:479.
=*Acarus ricinoides* de Geer, 1778:98.
=*Ixodes megathyreus* Leach, 1815:398.
=*Ixodes bipunctatus* Risso, 1826:183.
=*Cynorhaestor hermanni* Risso, 1826:183.
=*Ixodes trabeatus* Audouin, 1832:420.
=*Ixodes pumbeus* Dugès, 1834:20.
=*Ixodes fuscus* Koch, 1835:
=*Ixodes sciuri* Koch, 1835:
=*Ixodes lacertae* Koch, 1835:
=*Ixodes rufus* Koch, 1835:
=*Ixodes sulcatus* Koch, 1835:
=*Ixodes pustularum* Lucas, 1866:57.
=*Ixodes fodiens* Murray, 1877:191.
=*Ixodes ovatus* Neumann, 1899:116.

寄 主：兔類(*Lepus sylvaticus, Lepus timidus*)、兔、地松鼠(*Sciurus vulgaris*)、鼠類(*Mus slyvaticus, Apodemus agrarius, Mus decumanus, Anthus trivialis*)、鼠、 、鼠、地鼠(*Sorex araneus*)、山鼠(*Myous avellanarius*)、白鼬(*Mustcla erminae*)、貂(*Martes melampus*)、刺猬(*Brinaceus europeus, Brinaceus koreanus*)、菊頭蝠(*Rhinolopus ferrum-equinum*)、葉鼻蝠(*Rhinolopus euryale*)、梟兔鳥(*Strix brachyotus*)、戴菊鳥(*Pegulus ignicapillus*)、鷸(*Tringa pugnax*)、沙蜥蜴(*Lacerata agilis*)、胎蜥蜴(*Lacerata vivipara*)、蜥蜴(*Lacerata muralis, Lacerata ocellata, Lacerata viridis*)、蜥蜴、蜥蜴、蜥蜴、人、牛(*Bos taurus*)、山羊(*Cupra hircus*)、緬羊(*Ovis argali*)、馬(*Equus caballus*)、鹿(*Cervus elaphus,*)、麞鹿(*Capreolus capraea*)、家貓(*Felis domestica*)、豹(*Felis pardalis*)、美洲虎(*Felis concolor*)、犬(*Canis familaris*)、狐(*Canis vulpus*)、香狸(*Viverra genetta*)。

分 佈：臺灣；印度、阿拉伯、阿爾及利亞、歐洲、蘇聯、美國、巴西。

Ixodes semenovi Olenev 西氏硬蜱 (Teng et Jiang, 1991:85)

Ixodes semenovi Olenev, 1929:489-490.

寄 主：領岩鷚(*Prunella collaris*)、紅嘴山鴉(*Pyrhocorax pyrhocorax*)、鷹。

分 佈：西藏；蘇聯。

Ixodes shinckihuensis Sugimoto 新竹硬蜱 (Luh et Woo, 1950:212; Teng, 1973:73; 1978:50)

Ixodes shinckihuensis Sugimoto, 1937:59-61.

寄 主：犬(*Canis familaris*)。

分 佈：臺灣。

Ixodes simplex simplex Neumann 簡蝠硬蜱 (Luh et Woo, 1950:212; Teng, 1973:73, 74; 1978; Teng et Jiang, 1991:76)

Ixodes simplex Neumann, 1906:197-198.
=*Ixodes audyi* Kohls, 1955:
=*Ixodes pospelovae* Emchuk, 1955:
=*Ixodes chiropterorum* Bahos et Janisch, 1958:
寄 主：白股蝠(*Vespertilio* sp.)、菊頭蝠(*Rhinolopus ferrum-equinum*)、小棕蝠(*Myotis tricolor*) 長翅蝠(*Miniopterus* sp.)。
分 佈：臺灣、福建、江蘇、上海、南京；日本、蘇聯、阿富汗、克什米爾、印度、馬來西亞、巴勒斯坦、土耳其、希臘、羅馬利亞、匈牙利、捷克、法國、瑞士、波蘭、法屬剛果、加蓬(Gabon)。

Ixodes sinensis Teng 中華硬蜱 (Teng, 1978:39; Teng et Jiang, 1991:51)
寄 主：黃牛、山羊、豹、人。
分 佈：福建、江西、湖南、雲南、浙江、安徽。

Ixodes (s. str.) **spinicoxalis** Neumann 基刺硬蜱 (Teng, 1986:50; Teng et Jian, 1991:101)
Ixodes spinicoxalis Neumann, 1899:111, 123-124.
寄 主：黃鼬(*Mustela sibirica*)等小型獸類和鼠類。
分 佈：福建(崇安)；寮國、泰國、印尼。

Ixodes (s. str.) **tanuki** Saito 嗜貉硬蜱 (Teng, 1986:52; Teng et Jiang, 1991:79)
Ixodes (s. str.) *tanuki* Saito, 1964:59-66.
寄 主：香鼬(*Mustela altaica temon*)、黃鼬(*Mustela sibirica*)、貂(*Nyctereutes procyonoides*)、貉(*Nyctereutes procyonoides viverrinus*)、獾(*Meles meles*)、黃喉貂(*Martes flavigula*)、灰腹鼠(*Rattus eha*)。
分 佈：西藏(樟木)、甘肅；尼泊爾、日本。

Ixodes taiwanensis Sugimoto 臺灣硬蜱 (Luh et Woo, 1950:213; Teng, 1973:73; 1978:49)
Ixodes taiwanensis Sugimoto, 1936:342.
寄 主：家犬(*Canis familaris*)、水牛(*Bos bubalus*)、野豬(*Sus scrofa*)、水鹿(*Cervus unicolor swinhoeii*)。
分 佈：臺灣。

Ixodes vespertilionis Koch 長蝠硬蜱 (Teng, 1973:73; 1978:36; Teng et Jiang, 1991:72)
Ixodes vespertilionis Koch, 1844:37.
寄 主：蝙蝠，包括菊頭蝠(*Rhinolophus*)、鼠蝠(*Myotis*)、長翅蝠(*Miniopterus*)、大耳蝠(*Plecotus*)、伏翼(*Pipistrellus*)、蹄屬(*Hipposideros*) 等屬。
分 佈：臺灣、福建、雲南、四川、江蘇、南京、山西、內蒙古、遼寧；日本、朝鮮、蘇聯、阿富汗、伊朗、土耳其、巴勒斯坦、歐洲及非洲一些國家、澳洲。

Rhipicephalus bursa Canestrini et Fanzago 囊形扇頭蜱 (Teng, 1978:152; Teng et Jiang, 1991:330)
Rhipicephalus bursa Canestrini et Fanzago, 1877:190.
寄 主：綿羊、山羊、牛、野兔、人。
分 佈：新疆；蘇聯、巴勒斯坦、地中海及東非一些國家。

Rhipicephalus h. haemaphycaloides Supino 鐮形扇頭蜱 (Chao, 1952:228; Deng et Cui, 1992:1443; Luh et Woo, 1951:213; Teng, 1878:153; Teng et Jiang, 1991:333)

Rhipicephalus h. haemaphycaloides Supino, 1897:234.
=*Rhipicephalus haemaphycaloides niger* Supino, 1897:234.
=*Rhipicephalus haemaphycaloides ruber* Supino, 1897:234-235.
=*Rhipicephalus paulopunctatus* Neumann, 1897:397-398, 420.
=*Rhipicephalus haemaphysaloides* var. *expedita* Neumann, 1904:
Rhipicephalus h. haemaphysaloides Neumann, 1911:41
=*Rhipicephalus expeditus* Neumann, 1911:41.

寄 主：成蜱寄生水牛(*Bos bubalus*)、牛(*Bos taurus*)、驢、馬(*Equus caballus*)、犬、豬、山羊、綿羊、野豬(*Sus scrofa*)、麞、狼、黑熊、水鹿(*Cervus unicolor, Muntiacus muntjak*)、鹿、野兔、人；幼蜱和若蜱寄生野生哺乳動物；兔(*Lepus timidus, Lepus campestris*)、兔、犀(*Rhinoceros sondaicus vaginalis*)、豹(*Felis pardus, Felis marmoratus*)、、獾(*Arctonyx collaris*)、旱獺(*Arctomy babae*)、豪豬(*Hystrix s. subcristatus*)、鴿、雞(*Gallus domesticus*)。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南、貴州、雲南、西藏、浙江、江蘇、安徽、湖北；越南、寮國、柬埔寨、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼。

Rhipicephalus javanense Supino 爪哇扇頭蜱 (Chao, 1952:225; Luh et Woo, 1951:199)

Rhipicephalus javanense Supino, 1897:233.
=*Dermacentor indicus* Supino, 1897:236.
=*Aponomma politum* Neumann, 1899:191.
=*Amblyomma sublaeve* Neumann, 1899:221.
=*Aponomma latum,* Neumann, 1901:291-292, 344. (*nec* Koch, 1844)
=*Amblyomma badium* Neumann, 1901:330-301.
Aponomma javanense, Cooper et Robinson, 1908:464-466.
Aponomma javanense Schulze, 1937:690-692.
=*Aponomma compressum javanense* Schulze, 1941:514.

寄 主：鯪鯉(*Manis pentadactyla dolmanni, Manis javaenica*)、、鬣狗(*Hyaena hyaena*)、*Euprepes* sp.、澤巨蜥(*Varanus salvator*)、丹蛇(*Python molurus*)、龜(*Geoemyda tricarinata*)。

分 佈：海南、廣東、雲南；越南、馬來西亞、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼。

Rhipicephalus pumilio Schulze 短小扇頭蜱 (Huang et Teng, 1980:94; Teng, 1978:150; Teng et Jiang, 1991:327)

Rhipicephalus pumilio Schulze, 1935:178-180.

寄 主：成蜱寄生塔里木兔(*Lepus yarkandensis*)，大耳猬(*Hemiechinus auritus*)、山羊、綿羊、牛、驢、雙峰駝、犬、鵝喉羚、狼、艾鼬、大沙鼠、人；幼蜱若蜱寄生塔里木兔、大耳猬、子午沙鼠(*Neruibes neruduabys*)等。

分 佈：新疆、內蒙古；蘇聯、克什米爾。

Rhipicephalus sanguineus (Latreille) 血紅扇頭蜱 (Huang et Teng, 1980:93; Teng, 1978:147; 1996:319; Teng et Jiang, 1991:320)

Ixodes sanguineus Latreille, 1806:157.

寄 主：成蜱寄生犬、綿羊、山羊、牛、狐、貓、野兔、人、塔里木兔(*Lepus yarkandensis*)，拉達克鼠兔(*Ochotona ladacensis* Günther)、大耳猬(*Hemiechinus auritus*)、幼蜱

和若蜱寄生犬、塔里木兔、大耳猬、艾虎(*Mustela putorius*)、子午沙鼠(*Neruibes neruduabys*)，大沙鼠(*Rhombomys opimus*)等。

分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、西藏、江蘇、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、新疆、遼寧；日本、蘇聯、印度、克什米爾、亞洲、歐洲、非洲、美洲、大洋洲許多國家。

Rhipicephalus turanicus Pomerantzev 圖蘭扇頭蜱 (Teng, 1978:149; Teng et Jiang, 1991:324)

Rhipicephalus turanicus Pomerantzev, 1940:113-115.

寄 主：成蜱寄生綿羊、山羊、牛、馬；幼蜱和若蜱寄生野兔、嚙齒類及小型動物。

分 佈：陝西、新疆；蘇聯、印度、尼泊爾、伊朗、及其他一些中亞、歐洲和北非國家。

Argasidae 軟蜱科

Argas persicus (Oken) 波斯銳緣蜱 (Chao, 1952:224; Luh et Woo, 1950:196; Teng, 1978:158)

Rhynchoprion persicum Oken, 1818:1567.
=*Argas mauritianus* Guérin-Méneville, 1844:17.
=*Argas chinche,* Gervais, *in* Walckenaer, 1844:462.
=*Argas americana* Packard, 1872:740.

寄 主：家鴨(*Anser boschas domestica*)、家鵝(*Anser domesticus*)、家雞(*Gallus domesticus*)、火雞(*Meleagris gallopave*)、秧雞(*Rallus* spp.)、鶉、家鴿(*Columba domestica*)、野鴿(*Columba* spp.)、哀鴿(*Zenaidura macroura*)、梟(*Otus asio inyoensis*)、鷹、雀(*Zonotrichia coronata*)、麻雀(*Passer montana*)、芙蓉類(*Serinus canarius*)、燕類(*Hirundo niplatensis*)、駝鳥(*Struthio camelus*)、人、牛、羊。

分 佈：臺灣、福建、四川、江蘇、上海、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧、吉林；日本、印度、伊朗、巴力斯坦、非洲、蘇聯、美洲、澳洲。

Argas reflexys (Fabricius) 翹緣銳緣蜱 (Teng, 1978:160)

寄 主：家鴿、野鴿(*Columba* spp.)、雞、麻雀(*Passer montanus*)、燕子(*Hirundo* spp.)、人。

分 佈：陝西、山東、河北、北京、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古；蘇聯、伊朗、土耳其、歐洲、北非和東非一些國家。

Argas (Carios) sinensis Jeu et Żhu 中華銳緣蜱 (Jeu et Zhu, 1982:328)

Argas (*Carios*) *sinensis* Jeu et Zhu, 1982:328.

寄 主：*Pipistrellus abramus* (Temminck) 伏翼(家蝠)。

分 佈：四川(重慶)。

Argas testudo (Rossi) (Chao, 1952:224; Luh and Woo, 1950:197)

Argas terstudo (Rossi, 1790):
=*Carios vespertilionis* Latreille, 1796:176.
=*Acarus fischeri* in Savigny, 1826:161.
=*Argas pipistrellae* Audouin, 1832:412.

=*Caris elliptica* Kolenati, 1857:16.
=*Caris longimana* Kolenati, 1857:16.
=*Caris decussata* Kolenati, 1857:16.
=*Caris inermis* Kolenati, 1857:16.
=*Argas pulchella* George, 1876:224.
=*Argas vespertilionis,* Neumann, 1896:20-23.

寄 主：蝙蝠(*Brachyotus dasycnemus*),、蝙蝠(*Miniopterus schreiberi*)、蝙蝠(*Myotus murinus*)、蝙蝠(*Plecotus auritus*)、 蝙蝠(*Rhinolopus hippocrepis*)、 蝙蝠(*Rhinolopus clivosus*)、 蝙蝠(*Synotus barbastellus*)、 蝙蝠(*Vesperugo kuhili*)、 蝙蝠(*Vesperugo noctula*)、蝙蝠(*Vesperugo pipistrellus*)。

分 佈：廣東；埃及、英國。

Argas vespertilionis (Latreille) 蝙蝠銳緣蜱 (Teng, 1978:161)

寄 主：蝙蝠類、人。

分 佈：臺灣、湖南、廣東、廣西、雲南、江蘇、山東、河北、新疆；亞洲及歐洲一些國家。

Ornithodoros lahorensis Neumann 拉合爾鈍緣蜱 (Teng, 1978:163)

寄 主：綿羊、駱駝、山羊、牛、馬、犬、人。

分 佈：新疆；蘇聯、巴基斯坦、伊朗。

Ornithodoros papillipes (Birula) 乳突鈍緣蜱 (Teng, 1978:164)

寄 主：狐、野兔、刺猬、綿羊、犬、人。

分 佈：山西、新疆；蘇聯、阿富汗、印度、伊朗。

Ornithodoros tartakovskyi Olenev 特突鈍緣蜱 (Teng, 1978:166)

寄 主：大沙鼠(*Rhombomys opimus*)、人。

分 佈：新疆；蘇聯。

Penthaleidae 葉爪蟎科

爲植食性、捕食性或食菌性，世界性分布。

Iolinidae 蠊寄蟎科

(Xin, 1988:209)

與直目昆蟲有關。

Iolina nana (Xin, 1988:209)

寄 主：蜚蠊翅基。

分 佈：

Paratydeidae 副蠊螯蟎科

(Xin, 1988:209)

在土壤或落葉層中捕食微小節肢動物。

Ereynetidae 蝓蟎科

(Xin, 1988:209)

在苔蘚、落葉層中捕食者，其他則與陸棲腹足

Ricardoella limacum 蛞蝓蟎 (Xin, 1988:209)
寄 主：蛞蝓、蛇。
分 佈：

Proctotydaeus spp. (Xin, 1988:209)
寄 主：蝗蟲。
分 佈：爪哇。

Tydeidae 鐮螯蟎科

Lorryia reticulata (Oudemans) 網羅里蟎 (Xin, 1988:211)
寄 主：雙翅目、同翅目及鱗翅目等昆蟲。
分 佈：非洲、北歐、美國、加拿大。

Pronematulus pyrohippeus (Treat) 紅騎手小前線蟎 (Xin, 1988:211)
寄 主：夜蛾科五亞科的 40 種夜蛾的鼓膜凹處。
分 佈：

Pronematus ubiquitus (McGregor) 普通前線蟎 (Xin, 1988:210, 211) .
寄 主：為害柑橘，但亦捕食 *Eriophyes ficus* Cotte 無花果癭蟎。
分 佈：南非、美國西部、阿根廷等地，分佈很廣。

Tydeus (s. str.) **californicus** (Banks) 加州鐮螯蟎 (Tseng, 1974:70)
Tetranychoides californicus Banks, 1904:54.
Tydeus californicus, Baker et Wharton, 1958:192.
Tydeus (s. str.) *californicus*, Baker, 1970:170.
棲 息：
寄 主：
分 佈：臺灣。

Tydeus (s. str.) **pygiacus** Tseng (Tseng, 1974:70)
Tydeus (s. str.) *pygiacus* Tseng, 1974:70-72.
棲 息：葡萄。
寄 主：
分 佈：臺灣。

Tydeus (s. str.) taiwanensis Baker 臺灣鐮螯蟎 (Tseng, 1974:69)

Tydeus (s. str.) *taiwanensis* Baker, 1970:173.

棲 息：葡萄。

寄 主：

分 佈：臺灣。

Tydeus sp. 鐮螯蟎 (Chen et al., 1988:181)

寄 主：*Phyllocoptruta oleivora* Ashmead 柑橘銹蟎。

分 佈：浙江。

Cunaxidae 巨鬚蟎科

Armascirus taurus (Kramer) 牛刺疣蟎 (Liang, 1983:104)

寄 主：

分 佈：上海；馬來半島、日本、瑞士、美國。

Cunaxoides parus (Ewing) 山雀似巨鬚蟎 (Xin, 1988:213)

寄 主：蘋蠣蚧。

分 佈：

Cunaxoides oliveri (Schruft) 橄欖似巨須蟎 (Xin, 1988:213)

捕 食： *Calepitrimerus vitis* (Nal.) 葡萄美上三節癭蟎。

分 佈：

Pseudohonzia themedae Den Heyer 管擬幫佐蟎 (Liang, 1983:104)

寄 主：

分 佈：廣東。

Pulaeus pseudominutus (Shiba) 擬小普勞蟎 (Liang, 1983:107)

寄 主：

分 佈：上海；馬來半島、日本。

Rubroscirus africanus Denheyer 非洲紅疣蟎 (Liang, 1983:104; Zeng, et al., 1991:130)

捕 食 性。

分 佈：福建、廣西、雲南、陝西；南非。

Pyemotidae 蒲蟎科

Pyemotes herfsi Oudemans 赫氏蒲蟎 (Xin, 1988:214)

寄 主：昆蟲體外寄生：麥蛾、菜白蝶寄生絵蜂 (*Hemiteles melanarius*)蛹小蜂 (*Pteromalus puparum*)、甲蟲幼蟲及養蠶業，另處理感染此蟎物品人會引起皮

膚病。
分 佈：

Pyemotes tritici 麥蒲蟎 (Xin, 1988:214, 215)
寄 主：麥蛾、穀蛾等倉庫害蟲。
分 佈：

Pyemotes zwoelferi Krczal 茨氏蒲蟎 (Xin, 1988:215)
寄 主：白苜蓿鞘蛾 (*Coleophora deauratella*)幼蟲。
分 佈：新西蘭。

Dolichocybidae 長頭蟎科

Pavania endroedyi Mahunka (Xin, 1988:215)
寄 主：昆蟲體上發現。
分 佈：

Acarophenacaridae 小首蟎科

Acarophenax mahunkai Gao et Zou 麥氏小首蟎 (Gao et Zou, 1994:291)
Acarophenax mahunkai Gao et Zou, 1994:291.
寄 主：
分 佈：上海。

Acarophenax tribollii Newstead et Duvall 特氏小首蟎 (Xin, 1988:215)
寄 主：糧倉中雜擬穀盜及赤擬穀盜等甲的外寄生，寄生在後翅下方。
分 佈：

Scutacaridae 盾蟎科

(Xin, 1988:217)

寄附的昆蟲有目科：等翅目鼻白蟻科 (Rhinotermitidae)；鞘翅目的步甲科 (Carabidae)，牙甲科 (Hydrophilidae)，隱翅甲科 (Staphylinidae)，長泥甲科 (Heteroceridae) 及金龜科 (Scarabaeidae)；膜翅目的蟻科 (Formicidae)蟻科，泥花蜂 (Halictidae) 及蜜蜂科 (Apidae) 。

Tarsonemidae 跗線蟎科(細蟎科)

Cheyletogenus orntus (Xin, 1988:222)
捕 食：*Tarsonemus setifer*
Typhrodromus reticulatus 小網盲走蟎。
分 佈：

Pediculoides ventricosus Newport (Ho et al., 1953:162; Lin, 1968:45)

捕 食：*Pectinophora gossypiella* (Saunders) 紅鈴蟲

分 佈：臺灣、湖北。

Tarspnemella sp. (Xin, 1988:221)

寄 主：寄生于膜翅目昆蟲。

分 佈：

Tarsonemoides sp. (Xin, 1988:221)

寄 主：小蠹 (*Ips* sp.)。

分 佈：

Tarsonemus destructor Smiley 壞跗線蟎 (Xin, 1988:221)

捕 食：葉蟎、短須蟎卵。

分 佈：

Tarsonemus sp. 食菌細蟎 (Lo et al., 1980:450)

Tarsonemus sp., Lo et al., 1980:450.

捕 食：真菌孢子。

分 佈：臺灣。

Typhrodromus curcumerie 胡瓜盲走蟎 (Xin, 1988:222)

捕 食：*Tarsonemus pallidus* 等。

分 佈：

Typhrodromus (s. str.) **eleglidus** Tseng (Tseng, 1983:64)

Typhrodromus (s. str.) *eleglidus* Tseng, 1983:64-67.

棲 息：荔枝。

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Typhrodromus (s. str.) **neocrassus** Tseng (Tseng, 1983:67)

Typhrodromus (s. str.) *neocrassus* Tseng, 1983:67.

棲 息：香石榴(Guajava)。

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Typhrodromus (s. str.) **obesus** Tseng (Tseng, 1983:64)

Typhrodormus (s. str.) *obesus* Tseng, 1983:64.

棲 息：樹上。

捕 食 性。

分 佈：臺灣

Typhrodromus (s. str.) **pseudoserrulatus** Tseng (Tseng, 1983:71)

Typhrodromus (s. str.) *pseudoserrulatus* Tseng, 1983:71.
棲 息：龍眼。
捕 食 性。
分 佈：臺灣

Typhrodromus (s. str.) **tramsvaalensis** (Nesbitt) (Tseng, 1983:62)

Kampimodromus tramsvaalensis Nesbitt, 1951:55-56.
=*Typhrodromus jackmickleyi* De Leon, 1958:75.
=*Typhrodromus pectinatus* Athias-Henriot, 1958:179.
棲 息：豆類。
捕 食 性。
分 佈：臺灣；南非、美國。

Podapolipidae 蚴蟎科

(Xin, 1988:224)

Podapolipoides patangae Lo 土蝗蚴蟎 (Lo, 1989:162; 1990:89-93; 1996:100)

Podapolipoides patangae Lo, 1990:89-93.
寄 主：*Patanga succincta* Linnaeus 條背土蝗
Oedaleus sp. 小車蝗。
分 佈：臺灣。

昆蟲的內寄生或外寄生。蚴蟎屬 *Podapolipoides* 的種類在蝗蟲及蚱蜢體外取食，氣管蝗蟎 (*Locustacrus trachealis* Ewing) 馬氏蝗蟎 (*Locustacrus masoni* Husband 發生在蝗蟲呼吸系統，巴氏蝗蟎 (*Locustacrus buchneri* (Stammer)) 也是氣管寄生物，但不寄生在直翅目而寄生在蜜蜂。有多數屬，如 *Tetrapolipus, Eutarsopolipus,*

Podapolipus, Coccipolipus, Dorsipes 及 *Chrysomelobia* 寄生在各種甲蟲體外。步甲科有七屬是 *Dorsipes* 與 *Eutarsopolipus* 屬的 20 種的寄主。*Ovacarus clivinae* 與 *O. peellei* 雖都是甲蟲的寄生物，但似乎只限于寄生在步甲的陰道膜及輸卵管囊。

Stigmaeidae 長鬚蟎科

Agistemus ampliatus Fan et al. 闊神蕊蟎 (Fan et al., 1997:144)

Agistemus ampliatus Fan et al., 1997:144-146.
棲 息：女貞。
捕 食 性。
分 佈：福建(福州)。

Agistemus citrinus Ehara 柑橘神蕊蟎 (Fan et al., 1997::140; Zeng, et al., 1991:130)

Agistemus citrinus Ehara, 1967:323.

=*Agistemus thaianus* Ehara et Wongsiri, 1984:112-114.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：福建、廣西；泰國、日本。

Agistemus congolensis Gonzalez 剛果神蕊蟎 (Chen et al., 1993:227)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：江西。

Agistemus cycloblanopsis Hu et Chen 青剛神蕊蟎 (Chen et al., 1993:227; Fan et al., 1997:141)
Agistemus cycloblanopsis Hu et Chen, 1994:43.
棲 息：青剛。
捕 食 性。
分 佈：江西。

Agistemus exsertus Gonzalez-Rodriguey 具瘤密蕊蟎 (ASZI, 1987, 2:802; Chen et al., 1993:227; Dai, 1992:41; Fan et al., 1997:141; He et al., 1996(4):33; Wang, 1981:82; Xin, 1988:226; Yue, et al., 1991:127-128; Zeng, et al., 1991:130; Zhao et Wei, 1991:11-15)
Agistemus exsertus Gonzalez-Rodriguey, 1963:343.
=*Agistemus lichanensis* Hu et Chen, 1994:43.
別 名：*長須蟎*。
棲 息：蘋果、杏、沙梨、油梨、柑橘、荔枝、獼猴桃、蝴蝶果、茶、青剛、竹葉、蕨葉、雜草。
捕 食：*Dialeurodes citri* 柑橘粉虱
Stephanitis chinensis 茶網蝽(卵)
Brevipalpus obovatus 卵形短須蟎
Eotetranychus sexmaculatus Riley 六斑始葉蟎
Eriophyes sheldoni Ewing 柑橘癭蟎
Oligonychus biharensis 比哈小爪蟎
Panonychus citri (McGregor) 柑橘全爪蟎(卵、幼蟎)
Panonychus ulmi (Koch) 蘋果全爪蟎
Polyphagotarsonemus latus 多食跗線蟎(卵、若蟲)
Phyllocoptruta oleivora Ashmead 柑橘癭蟎
各種葉蟎的卵幼蟎，並可以蚜蟲、蚧、粉蝨的若蟲和蜜露爲食料。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南、廣西、貴州、四川、陝西、山東、北京；日本、印度、巴基斯坦、埃及、美國。

Agistemus giganteus Ehara et Wongsiri 巨神蕊蟎 (Fan et al., 1997:142)
Agistemus giganteus Ehara et Wongsiri, 1984:114.
棲 息：草莓、水稻、白茅根、禾本科雜草、雙子葉雜草。
捕 食 性。
分 佈：福建；泰國。

Agistemus junipreus Hu et Chen 刺柏神蕊蟎 (Chen et al., 1993:227; Fan et al., 1997:142)

Agistemus junipreus Hu et Chen, 1994:42.

棲 息：柳杉、水杉。

捕 食 性。

分 佈：福建、江西。

Agistemus lichuanensis Chen et al. 黎川神蕊蟎 (Chen et al., 1993:227)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：江西。

Agistemus miyiensis Fan et al. 米易神蕊蟎 (Fan et al., 1997:143)

Agistemus miyiensis Fan et al., 1997:143.

棲 息：泡火繩。

捕 食 性。

分 佈：四川(米易)。

Agistemus terminalis (Quayle) 細毛神蕊蟎 (ASZI, 1987, 2:803; Chen et al., 1993:227; Fan et al., 1997:143; Wang, 1981:82; Xin, 1988:226; Zeng, et al., 1991:130)

Caligonus terminalis Quayle, 1912:499.

棲 息：

捕 食：*Panonychus citri* (McGregor) 柑橘全爪蟎

Eotetranychus sexmaculatus (Riley) 六點始葉蟎

葉蟎

癭蟎

Unaspis yanonensis (Kuwana) 矢尖蚧。

分 佈：臺灣、江西、廣東、海南、廣西；日本、印度、美國、墨西哥。

Agistemus thainus Ehara 泰國神蕊蟎 (Chen et al., 1993:227)

Agistemus thainus Ehara, 1965:

捕 食 性。

分 佈：江西。

Eryngiopus jiangxiensis Hu et Chen 江西刺芹蟎 (Chen et al., 1993:228)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Eryngiopus nanchangensis Chen et al. 南昌刺芹蟎 (Chen et al., 1993:228)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Eustigmaeus feengchengensis Chen et al. 豐城真長鬚蟎 (Chen et al., 1993:227)

捕 食 性。
分 佈：江西。

Eustigmaeus firmus Tseng 堅真長鬚蟎 (Zhang et Cui, 1992:697)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、四川。

Eustigmaeus jiangxiensis Chen et al. 江西真長鬚蟎 (Chen et al., 1993:227)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Eustigmaeus schusteri Summers et Price 蘇氏真長鬚蟎 (Zhang et Cui, 1992:697)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、湖北；美國。

Eustigmaeus segnis (Koch) 塞氏真長須蟎 (Chen et al., 1993:228)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Eustigmaeus wuningensis Chen et al. 武寧真長鬚蟎 (Chen et al., 1993:227)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Mulledeeria sichuanensis Wang 四川圓鬚蟎 (Chen et al., 1993:227)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Zetazellis lushanensis Hu et Chen 廬山尋蟎 (Chen et al., 1993:228)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Zetazellia mali (Ewing) 蘋果尋蟎 (ASZI, 1987, 2:803; Wang, 1981:81; Xin, 1988:225)
棲 息：蘋果、梨、李。
捕 食：*Tetranychus viennensis* Zacher 山楂葉蟎
Panonychus ulmi (Koch) 蘋果全爪蟎。
分 佈：山東、山西、遼寧；歐洲、美國、加拿大。

Eupalopsellidae 小真石蟎科

Saniosulus nudus Summers 能捕食紅蠟蚧(*Chrysomphalus aonidum* (Linnaeus))，在印度捕食甘蔗蚧(*Melanaspis glomerata* (Green)).

Camerobiidae 拱蟎科

Neophyllobius 專捕食蚧蟲，*N. ambulans* Meyer 捕食南非柑橘之 *Aonidiella aurantii* (Naskell) 及另 *Neophyllobius* sp. 對新西蘭蘋果之歐洲果實蚧 (*Quadraspidiotus ostreaeformis* (Curtis)) 有自然抑制效果；也有一些種類對癭蟎(Eriophyoidea)或僞葉蟎(Tenuipalpidae)有捕食抑制效果。

Cheyletidae 肉食蟎科

Acaropsella konoi Tseng (Tseng, 1976:409)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Acaropsis soller Rohdendorf 陽罩單梳蟎 (ASZI, 1987, 2:842)
棲 息：倉貯食品表面活動
捕 食：蟎類
倉庫害蟲(卵、幼蟲)。
分 佈：四川、河南、陝西；蘇聯、英國、美國。

Bak micidus (Tseng, 1976:409)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Caudacheles lieni Tseng (Tseng, 1976:409)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Caudacheles trigintaduae Lin et Zhang 三十二尾片螯蟎 (Lin et Zhang, 1997:136)
Caudacheles trigintaduae Lin et Zhang, 1997:136-137.
棲 息：木棉(*Bombax malabaricum* DC.)樹皮、米糠。
捕 食 性。
分 佈：福建(漳州、福州)。

Chelacheles lanceolatus Tseng (Tseng, 1976:409)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Cheletogenes meihuashanense Lin et Liu 梅花山螯頰蟎 (Lin et Liu, 1991:40; Lin et Liu, 1994:220)
Cheletogenes meihuashanense Lin et Liu, 1991:40.
Cheletogenes meihuashanense Lin et Liu, 1994:220.
棲 息：毛竹上 (*Phyllostachys pubescens* Mazel.)。
捕 食 性。
分 佈：福建(龍岩梅花山自然保護區)。

Cheletogenes monosetosus Tseng (Tseng, 1976:409)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Cheletogenes ornatus (Canestrini et Fanzago) (Lo, 1996:102)
捕 食：蚧蟲。
分 佈：世界各地廣布。

Cheletominus binus Tseng (Tseng, 1973:76)
捕 食：蔥頭粉蟎。
分 佈：臺灣。

Cheletomomimus bisetosus Tseng (Tseng, 1976:409)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Cheletomorpha lepidopterum Shaw 鱗翅觸足蟎 (ASZI, 1987, 2:841)
棲 息：倉貯中。
捕 食：倉貯中蟎類及其他害蟲的卵。
分 佈：雲南、四川、湖南、浙江、江蘇、上海、陝西；世界各國。

Cheletonella pilos Tseng (Tseng, 1976:409)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Cheyletus digitarsus Sugimoto (Tseng, 1976:409)
Cheyletus digitarsus Sugimoto
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Cheyletus eruditus (Schrank) 普通肉食蟎 (ASZI, 1987, 2:840; Gao, 1996, 12(3):139)
棲 息：倉貯中。
捕 食：*Ephestia elutella* (Hübner) 煙粉斑螟
蟎類。
分 佈：雲南、貴州、四川、湖南、浙江、上海、河南、黑龍江；世界各國。

Cheyletus malaccensis Oudemans 馬六甲肉食蟎 (ASZI, 1987, 2:841)
棲 息：倉貯中。
捕 食：蟎類。
分 佈：四川、浙江、上海、河南、河北、北京、吉林；蘇聯、土耳其、伊朗、捷克、

波蘭、英國、美國、澳洲。

Cheyletus sp. 肉食蟎 (Wu, 1954:135)

捕 食：*Pleonomus canaliculatus* Faldermann 小麥溝叩甲(*Cratonychus canaliculatus* Faldermann, 1835 = *Serropalpus spinicollis* Falderm., 1835, *Ictis sinensis* Cand., 1863, *Athous acutidens* Fairm., 1878)。

分 佈：華中、華北；蒙古。

Columbicheyla bicirci Lin et Zhang 雙圓哥螯蟎 (Lin et Zhang, 1997:133)

Columbicheyla bicirci Lin et Zhang, 1997:133-134.

棲 息：榕樹(*Ficus* sp.)樹皮。

捕 食 性。

分 佈：福建(永定)。

Columbicheyla macroflabellata Thewke et Enns 大扇毛哥螯蟎 (Lin et Zhang, 1997:131)

Columbicheyla macroflabellata Thewke et Enns, 1972:450-453.

棲 息：馬尾松(*Pinus massoniana* Lamb)樹皮

楓樹(*Liquidambar formasana* Hance)樹皮。

捕 食 性。

分 佈：福建；美國。

Eucheyletia taurica Volgin 牲真扇毛蟎 (Deng et al., 1989:231)

棲 息：稻穀、米、甘薯乾、米糠、普通田鼠 (*Microtus arvalis* Pall) 和林姬鼠 (*Apodemus sylvaticus* Linnaeus) 的巢。

捕 食：粉蟎和粉蟎卵。

分 佈：四川、浙江、上海；日本、蘇聯、英國。

Hemicheyletia anabora (Tseng, 1976:409)

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Hemicheyletia arecana Tseng 捕食蟎 (Tseng, 1972:8)

棲 息：檳榔、*Areca catechu* Linnaeus、*Carcinia spicata* H.。

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Hemicheyletia bakeri (Tseng, 1976:409)

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Hemicheyletia chui Tseng (Tseng, 1976:409)

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Hemicheyletia omissa Tseng (Tseng, 1976:409)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Hemicheyletia pusillifolium Lin et al. 小葉半扇毛蟎 (Lin et al., 1994:141)
Hemicheyletia pusillifolium Lin et al., 1994:141.
棲 息：毛竹(*Phyllostachys pubescens* Mazel)。
捕 食 性。
分 佈：福建(上杭)。

Hemicheyletia wellsi (Tseng, 1976:409)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Hemicheyletia wellsina (Tseng, 1976:409)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Hoffmannita navicula Lin et Zhang 舟霍夫蟎 (Lin et Zhang, 1997:134)
Hoffmannita navicula Lin et Zhang, 1997:134-135.
棲 息：楊梅(*Myrica rubra* (Lour.) Sieb. et Zucc.)樹皮。
捕 食 性。
分 佈：福建(建甌)。

Oudemansicheyla denmark (Tseng, 1976:409)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Myobiidae 肉蟎科

Radfordia ensifera Poppe 劍毛雷氏肉蟎 (Liu, 1958:369)
寄 主：溝鼠(*Rattus norvegicus* Erxl.)。
分 佈：內蒙古(古圖里河)。

Radfordia lemnina Koch 來寧雷氏肉蟎 (Liu, 1958:370)
寄 主：田鼠(*Microtus*)。
分 佈：內蒙古(古圖里河)。

Anystidae 大赤蟎科

Anystis baccarum (Linnaeus) 圓果大赤蟎 (Tang et al., 1995, 17(4):168; Wu, 1994, 16(3):101-105; Wu et Shen, 1990,

12(2):100; Zeng, et al., 1991:130)

棲 息：九黑香(*Murraya exotic* L.)、山指甲(*Ligustrum sinensis* Lood.)、甜橙(*Citrus sinensis* (L.))、柑(*Citrus roticulata* Blanco)、月光花(*Calonyction aculeaum* (L.))、寶巾(*Bougainvillea glabra* Chicy)、白蘭(*Michelia alba* Dc.)、馬尾松(*Pinus massoniana* Lamb.)、茶(*Camelia sinensis* Kuntz)、勝紅薊(*Agcratum conyzoides* L.)、荔枝(*Litchi chinensis* Sonn.)、龍眼(*Dimocarpus longan* Lour.)、蓖麻(*Ricinus communis* L.)、蘿蔔(*Ra[jamis satova* L.]、紅花羊蹄甲(*Baujhinia blackeana* Dunn.)、松。

捕 食：*Diaphorina citri* Kuwayama 柑橘木蝨
Aphis citricola van der Goot 橘捲葉蚜
Hemiberlesia pitysophila Takagi 松突圓蚧
Matsacoccus matsumurae 日本松幹蚧
Oracella acuta (Lobdell) 濕地松粉蚧
Panonychus citri McGregor 橘全爪蟎
Phyllocoptruta oleivora Ashmead 柑橘銹蟎。

分 佈：廣東、廣西。

Anystis sp. 大赤蟎 (He, et al., 1991:143)

捕 食：*Stenotarsonemus spinki* Smily 斯氏狹跗線蟎(稻跗線蟎)。

分 佈：福建、廣東、廣西。

Anystis sp. 大赤蟎 (Zhao et Wei, 1991:11-15)

Anystis sp. Zhao et Wei, 1991:11.

捕 食：橘全爪蟎。

分 佈：貴州。

Anystis sp. 大赤蟎 (Sun, 1986:102)

捕 食：*Metaceronema japonica* Mask. 油茶刺綿蚧。

分 佈：浙江。

Erythraeidae 赤蟎科(地蟎科)

Abrolopphus sp. 食卵赤蟎 (Hubei, Tian-men, 1980(3):75)

Abrophees (!) sp. Hubeum Tian-men, 1980(3):75.

捕 食：紅鈴蟲(卵)。

分 佈：湖北。

Charletonia taiwanensis Tsai et Chow (Lo, 1989:161)

Charletonia taiwanensis Tsai et Chow, 1988:171-181.

寄 主：*Condracris rosea* DeGeer 棉蝗
Patanga succincta Linnaeus 條背土蝗。

分 佈：臺灣。

Neotrombidiidae 新絨蟎科

(Xin, 1988:301)

Neothrombium gryllotalpae Fan 螻蛄新絨蟎 (Fan, 1984:319)

Neothrombium gryllotalpae Fan, 1984:319.

寄 主：*Gryllotalpa africana* Palisot de Beauvois 非洲螻蛄。

分 佈：上海。

Neothrombium neglectum (Bruyant)選擇新絨蟎 (Fan, 1984:320)

寄 主：*Gryllotalpa africana* Palisot de Beauvois 非洲螻蛄。

分 佈：上海；意大利、法國。

新絨蟎屬 (*Neotrombidium*) 的幼蟎寄生在各種甲蟲，上包括天牛科、叩甲科、郭公蟲科、擬步甲科。

Trombidiidae 絨蟎科

(Xie et Sterling, 1987, 14(3):154; Xin, 1988:301)

本科極大，有 50 餘屬 300 種以上。多寄生在直翅目、鱗翅目、鞘翅目、雙翅目以及各種蜘蛛。

絨蟎屬 (*Trombidium*) 的種類寄生在各種鱗翅目昆蟲上。絨蟎亞科的 *Dolichothrombium* 及 *Angelothrombium* 屬種類幼蟎寄生在蝗蟲，而成蟎及若蟎則捕食蟻。此二屬成蟎稱爲 Giant red velvet mite. *Eutrombidum rostratus* 在全世界寄生直翅目的蟎類。

蚜異絨蟎 (*Allothrombium aphidis*) 及 *A. fulginosum* 是蚜蟲上常見的寄生物。微絨蟎亞科的微絨蟎屬 (*Microtrombidium*) 的種類寄生在蚜蟲上。

Allothrombium ignotum Willmann 無視異絨蟎 (Dong, 1991:43; Zhang et Li, 1994, 3(2):100-103; Zhang et al., 1993, 2(1):36-40; Zhang et al., 1995(3):116-117)

捕 食：*Aphis gossypii* Glover 棉蚜。

分 佈：江蘇、上海、陝西、山西。

Allothrombium ovatum 卵形異絨蟎 (Chen et al., 1981, 18(4):160-162; Dong, 1991, 7(1):43; Song, 1984, (4):36-37; Zhang et al., 1996, 23(3):198-202)

捕 食：*Aphis gossypii* Glover 棉蚜。

分 佈：山西(北方棉區)。

Allothrombium pulvinum Ewing 小枕異絨蟎 (Chen, 1987, 9(2):74-77, 110; Chen et al., 1981, 18(4):160-162; Chen et al., 1982, 18(4):160-162; Chen et al., 1991, (112):31-37; 1994, (117):113-121; Wang et Chen, 1991:137-143; Wang et al., 1998, 20(2):56-63; Wang et al., 1991, 13(3):137-143; Xu et al., 1993, 9(4):145-147; Zhang, 1988, 4(2):79-82; Zhang et Xin, 1988, 15(2):78, 84; Zhang et Xin, 1989, 32(2):192-199; Zhang et al., 1993, (18):379-384; Zhu et al., 1989, 89(8):15-16)

捕 食：*Aphis gossypii* Glover 棉蚜

Osttrinia furnacalis (Guenée) 玉米螟
Pectinophora gossypiella (Saunders) 紅鈴蟲
Tetranychus cinnabarinus (Boisduval) 朱砂葉蟎。
分 佈：浙江、江蘇、上海、安徽、山東、北京。

Allothrombium sp. 異絨蟎 (Chen, 1987:74-77)
捕 食：二點葉蟎(棉葉蟎)。
分 佈：江蘇。

Eutrombidium sp. 蟋蟀絨蟎 (Lo et Lee, 1994:552)
Eutrombidium sp., Lo et Lee, 1994:552.
寄 主：*Teleogryllus occipitalis* 眉紋蟋蟀。
分 佈：臺灣。

Falsivalgothrombium longitarsis Zhang et Xin 長跗僞彎腿絨蟎 (Zhang et Xin, 1989:33)
Falsivalgothrombium longitarsis Zhang et Xin, 1989:33-35.
捕 食 性。
分 佈：上海(森林公園)。

Podothrombium paucisetarum Zhang et Xin 寡毛足絨蟎 (Zhang et Xin, 1989:169)
Podothrombium paucisetarum Zhang et Xin, 1989:169-172.
捕 食：蚜蟲。
分 佈：上海。

Trombidium hyperi Nercammen 肥絨蟎 (Dong, 1991:43)
捕 食：*Aphis gossypi* Glver 棉蚜。
分 佈：江蘇、上海、湖北、陝西、山西。

Trombiculidae 恙蟎科

Acomatacarus majesticus Chen et Hsu (Tung, 1957:209; Wang, 1962:275)
Acomatacarus majesticus Chen et Hsu, 1955:
寄 主：羅賽鼠(*Rattus losea exiguus* A. B. Howell)。
分 佈：山東。

Acomstacarus major Schluger 肥巨阿康恙蟎 (Liu, 1958:185)
Acomstacarus major Schluger, 1955:
寄 主：溝鼠(*Rattus norvegicus*)、小家鼠(*Mus musculus* Linnaeus)。
分 佈：北京。

Acomatacarus yosanoi Fukuzumi et Obata 與氏阿康恙蟎 (Hsu, 1959:452-459)
Acomatacarus yosanoi Fukuzumi et Obata, 1953:
寄 主：

分 佈：

Acomatacarus sp. 阿康恙蟎 (Hsu et Wen, 1956:129-130; Jeu, 1956:433-448)

寄 主：多疣壁虎(*Gekko japonicus*)、家犬(*Canis familiaris*)、家貓(*Felis domestica*)、家豬(*Sus scrofa*)、山羊(*Capra hircus*)、褐家鼠(*Rattus norvegicus ceser*)、家鼠(*Rattus rattus alexandrinus*)、家兔(*Lepus cuniculus*)、安哥拉兔(Angola)。

分 佈：上海、南京。

Ascoschoengastia aliena Wang et Liao 異樣囊棒恙蟎 (Wang et Liao, 1981:106; 1981:218)

Ascoschoengastia aliena Wang et Liao, 1981:218-219.

寄 主：青毛鼠(*Rattus bowersii latouchei*)。

分 佈：福建。

Ascoschoengastia (Laurentella) audyi (Womersley, 1952) 中緬囊棒恙蟎 (Yu et al., 1980:150)

Ascoschoengastia (*Laurentella*) *audyi* (Womersley, 1952:)

寄 主：

分 佈：中國；緬甸。

Ascoschoengastia (Laurentella) indica (Hirst) 印度囊棒恙蟎 (Wang et Liao, 1981:106; Yu et al.,1980:150)

Ascoschoengastia (*Laurentella*) *indica* (Hirst), 1915:

寄 主：臭鼩(*Suncus murinus*)、白腹巨鼠(*Rattus edwardsi edwardsi*)、黃胸鼠(*Rattus flavipectus*)、社鼠(*Rattus niviventer confucianus*)、褐家鼠(*Rattus norvegicus*)、黃毛鼠(*Rattus losea exiguus*)、家鼠(指名亞種)(*Rattus rattus rattus*)、家兔(*Lepus domesticus*)。

分 佈：福建；印度。

Ascoschoengastia (Laurentella) kiangsiensis Hsü 江西背展恙蟎 (Wang et Ku, 1979:96)

寄 主：褐家鼠(*Rattus norvegicus*),黃胸鼠(*Rattus flavipectus*)。

分 佈：貴州。

Ascoschoengastia latyshevi 拉盾囊棒恙蟎 (Sun, 1994:74)

寄 主：黑線倉鼠(*Cricetulus barabensis*)。

分 佈：遼寧。

Ascoschoengastia leechi Domrow 類齊囊棒恙蟎 (Wang et Liao, 1981:106; Wang et Liao, 1981:220; Wen, et al., 1982:468)

寄 主：小泡巨鼠(*Rattus edwardsi edwardsi*)、社鼠(*Rattus niviventer confucianus*)、灰腹鼠(*Rattus niviventer lepcha*)(西藏)、黑家鼠(*Rattus rattus*)、赤腹松鼠(*Callosciurus erythraeus ningpoensis*)、紅頰長吻松鼠(*Dremomys rufigens*)(寮國)、棕鼯鼠(*Petaurista petaurista rufipes*)、花松鼠(*Tamiops swinhoei*)、普通樹鼩(*Tupaia glis*)(泰國)。

分 佈：福建、雲南、西藏、四川；寮國、泰國。

Ascoschoengastia (Laurentella) lorius (Gunther) 鸚鵡囊棒恙蟎 (Yu et al., 1980:150)

Ascoschoengastia (*Laurentella*) *lorius* (Gunther, 1939:)

寄 主：

分 佈：中國。

Ascoschoengastia minheensis Yang 民和囊棒恙蟎 (Yang, 1992:306)

Ascoschoengastia minheensis Yang, 1992:306-307.

寄 主：子午沙鼠(*Meriones meridianus* Pallas, 1773)、小鼩鼱(*Crocidura* sp.)

分 佈：青海(民和縣)。

Ascoschoengastia (Laurentella) montana Yu et al. 山林囊棒恙蟎 (Yu et al., 1980:151)

Ascoschoengastia (*Laurentella*) *montana* Yu et al., 1980:151-152.

寄 主：雲南鼯鼠(*Petaurista yunnanensis* (Anderson))

分 佈：雲南。

Ascoschoengastia nanjiangensis Zhou et al. 南江囊棒恙蟎 (Zhou et al., 1986:179)

Ascoschoengastia nanjiangensis Zhou et al., 1986:179.

寄 主：岩松鼠(*Sciurotamias davidianus* Milne-Edwards)。

分 佈：四川(南江縣)。

Ascoschoengastia (Laurentella) paishaensis (Chen et al.) 白沙囊棒恙蟎 (Wang et Liao, 1981:106; Yu et al., 1980:150)

Euschoengastia audyi var. *paishaensis* Chen et al., 1958:

寄 主：白腹巨鼠(*Rattis edwardso edwardso*)、針毛鼠(*Rattus fulvescens huang*)、赤腹松鼠(*Callosciurus erythraeus ningpoensis*)、花松鼠(*Tamiops swinhoei*)。

分 佈：福建。

Ascoschoengastia (Laurentella) yunnanensis Yu et al. 雲南囊棒恙蟎 (Yu et al., 1980:150)

Ascoschoengastia (*Laurentella*) *yunnanensis* Yu et al., 1980:150-151.

寄 主：雲南鼯鼠(*Petaurista yunnanensis* (Anderson))
黃胸鼠(*Rattus flavipectus* (Milne-Edwards, 1871))。

分 佈：雲南。

Chatia (Shunsennia) hertigi 後角甲梯恙蟎 (Sun, 1994:74)

寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)、東方田鼠(*Microtus fortis*)、大林姬鼠(*Apodemus peninsulae*)、黑線倉鼠(*Cricetulus barabensis*)、棕背鼮(*Clethrionomys rufocanus*)、花鼠(*Eutamias sibiricus*)。

分 佈：遼寧。

Cheladonta deqinensis Yu et al. 德欽鉗齒恙蟎 (Yu et al., 1983:68)

Cheladonta deqinensis Yu et al., 1983:68-69.

寄 主：和平田鼠(*Microtus irene*)。

分 佈：雲南(德欽縣白馬雪山)。

Cheladonta globosea Yang 球形鉗齒恙蟎 (Yang, 1992:303)

Cheladonta globosea Yang, 1992:303-304.

寄 主：松田鼠(*Pitymys irene* Thomas)、間顱鼠兔(*Ochotona cansus* Lyon)。

分 佈：青海(果洛久治縣)。

Cheladonta ikaoensis (Sasa et al.) 伊香鉗齒恙蟎(Chen, 1978:197; Sun, 1994:72; Wang et Liao, 1981:107)

Cheladonta ikaoensis (Sasa et al.), 1951:

寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)、大倉鼠(*Cricetulus tritan*)、東方田鼠(*Microtus fortis*)、東北鼢鼠(*Myospalax psilurus*)、白腹鼠(*Rattus coxingi andersoni*)、黃毛鼠(*Rattus losea exiguus*)、社鼠(*Rattus niviventer confucianus*)。

分 佈：福建、江蘇、遼寧。

Chiroptella (Oudemansidium) anhuiensis Chen et al. 安徽翼手恙蟎 (Chen et al., 1980:156)

Chiroptella (*Oudemansidium*) *anhuiensis* Chen et al., 1980:156-157.

寄 主：普通長翼蝠 *Miniopterus schreibersi* Kuhl)。

分 佈：安徽。

Chiroptella (s. str.) **insolli** Philip et Traub 尹氏翼手恙蟎 (Zhao et Qiu, 1979:285)

Chiroptella (s. str.) *insolli* Philip et Traub

寄 主：蝙蝠。

分 佈：廣西。

Chiropsella (Oudemansidium) muscae 膜嗜翼手恙蟎 (Sun, 1994:74)

寄 主：普通山蝠(*Nyctalus noctula*)。

分 佈：遼寧。

Diplectria sinensis Zhao et Qiu 中華雙跗恙蟎 (Zhao et Qiu, 1979:282)

Diplectria sinensis Zhao et Qiu, 1979:282-283.

寄 主：蝙蝠。

分 佈：廣西。

Doloisia diangularis Zhao et al. 雙角珠恙蟎 (Zhao et al., 1989:174)

Doloisia diangularis Zhao et al., 1989:174-175.

寄 主：社鼠(*Rattus confucianus*)鼻內。

分 佈：廣東(羅定縣)。

Doloisia furcipelta Yu et al. 叉盾杜羅恙蟎 (Yu et al., 1983:67-68)

Doloisia furcipelta Yu et al., 1983:67-68.

寄 主：大足鼠(*Rattus nitidus*)。

分 佈：雲南(瀾滄江邊)。

Doloisia guangdongensis Liang 廣東珠恙蟎 (Wang et Liao, 1981:107)

Doloisia guangdongensis Liang, 1959:

寄 主：白腹巨鼠(*Rattus edwardsi edwardsi*)、針毛鼠(*Rattis fulvescens huang*)、黃毛鼠(*Rattus losea exiguus*)、社鼠(*Rattus niviventer confucianus*)。

分 佈：福建、廣東。

Doloisia hopuensis Hsu et Chen 合浦珠恙蟎 (Hsu et Chen, 1964:744)

Doloisia hopuensis Hsu et Chen, 1964:744.

寄 主：灰腹鼠(*Rattus nitidus nitidus* Hodgson, 1845)、黃毛鼠(*Rattus rattoides exiguus* Howell, 1927)。

分 佈：廣東(合浦賽圩、欽縣)。

Doloisia moica Chen et Hsu 莫卡珠恙蟎 (Wang et Liao, 1981:107)

Doloisia moica Chen et Hsu, 1965:

寄 主：青毛鼠(*Rattus bowersii latouchei*)。

分 佈：福建。

Doloisia outoensis Chen et Hsu 拗頭珠恙蟎 (Wang et Liao, 1981:107)

Doloisia outoensis Chen et Hsu, 1965:

寄 主：青毛鼠(*Rattus bowersii latouchei*)、白腹巨鼠(*Rattus edwardsi edwardsi*)。

分 佈：福建。

Doloisia sinensis (Liang et Hwang) 中華珠恙蟎 (Wang et Liao, 1981:107)

Doloisia sinensis (Liang et Hwang), 1959:

寄 主：青毛鼠(*Rattus bowersii latouchei*)。

分 佈：福建。

Doloisia spatulata Chen et Hsu 槍感珠恙蟎 (Wang et Liao, 1981:107)

Doloisia spatulata Chen et Hsu, 1965:

寄 主：社鼠(*Rattus niviventer confucianus*)。

分 佈：福建。

Doloisia taihui Chen 大湖杜羅恙蟎 (Chen, 1978:200)

Doloisia taihui Chen, 1978:200.

寄 主：社鼠(*Rattus confucianus* Milne-Edwards, 1871)。

分 佈：江蘇。

Doloisia taishanensis Teng 泰山珠恙蟎 (Teng, 1982:332)

Doloisia taishanensis Teng, 1982:332.

寄 主：社鼠(*Rattus confusianus confusianus* Milne-Edwards, 1871)。

分 佈：山東(泰山)。

Doloisia wuyishana Hsu et al. 武夷珠恙蟎 (Hsu et al., 1981:214-217)

Doloisia wuyishana Hsu et al., 1981:214.
寄 主：針毛鼠(*Rattus fulvescens*)。
分 佈：福建(武夷山區)。

Dongyangsha longdongensis Mo et al. 龍洞東洋恙蟎 (Mo, et al., 1990:495)
Dongyangsha longdongensis Mo, et al., 1990:495.
寄 主：黃毛鼠(*Rattus rattoides exiguus* Howell, 1927)、黃胸鼠(*Rattus rattus flavipectus*)。
分 佈：廣東(廣州龍洞)。

Euschöngastia alpina (Sasa et al.) 高山真棒恙蟎 (Chen, 1978:197; Sun, 1994:72)
Euschöngastia alpina (Sasa et al., 1954:)
寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)、黑線倉鼠(*Cricetulus barabensis*)、花鼠(*Eutamias sibiricus*)、大林姬鼠(*Apodemus peninsulae*)、東方田鼠(*Microtus fortis*)、東北鼢鼠(*Myospalax psilurus*)、岩松鼠(*Sciurota-mias davidianus*)、大倉鼠(*Cricetulus tritan*)、棕背鼸(*Clethrionomys rufocanus*)。
分 佈：江蘇、遼寧。

Euschöengastia caveacola Wang et Ku 穴居真棒恙蟎 (Wang et Ku, 1979:93)
Euschöengastia caveacola Wang et Ku, 1979:93.
寄 主：小泡巨鼠(*Rattus edwardsi*)。
分 佈：貴州。

Euschöengastia centralkwangtunga Mo et al. 粵中真棒[恙蟲] (Mo et al., 1959:255)
Euschöengastia centralkwangtunga Mo et al., 1959:255.
寄 主：臭鼩鼱(*Suncus murinus*)。
分 佈：廣東(順德)。

Euschöngastia cheni Wang 陳氏真棒恙蟎 (Wang, 1962:271)
Euschöngastia cheni Wang, 1962:271.
寄 主：羅賽鼠(*Rattus losea exiguus* A. B. Howell)。
分 佈：福建(寧德)。

Euschöengastia indica (Hirst, 1915) 印度真棒恙蟎 (Jeu, 1956:434; Wang, 1962:276; Wang et Ku, 1979:93)
Euschöengastia indica (Hirst, 1915:)
寄 主：小泡巨鼠(*Rattus edwardsi*)、羅賽鼠(*Rattus losea exiguus* A. B. Howell)。
分 佈：福建、廣東、貴州。

Euschöngastia ikaoensis (Sasa et al.) (Wang, 1962:276)
Euschöngastia ikaoensis (Sasa et al., 1951:)
寄 主：羅賽鼠(*Rattus losea exiguus* A. B. Howell)。
分 佈：

Euschöengastia jiuzhiensis Yang 久治真棒恙蟎 (Yang, 1992:305)

Euschöengastia jiuzhiensis Yang, 1992:305-306.

寄 主：高原鼠兔(*Ochotona curzoniae* Hodgson, 1858)、間顱鼠兔(*Ochotona cansus* Lyon, 1907)、根田鼠(*Microtus oeconomus* Pallas, 1776)、松田鼠(*Pitymys irene* Thomas, 1911)。

分 佈：青海(果洛久治縣)。

Euschöngastia latyshevi (Schluger) 花鼠真棒恙蟎 (Sun, 1979:355)

寄 主：花鼠(*Eutamia sibiricus*)。

分 佈：遼寧。

Euschöngastia schlugeri var. **fukienensis** Chen et al. 福建真棒恙蟎 (Wang, 1962:276)

Euschöngastia schlugeri var. *fukienensis* Chen et al., 1958:

寄 主：羅賽鼠(*Rattus losea exiguus* A. B. Howell)。

分 佈：福建。

Euschöengastia weifangensis Teng et Zhang 濰坊真棒恙蟎 (Teng et Zhang, 1989:52)

Euschöengastia weifangensis Teng et Zhang, 1989:52-54.

寄 主：褐家鼠(*Rattus norvegicus*)耳殼。

分 佈：山東(濰坊)。

Eutrombicula (Siseca) hubeica Xu 湖北真恙蟎 (Xu, 1982:282)

Eutrombicula (*Siseca*) *hubeica* Xu, 1982:282-283.

寄 主：野外不詳洞穴內。

分 佈：湖北(武昌)。

Eutrombicula (Siseca) wuyiensis Song et Wang 武夷真恙蟎 (Song et Wang, 1986:184)

Eutrombicula (*Siseca*) *wuyiensis* Song et Wang, 1986:184-185.

寄 主：烏鶇(*Turdus merula*)、紅尾鴝(*Phoemienrus aurorens*)。

分 佈：江西(鉛山縣武夷山自然保護區)。

Gahrliepia (s. str.) **agrariusia** (Hsu et al.) 田姬葛李恙蟎 (Chen, 1978:198; 1980:99, 291-297)

Gahrliepia (s. str.) *agrariusia* (Hsu et al., 1967:)

寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)。

分 佈：江蘇。

Gahrliepia (s. str.) **chekiengensis** (Chu) 浙江葛李恙蟎 (Chen, 1978:198; 1980:291-297)

Gahrliepia (s. str.) *chekiengensis* (Chu, 1964:)

寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)、社鼠(*Rattis confucianus confucianus* Milne-Edwards, 1871)。

分 佈：江蘇。

Gahrliepia (s. str.) **chungkingensis** Jeu et al. 重慶葛李恙蟎 (Jeu et al., 1963:43)

Gahrliepia (s. str.) *chungkingensis* Jeu et al., 1963:43.
寄 主：社鼠(*Rattus confucianus* Milne-Edwards, 1871)。
分 佈：四川(重慶)。

Gahrliepia (Schöngastiella) confuciana Wang 社背展恙蟎 (Wang, 1964:88)
Gahrliepia (*Schöngastiella*) *confuciana* Wang, 1964:88.
寄 主：社鼠(*Rattus confucianus confucianus* Milne-Edwards, 1871)。
分 佈：福建。

Gahrliepia (s. str.) **deqinensis** Yu et Yang 德欽葛李恙蟎 (Yu et Yang, 1982:54)
Gahrliepia (s. str.) *deqinensis* Yu et Yang, 1982:54-55.
寄 主：松田鼠(*Pitymys irene irene*)。
分 佈：雲南(德欽)。

Gahrliepia (s. str.) **eurypunctata** Jeu et al. 高痕葛李恙蟎 (Jeu et al., 1983:101)
Gahrliepia (s. str.) *eurypunctata* Jeu et al., 1983:101.
寄 主：社鼠(*Rattus niviventer confucianus*)。
分 佈：雲南。

Gahrliepia (Intermedialia) hegu Yu et al. 河谷甲邏恙蟎 (Yu et al., 1979:267)
Gahrliepia (*Intermedialia*) *hegu* Yu et al., 1979:267-268.
寄 主：叢林鼠(*Mus famulus* Bonhote)、大足鼠(*Rattus nitidus* Hodgson)、鼯鼩(*Cricudyra attebyata* Milne-Edwards)。
分 佈：雲南。

Gahrliepia (s. str.) **lamella** Chen et al. 葉片葛李恙蟎 (Chen et al., 1980:154)
Gahrliepia (s. str.) *lamella* Chen et al., 1980:154-156.
寄 主：黑腹絨鼠(*Eothenomys melanogaster* Milne-Edwards)。
分 佈：安徽。

Gahrliepia (s. str.) **latiscutata** Chen et Fan 寬盾葛李恙蟎 (Chen et Fan, 1981:145)
Gahrliepia (s. str.) *latiscutata* Chen et Fan, 1981:145-146.
寄 主：黑腹絨鼠(*Eothenomys melanogaster* Milne-Edwards)。
分 佈：安徽。

Gahrliepia (s. str.) **linguipelta** Jeu et al. 舌盾葛李恙蟎 (Jeu et al., 1983:103)
Gahrliepia (s. str.) *linguipelta* Jeu et al., 1983:103.
寄 主：長吻松鼠(*Dremomys pernyi*)、白喉岩松鼠(*Sciurotamius forresti*)、小林姬鼠(*Apodemus sylvaticus orestes*)、大絨鼠(*Eothenomoys miletus*)。
分 佈：雲南。

Gahrliepia (s. str.) **longipedalis** Yu et Yang 長足葛李恙蟎 (Yu et Yang, 1986:63)
Gahrliepia (s. str.) *longipedalis* Yu et Yang, 1986:63-64.
寄 主：白腹鼠(*Rattus coxingi andersoni*)。

分 佈：雲南(大理蒼山)。

Gahrliepia (s. str.) **meridionalis** Yu et al. 南方甲邏恙蟎 (Yu et al., 1980:261)

Gahrliepia (s. str.) *meridionalis* Yu et al., 1980:261-262.

寄 主：斯氏家鼠(*Rattus rattus sladeni* (Anderson, 1879)、樹鼩(*Tupaia glis* (Diard, 1820)、高原田姬鼠(*Apodemus agrarius chevrieri* (Milne-Edwards, 1868)。

分 佈：雲南。

Gahrliepia (Gateria) myriosetosa Wang 多毛背展恙蟎 (Wang, 1964:90)

Gahrliepia (*Gateria*) *myriosetosa* Wang, 1964:90.

寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)、羅賽鼠(*Rattus losea*)。

分 佈：浙江。

Gahrliepia (Gateria) octosetosa Chen et al. 八毛背展恙蟎 (Liao, 1994:159; Wang, 1962:276; Wang et Liao, 1981:109)

Gahrliepia (*Gateria*) *octosetosa* Chen et al., 1956:

寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius ningpoensis*)、東方田鼠(*Microtus fortis*)、青毛鼠(*Rattus bowersii latouchei*)、白腹巨鼠(*Rattus edwardsi edwardsi*)、針毛鼠(*Rattus fulvescens huang*)、黃毛鼠(羅賽鼠)(*Rattus losea exiguus* A. B. Howell)、社鼠(*Rattus niviventer confuciana*)。

分 佈：福建。

Gahrliepia (Gateria) pintanensis Wang 平潭背展恙蟎 (Wang, 1962:269; Wang et Liao, 1981:109)

Gahrliepia (*Gateria*) *pintanensis* Wang, 1962:269.

寄 主：黃毛鼠(羅賽鼠)(*Rattus losea exiguus* A. B. Howell)。

分 佈：福建(平潭)。

Gahrliepia (Gateria) puningensis Mo et al. 普寧背展恙蟲 (Mo et al., 1959:254)

Gahrliepia (*Gateria*) *puningensis* Mo et al., 1959:254.

寄 主：鼠(耳)。

分 佈：廣東(普寧)。

Gahrliepia romeri Womersley 香港背展恙蟎 (Wang et Liao, 1981:109)

Gahrliepia romeri Womersley, 1952:

寄 主：黃毛鼠(羅賽鼠)(*Rattus losea exiguus* A. B. Howell)。

分 佈：福建。

Gahrliepia (s. str.) **saduski** (Womersly) 薩氏葛李恙蟎 (Chen, 1978:198; 1980:99, 291-297; Lu, 1979:366)

Gahrliepia (s. str.) *saduski* (Womersly, 1952:)

寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)、花背倉鼠(*Cricetulus barabensis*)。

分 佈：江蘇。

Gahrliepia (Gateria) shanyangensis Huang 山陽葛李恙蟎 (Huang, 1988:144)

Gahrliepia (*Gateria*) *shanyangensis* Huang, 1988:144-145.

寄 主：林姬鼠(*Apodemus sepciosus* (Temminck))。
分 佈：陝西(山陽縣)。

Gahrliepia (s. str.) **silvatica** Yu et Yang 叢林葛李恙蟎 (Yu et Yang, 1982:53)
Gahrliepia (s. str.) *silvatica* Yu et Yang, 1982:53-54.
寄 主：短尾鼩(*Anourosorex squamipes squamipes*)、大絨鼠(*Eothenomys miletus miletus*)。
分 佈：雲南(元陽)。

Gahrliepia (s. str.) **tenuiclava Yu et al.** 細棒葛李恙蟎 (Yu et al., 1983:70)
Gahrliepia (s. str.) *tenuiclava* Yu et al., 1983:70-71.
寄 主：社鼠(*Rattus niviventer*)。
分 佈：雲南(下關)。

Gahrliepia (s. str.) **yangchenensis** Chen et Hsu 羊城背展恙蟎 (Liao, 1994:159; Wang, 1962:276; Wang et Liao, 1981:109)
Gahrliepia (s. str.) *yangchenensis* Chen et Hsu, 1957:
寄 主：青毛鼠(*Rattus bowersii latouchei*)、白腹鼠(*Rattus coxingi andersoni*)、黃毛鼠(羅賽鼠)(*Rattus losea exiguus* A. B. Howell)。
分 佈：福建。

Globularosechöngastia rattihaikonga Hsu et Chen (Wang, 1962:276)
Globularosechöngastia rattihaikonga Hsu et Chen, 1957:
寄 主：羅賽鼠(*Rattus losea exiguus* A. B. Howell)。
分 佈：

Helenicula abaensis Wang et al. 阿壩合輪恙蟎 (Wang et al., 1984:160)
Helenicula abaensis Wang et al., 1984:160.
寄 主：社鼠(*Rattus confucianus*)。
分 佈：四川(西部阿壩)。

Helenicula myospalacis Huang 鼢鼠合輪恙蟎 (Huang, 1986:276)
Helenicula myospalacis Huang, 1986:276-277.
寄 主：鼢鼠(*Myoapalax smithi* Thomas, 1911)。
分 佈：陝西(寧陝縣平河梁)。

Helenicula olsufjevi 凹遂合輪恙蟎 (Sun, 1994:74)
寄 主：岩松鼠(*Sciurotamias davi-dianus*)。
分 佈：遼寧。

Helenicula rattihaikonga (Hsu et Chen) 海康合輪恙蟎 (Liao, 1994:161; Wang et Liao, 1981:106)
Helenicula rattihaikonga (Hsu et Chen), 1957:
寄 主：白腹鼠(*Rattus coxingi andersoni*)、黃毛鼠(*Rattus losea exiguus* Howell)。

分 佈：福建。

Helenicula saihsuensis Hsu et Chen 賽圩恙螨 (Hsu et Chen, 1964:742; Wang et Liao, 1981:106)

Hekebucula saihsuensis Hsu et Chen, 1964:742.

別 名：*賽圩赫列恙蟲*。

寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius ningpoensis*)、社鼠(*Rattus confucianus confucianus* Milne-Edwards, 1871)、針毛鼠(*Rattus fulvescens huang*)、黃毛鼠(*Rattus rattoides exiguus* Howell, 1927)、黃胸鼠(*Rattus rattus flavipectus* Milne-Edwards, 1871)。

分 佈：廣東(合浦賽圩)。

Helenicula simena (Hsu et Chen) 西盟海倫恙螨 (Wang et Ku, 1979:95)

Helenicula simena (Hsu et Chen, 1957:)

寄 主：珀氏長吻松鼠(*Dremonys pernyi*)。

分 佈：貴州。

Herpetacarus (s. str.) **aristatoclavus** Yu et al. 芒棒爬蟲恙螨 (Yu et al., 1979:274)

Herpetacarus (s. str.) *aristatoclavus* Yu et al., 1979:374-375.

寄 主：小泡巨鼠 *Rattus edwardsi edwardsi*。

分 佈：雲南。

Herpetacarus (s. str.) **baojiensis** Zhao, et al. 寶雞爬蟲恙螨 (Zhao, et al., 1988:107)

Herpetacarus (s. str.) *baojiensis* Zhao, et al., 1988:107.

寄 主：紅腹松鼠(*Callosciurus erythraeus* Pallas, 1779)。

分 佈：廣西(十萬大山寶雞嶺)。

Herpetacarus (s. str.) **breviclavus** Yu et al. 短棒爬蟲恙螨 (Yu et al., 1979:373)

Herpetacarus (s. str.) *breviclavus* Yu et al., 1979:373-374.

寄 主：白腹巨鼠 (*Rattus coxingi andersoni*) 。

分 佈：雲南。

Herpetacarus (Cricacarus) cheni (Wang) 陳氏爬蟲恙螨 (Wang et Liao, 1981:108)

Herpetacarus (*Cricacarus*) *cheni* (Wang), 1962:

寄 主：黃毛鼠(*Rattus losea exiguus*)。

分 佈：福建。

Herpetacarus (s. str.) **fukienensis** (Chen et al.) 福建爬蟲恙螨 (Wang et Liao, 1981:108)

Herpetacarus (s. str.) *fukienensis* (Chen et al.), 1958:

寄 主：青毛鼠(*Rattus bowersii latouchei*)、白腹巨鼠(*Rattus edwardsi edwardsi*)、針毛鼠(*Rattus fulvescens huang*)、黃毛鼠(*Rattus losea exiguus*)、大足鼠(*Rattus nitidus*)、社鼠(*Rattus niviventer confucianus*)。

分 佈：福建。

Herpetacarus (s. str.) **hastoclavus** Yu et al. 槍棒爬蟲恙螨 (Yu et al., 1979:375)

Herpetacarus (s. str.) *hastoclavus* Yu et al., 1979:375-376.
寄 主：黃胸鼠(*Rattus flavipectus*) 黑線姬鼠(*Apodemus agrarius chevirieri*) 側紋岩松鼠(*Sciurotamias forresti*) 側紋岩松鼠。
分 佈：雲南。

Herpetacarus (s. str.) **pagumae** Wang et al. 花狸爬蟲恙蟎 (Wang et Liao, 1981:108; Wang et al., 1980:382)
Herpetacarus (s. str.) *pagumae* Wang et al., 1980:382-383.
寄 主：花面狸(*Paguma larvata*)、食蟹蒙(*Herpestes urva*)。
分 佈：福建(建甌山區)。

Herpetacarus (s. str.) **spinosetosus** Wang et al. 針毛爬蟲恙蟎 (Wang et al., 1980:383)
Herpetacarus (s. str.) *spinosetosus* Wang et al., 1980:383-385.
寄 主：小泡巨鼠(*Rattus edwardsi*)、針毛鼠(*Rattus fulvescens*)、黃毛鼠(*Rattus losea*)、大足鼠 *Rattus nitidus*)、社鼠(*Rattus niviventer*)。
分 佈：福建(屏南、邵武、浦城)。

Herpetacarus (s. str.) **tengchongensis** Yu et al. 騰沖爬蟲恙蟎 (Yu et al., 1980:259)
Herpetacarus (s. str.) *tengchongensis* Yu et al., 1980:259-260.
寄 主：斯氏家鼠(*Rattus rattus sladeni* (Anderson, 1879))。
分 佈：雲南。

Herpetacarus (s. str.) **tenuiclavus** Yu et al. 細棒爬蟲恙蟎 (Yu et al., 1979:372)
Herpetacarus (s. str.) *tenuiclavus* Yu et al., 1979:372-273.
寄 主：大足鼠(*Rattus nitidus nitidus*)。
分 佈：雲南。

Herpetacarus (s. str.) **tiantai** Hsu et Hsu 天臺爬蟲恙蟎 (Hsu et Hsu, 1983:378)
Herpetacarus (s. str.) *tiantai* Hsu et Hsu, 1983:378-379.
寄 主：花面狸(*Paguma larvata*)。
分 佈：浙江(天臺縣)。

Herpetacarus (s. str.) **tupaiae** Yu et al. 樹鼩爬蟲恙蟎 (Yu et al., 1983:63)
Herpetacarus (s. str.) *tupaiae* Yu et al., 1983:63-64.
寄 主：普通樹鼩(*Tupaia glis*)。
分 佈：雲南(高黎貢山)。

Hsuella hubeiensis Wang et al. 湖北徐氏恙蟎 (Wang, et al., 1989:361)
Hsuella hubeiensis Wang, et al., 1989:361.
寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)。
分 佈：湖北(宜昌)。

Huabangsha megachela Wen et al. 大鉗華棒沙蟎 (Wen et al., 1980:82)
Huabangsha megachela Wen et al., 1980:82.

寄 主：叢林鼠(*Mus famulus*)。
分 佈：雲南。

Leptotrombidium akamushi (Brumpt) 紅纖恙蟎 (Jeu, 1956:434; Jeu et Wen, 1957:451, 452; Wang et Liao, 1981:104)
Leptotrombidium akamushi (Brumpt), 1910:
寄 主：雞(*Gallus gallus domestica* (Linnaeus)、黑線姬鼠(*Apodemus agrarius ningpoensis*)、東方田鼠(*Microtus fortis*)、黃毛鼠(*Rattus losea exiguus*)、針毛鼠(*Rattus fulvescens*)、花松鼠(*Tamiops swinhoei*)、大靈貓(*Viverra zibetha*)。
分 佈：臺灣(澎湖列島)、福建；菲律賓、馬來亞、緬甸、斯里蘭卡、印尼、日本、伊里安。

Leptotrombidium (s. str.) **allosetum** Wang et al. 異毛纖恙蟎 (Wang et Liao, 1981:105; Wang et al., 1981:46)
Leptotrombidum (s. str.) *allosetum* Wang et al., 1981:46-47.
寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius ningpoensis*)、青毛鼠(*Rattus bowersii latouchei*)、白腹巨鼠(*Rattus edwardsi edwardsi*)、針毛鼠(*Rattus fulvescens huang*)、大足鼠(*Rattus nitidus nitidus*)。
分 佈：福建(浦城、光澤)。

Leptotrombidium (s. str.) **alpinum** Yu et Yang 高山纖恙蟎 (Yu et Yang, 1986:65)
Leptotrombidium (s. str.) *alpinum* Yu et Yang, 1986:65-67.
寄 主：中華姬鼠(*Apodemus draco orestes*)、藏鼠兔(*Ochotona thibetana thibetana*)。
分 佈：雲南(劍川縣老君山)。

Leptotrambidium (s. str.) **apodemi** 姬鼠纖恙蟎 (Sun, 1994:72)
寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)。
分 佈：遼寧。

Leptotrombidium bambusoides Wang et Yu 竹葉片恙蟎 (Wang et Liao, 1981:106)
Leptotrombidium bambusoides Wang et Yu, 1965:
寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius ningpoensis*)、白腹巨鼠 *Rattus edwardsi edwardsi*)、針毛鼠 *Rattus fulvescens huang*)、黃毛鼠 *Rattus losea exiguus*)、大足鼠(*Rattis nitidus*)、社鼠(*Rattus niviventer confucianus*)。
分 佈：福建。

Leptotrombidium (s. str.) **bawangensis** Zhao 貝王纖恙蟎 (Zhao, 1982:450)
Leptotrombidium (s. str.) *bawangensis* Zhao, 1982:450.
寄 主：白腹巨鼠(*Rattus edwardsi*)。
分 佈：海南(貝王嶺)。

Leptotrombidium (s. str.) **bayanensis** Yang 巴顏纖恙蟎 (Yang, 1994:438)
Leptotrombidium (s. str.) *bayanensis* Yang, 1994:438-439.
寄 主：根田鼠(*Microtus oeconomus* Pallas)。

分 佈：青海(久治縣)。

Leptotrombidium (s. str.) **bengbuensis** Chen et Fan 蚌埠纖恙蟎 (Chen et Fan, 1981:146)

Leptotrombidium (s. str.) *bengbuensis* Chen et Fan, 1981:146-147.

寄 主：褐家鼠(*Rattus norvegicus*)。

分 佈：安徽(蚌埠)。

Leptotrombidium (s. str.) **biluoxueshanense** Yu et al. 碧羅雪山纖恙蟎 (Yu et al., 1982: 380)

Leptotrombidium (s. str.) *biluoxueshanensis* Yu et al., 1982:380-381.

寄 主：黑腹絨鼠(*Eothenomys melanogaster*)。

分 佈：雲南(西部碧羅雪山)。

Leptotrombidium (s. str.) **bishanense** Yu et al. 長毛纖恙蟎 (Yu et al., 1982:382)

Leptotrombidium (s. str.) *longisetum* Yu et al., 1982:382-383. Homonym of *L* (s. str.) *longisetum* (Womersley, 1952)

Leptotrombidium (s. str.) *bishanense* Yu, Hu et Fang, 1986:193

寄 主：黑腹絨鼠(*Eothenomys melanogaster*)。

分 佈：雲南(西部碧羅雪山)。

Leptotrombidium burnsi (Sasa et al.) 崩氏纖恙蟎 (Wang et Liao, 1981:105)

Leptotrombidium burnsi (Sasa et al.), 1950:

寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius ningpoesis*)、青毛鼠(*Rattus bowersii latouchei*)、白腹巨鼠(*Rattus edwardsi edwardsi*)、針毛鼠(*Rattus fulvescens huang*)、黃毛鼠(*Rattus losea exiguus*)、社鼠(*Rattus niviventer confucianus*)。

分 佈：福建。

Leptotrombidium (s. str.) **cricethrionis** 倉平纖恙蟎 (Sun, 1994:72)

寄 主：大倉鼠(*Cricetulus tritan*)、棕背鼪(*Clethrionmys rufocanus*)。

分 佈：遼寧。

Leptotrombidium deliense (Walch) 地理纖恙蟎 (Jeu, 1956:434; Jeu et Wan, 1957:451; Liao, 1994:159; Wang, 1962:276; Wang et al., 1966:245-246; Wang et Ku, 1979:93; Wang et Liao, 1981:104; 1984:231; Wen et Hsu, 1963:347-356; Wu et al., 1959: 564; Xu et al., 1964:56-66; Yu et Wu, 1959:66-74)

Trombicula (*Leptotrombidium*) *akamushi* var. *deliensis* Walch, 1922:

寄 主：臭鼩(*Suncus murinus* (Linnaeus))、黑線倉鼠(*Apodemus agrarius nigpoensis*)、板齒鼠(*Bandicota indica nemorivaga*)、東方田鼠(*Microtus fortis*)、田小鼠(*Mus bactrianus*)、家鼠(*Mus musculus*)、青毛鼠(*Rattus bowersii latouchei*)、白腹鼠(*Rattus coxingi andersoni*)、針毛鼠(*Rattus fulvescens*)、黃胸鼠(*Rattus flavipectus*)、黃毛鼠(*Rattus losea*)、黃毛鼠(羅賽鼠)(*Rattus losea exiguus* A. B. Howell)、社鼠(*Rattus niviventer confucianus*)、褐家鼠(*Rattus norvegicus* Erxl.)、家鼠(指名亞種)(*Rattus rattus rattus*)、臭鼩鼱(*S. murinus*)、灰麝鼩(*Crocidura attenuata*)、家兔(*Lepus domesticus*)、小靈貓(*Viverricula indica*)、家貓(*Ffelis ocreata*)。

分 佈：福建、廣東、海南、廣西、雲南、貴州、浙江、上海；菲律賓、馬來亞、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、印尼、東印度群島、伊里安、澳洲。

Leptotrombidium (s. str.) **deliense microsetosa** Zhao 地理纖恙(短毛亞種) (Zhao, et al., 1986:98)

Leptotrambidium (s. str.) *deliense microsetosa* Zhao, et al., 1986:98.

寄 主：緬鼠(*Rattus exulans*)、黃胸鼠(*Rattus r. flavipectus*)。

分 佈：西沙群島(永興島)。

Leptotrombidium (s. str.) **densipunctatum** Yu et al. 密點纖恙蟎 (Yu et al., 1982:270)

Leptotrombidium (s. str.) *densipunctatum* Yu et al., 1982:270-271.

寄 主：大足鼠(*Rattus nitidus nitidus*)、大絨鼠(*Eothenomys miletus miletus*)、社鼠(*Rattus niviventer confucianus*)。

分 佈：雲南(西部)。

Leptotrombidium (s. str.) **deplanoscutum** Yu et Zi 扁盾纖恙蟎 (Yu et al., 1981:150)

Leptotrombidium (s. str.) *deplanoscutum* Yu et Zi, 1981:150-151.

寄 主：黃胸鼠(*Rattus flavipectus*)。

分 佈：雲南(永勝)。

Leptotrombidium (s. str.) **dichotogalium** Xiang et Wen 二叉纖恙蟎 (Xiang et Wen, 1986:446)

寄 主：

分 佈：雲南。

Leptotrombidium (s. str.) **discum** Wang et al. 圓盤纖恙蟎 (Wang et Liao, 1981:105; Wang et al., 1981:48)

Leptotrombidium (s. str.) *discum* Wang et al., 1981:48-49.

寄 主：白腹巨鼠(*Rattus edwardsi edwardsi*)、針毛鼠 *Rattus fulvescens huang*)、社鼠 *Rattus niviventer comfucianus*)。

分 佈：福建(邵武)。

Leptotrombidium (s. str.) **dongluoensis** Wang et al. 東洛纖恙蟎 (Wang et Liao, 1981:105; Wang et al., 1981:47)

Leptotrombidium (s. str.) *dongluoensis* Wang et al., 1981:47.

寄 主：黃毛鼠(*Rattus losea exiguus*)。

分 佈：福建(長樂)。

Leptotrombidium (s. str.) ejingshanense Yu et al. 鵝頸山纖恙蟎 (Yu et al., 1982:274)

Leptotrombidium (s. str.) *ejingshanense* Yu et al., 1982:274-276.

寄 主：側紋岩松鼠(*Rupestes forresti*)、小林姬鼠(*Apodemus sylvaticus orestes*)、大林姬鼠(*Apodemus latronum*)。

分 佈：雲南(劍川鵝頸山)。

Leptotrombidium (s. str.) **eothenomydis** Yu et Yang 絨鼠纖恙蟎 (Yu et Yang, 1986:67)

Leptotrombidium (s. str.) *eothenomydis* Yu et Yang, 1986:67-68.

寄 主：大絨鼠(*Eothenomys miletus miletus*)。
分 佈：雲南(劍川縣老君山)。

Leptotrombidium (s. str.) **filasensillum** Wang et Song 絲感纖恙蟎 (Wang et Song, 1982: 385)
Leptotrombidium (s. str.) *filasensillum* Wang et Song, 1982:385-386.
寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)、針毛鼠(*Rattus fulvescens*)、黃毛鼠(*Rattus losae*)。
分 佈：江西(修水縣)。

Leptotrombidium (s. str.) **fujianensis** Liao et Wang 福建纖恙蟎 (Liao et Wang, 1983:177)
Leptotrombidium (s. str.) *fujianensis* Liao et Wang, 1983:177-180.
寄 主：針毛鼠(*Rattus fulvescens*)。
分 佈：福建(建甌)。

Leptotrombidium (s. str.) **gaohuensis** Wei et al. 高湖纖恙蟎 (Wei, et al., 1987:453-454)
Leptotrambidium (s. str.) *gaohuensis* Wei, et al, 1957:
寄 主：
分 佈：浙江。

Leptotrombidium (s. str.) **gemiticulum** (Traub et al.) 皆貌纖恙蟎 (Sun, 1979:355; 1994:72)
寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)、黑線倉鼠(*Cricetulus barabensis*)、大倉鼠(*Cricetulus tritan*)、花鼠(*Eutamias sibiricus*)。
分 佈：遼寧。

Leptotrombidium (s. str.) **guzhangensis** Wang et al. 古丈纖恙蟎 (Wang et al., 1985:152)
Leptotrombidum (s. str.) *guzhangensis* Wang et al., 1985:152-153.
寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)。
分 佈：湖南(古丈)。

Leptotrombidium (**Trombiculindus**) **heishuiense** Zhou et al. 黑水葉片恙蟎 (Zhou et al., 1986:182)
Leptotrombidium (*Trombiculindus*) *heishuiense* Zhou et al., 1986:182.
寄 主：白腹鼠(*Rattus coxingi andersoni* Thomas)。
分 佈：四川(黑水縣)。

Leptotrombidium (s. str.) **hiemalis** Yu et al. 寒冬纖恙蟎 (Yu et al., 1982:271)
Leptotrombidium (s. str.) *hiemalis* Yu et al., 1982:271-273.
寄 主：大絨鼠(*Eothenomys miletus miletus*)、大足鼠(*Rattus nitidus nitidus*)。
分 佈：雲南(西部)。

Leptotrombidium (s. str.) **hsui** Yu et al. 徐氏纖恙蟎 (Yu et al., 1986:166)
Leptotrombidium (s. str.) *hsui* Yu et al., 1986:166-167.
寄 主：斯氏家鼠(*Rattus rattus sladeni*)。
分 佈：雲南(賓川縣雞足山)。

Leptotrombidium (s. str.) **huangchuanensis** Yang 湟川纖恙蟎 (Yang, 1994:439)

Leptotrombidium (s. str.) *huangchuanensis* Yang, 1994:439-441.

寄 主：高原鼠兔(*Ochotona curzoniae* Hodgson)耳殼內。

分 佈：青海(湟中縣)。

Leptotrombidium (s. str.) **imphalum** Vercammen-Grandjea et Langston 英帕纖恙蟎 (Wen, et al., 1982:467)

寄 主：黑家鼠(*Rattus r. tistae*)、大足鼠(*Rattus nitidus*)、青毛鼠(*Rattus bowersi*)；黃胸鼠(雲南亞種)(*Rattus flevipectus yunnanensis*)(印度)、樹鼩(*Dendragale* sp.)(緬甸)。

分 佈：雲南、西藏；緬甸、印度。

Leptotrombidium (s. str.) **intermedium** (Nagays et al.) 居中纖恙蟎 (Chen, 1978:197; 1980:99, 291-297; Sun, 1994:72; Wang, 1962:276)

Trombicula (*Leptotrombidium*) *intermedium* Nagays et al., 1920:

寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius ningpoensis*)、黑線倉鼠(*Cricetulus barabensis*)、大倉鼠(*Cricetulus tritan*)、東方田鼠(*Microtus fortis*)、花鼠(*Eutamias sibiricus*)、黃毛鼠(羅賽鼠)(*Rattis losea exiguus* A. B. Howell)、社鼠(*Rattus niviventer confusicanus*)、褐家鼠(*Rattus vorvegicus*)。

分 佈：福建、江蘇、遼寧。

Leptotrombidium (s. str.) **jianshanense** Yu et al. 劍山纖恙蟎 (Yu et al., 1982:276)

Leptotrombidium (s. str.) *jianshanense* Yu et al., 1982:276-277.

寄 主：大絨鼠(*Eothenomys miletus miletus*)。

分 佈：雲南(劍川山區)。

Leptotrombidium (s. str.) **jishoum** Wen et al. 吉首纖沙蟎 (Wen, et al., 1988:107)

Leptotrombidium (s. str.) *jishoum* Wen, et al., 1988:107.

寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)、華南沼澤田鼠(*Microtus fortis calamorum*)、褐家鼠(*Rattus norvegicus*)、大足鼠(*Rattus nitidus*)、臭鼩(*Suncus murinus*)。

分 佈：湖南。

Leptotrombidium kaohuensis (Yang et al.) 高湖纖恙蟎 (Wang et Liao, 1981:105)

Leptotrombidium kaohuensis (Yang et al.), 1959:

寄 主：白腹鼠(*Rattus coxingi andersoni*)、針毛鼠(*Rattus fulvescens huang*)、黃毛鼠(*Rattus losea exiguus*)、社鼠(*Rattus niviventer confucianus*)。

分 佈：福建。

Leptotrombidium kawamurai (Fukuzumi et Obate) 川村纖恙蟎 (Wang et Liao, 1981:104)

Leptotrombidium kawamurai (Fukuzumi et Obate), 1953:

寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius ningpoensis*)、黃毛鼠(*Rattus losea exiguus*)、針毛鼠(*Rattus fulvescens huang*)、社鼠(*Rattus niviventer confucianus*)。

分 佈：福建。

Leptotrombidium (s. str.) **laojunshanense** Yu et al. 老君山纖恙螨 (Yu et al., 1986:169)
Leptotrombidium (s. str.) *laojunshanense* Yu et al., 1986:169-170.
寄 主：藏鼠兔(*Ochotona thibetana thibetana*)、大絨鼠(*Eothenomys miletus miletus*)、大耳姬鼠(*Apodemus latronum*)、高山姬鼠(*Apodemus chevrieri*)。
分 佈：雲南(劍川縣老君山)。

Leptotrombidium (s. str.) **laxoscutum** Teng 寬盾纖恙螨 (Teng, 1981:157)
Leptotrombidium (s. str.) *laxoscutum* Teng, 1981:157-158.
寄 主：小家蝠(*Pipistrellus abramus*)。
分 佈：山東(濟南千佛山)。

Leptotrombidium (s. str.) **lianghensis** Yu et al. 梁河纖恙螨 (Yu et al., 1983:65)
Leptotrombidium (s. str.) *lianghensis* Yu et al., 1983:65-67.
寄 主：斯氏家鼠(*Rattus rattus sladeni*)。
分 佈：雲南(梁河縣)。

Leptotrombidium (s. str.) **liaoji** 遼姬纖恙螨 (Sun, 1994:72)
寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)、黑線倉鼠(*Cricetulus barabensis*)。
分 佈：遼寧。

Leptotrombidium (s. str.) **linhuakongensis** (Wen et Hsu) 臨淮崗恙螨 (Chen, 1978: 197; 1980:291-297; Wen et Hsu, 1960:493)
Trombicula (*Leptoptrombidium*) *linhuakongensis* Wen et Hsu, 1961:493.
寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)、黑線倉鼠(*Cricetulus barabensis*)。
分 佈：安徽(臨淮)。

Leptotrombidium (s. str.) **linji** 林姬纖恙螨 (Sun, 1994:72)
寄 主：大林姬鼠(*Apodemus peninsulae*)。
分 佈：遼寧。

Leptotrombidium (Laurentella) menghaiensis Yu et al. 孟海囊棒恙螨 (Yu et al., 1986:175)
Leptotrombidium (*Laurentella*) *menghaiensis* Yu et al., 1986:175-176.
寄 主：雲南鼯鼠(*Petaurista petaurista yunnanesis*)。
分 佈：雲南(孟海縣)。

Leptotrombidium mugidi Hsu et Chen 母雞頂恙螨 (Hsu et Chen, 1964:737)
Trombicula (*Leptotrombidium*) *mugidi* Hsu et Chen, 1964:737.
寄 主：黃胸鼠(*Rattus rattus flavipectus* Milne-Edwarda, 1871)。
分 佈：廣東(欽縣)。

Leptotrombidium (s. str.) **neotebraci** Xiang et Wen 新蛸纖恙螨 (Xiang et Wen, 1986:447)
Leptotrombidium (s. str.) *neotebraci* Xiang et Wen, 1986:447.

寄 主：中華新蝟(*Neotebracus sinensis sinensis*)、白腹巨鼠(*Rattus coxingi andersoni*)。
分 佈：雲南(保山)。

Leptotrombidium (s. str.) **nudisensillum** Yu et al. 光器纖恙蟎 (Yu et al., 1981:54)
Leptotrombidium (s. str.) *nudisensillum* Yu et al., 1981:54-55.
寄 主：社鼠(*Rattus niviventer*)。
分 佈：雲南(綏江)。

Leptotrombidium (s. str.) **nyctali** 山蝠纖恙蟎 (Sun, 1994:72)
寄 主：普通山蝠(*Nyctalus noctula*)。
分 佈：遼寧。

Leptotrombidium (s. str.) **orestes** Xiang et Wen 山姬纖恙蟎 (Xiang et Wen, 1986:449)
Leptotrombidium (s. str.) *orestes* Xiang et Wen, 1986:449.
寄 主：小林姬鼠(山亞種)(*Apodemus sylvaticus orestes*)。
分 佈：雲南(保山)。

Leptotrombidium (s. str.) **orientale** 東方纖恙蟎 (Sun, 1994:72)
寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus qgrarius*)、黑線倉鼠(*Cricetulus barabensis*)、東方田鼠(*Microtus fortis*)、花鼠(*Eutamias sibiricus*)、大林姬鼠(*Apodmus peninsulae*)、棕背鼯(*Clethrionomys rufocanus*)、大倉鼠(*Cricetulus tritan*)。
分 佈：遼寧。

Leptotrombidium pallidum (Nagayo et al.) 蒼白纖恙蟎 (Liao, 1994:159; Wang et Liao, 1981:105)
Leptotrombidium pallidum (Nagayo et al.), 1919:
寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius ningpoensis*)、青毛鼠(*Rattus bowersii latouchei*)、白腹鼠(*Rattus coxingi andersoni*)、白腹巨鼠(*Rattus edwardsi edwardsi*)、針毛鼠(*Rattus fulvescens huang*)、黃毛鼠(*Rattus rattoides exiguus*)、大足鼠(*Rattus nitidus*)、社鼠(*Rattus niviventer confucianus*)、花松鼠(*Tamips swinhoei*)。
分 佈：福建。

Leptotrombidium palpale (Nagayo et al.) 鬚纖恙蟎 (Wang et Liao, 1981:105)
Leptotrombidium palpale (Nagayo et al.), 1919:
寄 主：小家鼠(*Mus musculus* Linnaeus)、黃毛鼠(*Rattus losea exiguus*)、褐家鼠(*Rattus norvegicus*)。
分 佈：福建。

Leptottombidium parapalplae (Womersley) 副鬚纖恙蟎 (Wang et Ku, 1979:93)
Leptotrombidium parapalplae (Womersley, 1952:)
寄 主：珀氏長吻松鼠(*Dremonys pernyi*)。
分 佈：貴州。

Leptotrombidium (s. str.) **pelpale** (Nagays et al.) 鬚纖恙蟎 (Chen, 1978:197; Lu, 1979:366; Sun, 1994:72; Tung, 1957:209; Wang, 1962:276)

Trombicula (*Leptotrombidium*) *pelpale* Nagays et al., 1919:

寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)、黑線倉鼠(*Cricetulus barabensis*)、東方田鼠(*Microtus fortis*)、大倉鼠(*Cricetulus tritan*)、小家鼠(*Mus musculus*)、褐家鼠(*Rattus norvegicus*)、羅賽鼠(*Rattus losea exiguus* A. B. Howell)、岩松鼠(*Sciurotamias davi-dianus*)、麝鼩(*Crocidura attenata*)。

分 佈：江蘇、山東、遼寧。

Leptotrombidium (s. str.) **pavlovskyi** 北方纖恙蟎 (Sun, 1994:72)

寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus qgrarius*)、黑線倉鼠(*Cricetulus barabensis*)、東方田鼠(*Microtus fortis*)、棕背鼪(*Clethrionomys rufocanus*)、大林姬鼠(*Apodmus peninsulae*)、花鼠(*Eutamias sibiricus*)。

分 佈：遼寧。

Leptotrombidium (s. str.) **postfoliatum** Wang et al. 後葉纖恙蟎 (Wang et Liao, 1981:105; Wang et al.,1981:44)

Leptotrombidium (s. str.) *postfoliatum* Wang et al., 1981:44-46.

寄 主：針毛鼠(*Rattus fulvescens huang*)、社鼠(*Rattus niviventer*)、白腹鼠(*Rattus coxingi andersoni*)。

分 佈：福建(三明、邵武)。

Leptotrombidium (s. str.) **qiui** Yu et al. 裘氏纖恙蟎 (Yu et al., 1986:167)

Leptotrombidium (s. str.) *qiui* Yu et al., 1986:167-169.

寄 主：菊頭蝠(*Rhinolophus* sp.)。

分 佈：雲南(賓川縣雞足山)。

Leptotrombidium rectanguloscuta Hsu et Chen 矩板恙蟎 (Hsu et Chen, 1964:738)

Trombicula (*Leptotrombidium*) *rectanguloscuta* Hsu et Chen, 1964:738.

寄 主：野鼠。

分 佈：廣東(寶安)。

Leptotrombidium (s. str.) **rubellum** Wang et Liao 微紅纖恙蟎 (Wang et Liao, 1984:232)

Leptotrombidium (s. str.) *rubellum* Wang et Liao, 1984:232.

寄 主：黃毛鼠(*Rattus rattoides exiguus*)。

分 佈：福建(泉州)。

Leptotrombidium (s. str.) **robustisetum** Yu et al. 粗毛纖恙蟎 (Yu et al., 1983:64)

Leptotrombidium (s. str.) *robustisetum* Yu et al., 1983:64-65.

寄 主：大絨鼠(*Eothenomys miletus*)、普通樹鼩(*Tupaia glis*)。

分 佈：雲南(高黎貢山)。

Leptotrombidium (s. str.) **rufocanum** Wang et Liu 棕鼪纖恙蟎 (Wang et Liu, 1989:166)

Leptotrombidium (s. str.) *rufocanum* Wang et Liu, 1989:166-168.
寄 主：棕背䶄(*Clethrionomys rufocanus*)體。
分 佈：吉林(和龍縣)。

Leptotrombidium (s. str.) **rupestre** Traub et Nadchatram 岩棲纖恙蟎 (Wen, et al., 1982: 467)
寄 主：白尾松田鼠(*Pitymys leucurus*)(西藏普蘭)；勞氏高山䶄(*Alticola roylei*)、姬鼠(*Apodemus* spp.)、*Hyperacrius fertilis*、灰鼠兔(*Ochotona roylei*)、麝鼩(*Crocidura* sp.)；擬家鼠(*Rattus attoides*)(巴基斯坦)。
分 佈：西藏；巴基斯坦。

Leptotrombidium (s. str.) **rusticum** Yu et al. 多野纖恙蟎 (Yu et al., 1096:170)
Leptotrombidium (s. str.) *rusticum* Yu et al., 1986:170-172.
寄 主：大絨鼠(*Eothenomys miletus miletus*)、高山姬鼠(*Apodemus chevrieri*)。
分 佈：雲南(下關西洱河)。

Leptotrombidium (s. str.) **saltuosum** Yu et al. 林地纖恙蟎 (Yu et al., 1982:273)
Leptotrombidium (s. str.) *saltuosum* Yu et al., 1982:273-274.
寄 主：大林姬鼠(*Apodemus latronum*)。
分 佈：雲南(西部)。

Leptotrombidium (s. str.) **scutellare** (Nagayo et al.) 小板纖恙蟎 (Liao, 1994:159; Lu, 1979:364; Wang, 1985:437; Wang et Liao, 1981:105)
Leptotrombidium (s. str.) *scutellare* (Nagayo et al.), 1921:
寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)、田小鼠(*Mus bactrianus*)、青毛鼠(*Rattus bowersii latouchei*)、白腹鼠(*Rattus coxingi andersoni*)、白腹巨鼠(*Rattus edwardsi edwardsi*)、針毛鼠(*Rattus fulvescens*)、大足鼠(*Rattus nitidus*)、社鼠(*Rattus niviventer confucianus*)、褐家鼠(*Rattus norvegicus*)、黃毛鼠(*Rattus rattoides exiguus* Howell)、中華竹鼠(*Rhizomys sinensis*)、花松鼠(*Tamiops swinhoei*)。
分 佈：福建、上海。

Leptotrombidium scutellare var. **basoglabrose** Chen et al. (Wang, 1962:276; Wang et al., 1980:447-448)
Leptotrombidium scutellaris var. *basoglabrosis* Chen et al., 1956:
寄 主：羅賽鼠(*Rattus losea exiguus* A. B. Howell)。
分 佈：

Leptotrombidium (s. str.) **sexsetum** Yu et Hu 六毛纖恙蟎 (Yu et al., 1981:152)
Leptotrombidium (s. str.) *sexsetum* Yu et Hu, 1981:152-153.
寄 主：白腹鼠(*Rattus coxingi andersoni*)。
分 佈：雲南(大理)。

Leptotrombidium (s. str.) **spicanisetum** Yu et al. 釘毛纖恙蟎 (Yu et al., 1986:172)
Leptotrombidium (s. str.) *spicanisetum* Yu et al., 1986:172-173.
寄 主：斯氏家鼠(*Rattus rattis sladeni*)。

分 佈：

Leptotrombidium (s. str.) **striatum** (Nadchatrum et al.) 條紋恙螨 (Chen, 1978:197; 1980:99; 291-297; Lu, 1979:366)

Leptotrombidium (s. str.) *striatum* (Nadchatrum et al., 1964:)

寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)、褐家鼠(*Rattus norvegicus*)、花背倉鼠(*Cricetulas barabensis*)、麝鼩(*Crocidura attenata*)。

分 佈：江蘇。

Leptotrombidium (s. str.) **subintermedium** (Jameson et Toshioka) 亞中纖恙螨 (Sun, 1994:74)

寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus qgrarius*)、大林姬鼠(*Apodmus peninsulae*)、東方田鼠(*Microtus fortis*)、棕背鼲(*Clethrionomys rufocanus*)、大倉鼠(*Cricetulus tritan*)、小家鼠(*Mus musculus*)、花鼠(*Eutamias sibiricus*)。

分 佈：遼寧。

Leptotrombidium (s. str.) **spinifoliatus** Wang et al. 刺葉葉片恙螨 (Wang et al., 1985:153)

Leptotrombidium (s. str.) *spinifoliatus* Wang et al., 1985:153-154.

寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)。

分 佈：湖南(古丈)。

Leptotrombidium (s. str.) **submagnum** Wang et al. 亞大纖恙螨 (Wang et al., 1988:140)

Leptotrombidium (s. str.) *submagnum* Wang et al., 1988:140-142.

寄 主：黃毛鼠(*Rattus losea*)體上。

分 佈：湖北(宜昌縣)。

Leptotrombidium (s. str.) **taishanicum** Meng, Xue et Wen 泰山纖恙螨 (Meng, et al., 1983: 79)

寄 主：社鼠(*Rattus confuscianus*)、褐家鼠(*Rattus norvegicus*)。

分 佈：江蘇、山東。

Leptotrombidium (s. str.) **trapezoidum** Wang et al. 梯板纖恙螨 (Wang et Liao, 1981:105; Wang et al., 1981:49; Wang, 1985:440)

Leptotrombidium (s. str.) *trapezoidum* Wang et al., 1981:49-50.

寄 主：青毛鼠(*Rattus bowersii latouchei*)、白腹巨鼠(*Rattus edwardsi edwardsi*)、針毛鼠(*Rattus fulvescens huang*)、社鼠(*Rattus niviventer confucianus*)。

分 佈：福建(武平)。

Leptotrombidium (s. str.) **wangi** Yu et al. 王氏纖恙螨 (Yu et al., 1986:174)

Leptotrombidium (s. str.) *wangi* Yu et al., 1986:174-175.

寄 主：西南絨鼠(*Eothenomys custos*)、藏兔鼠(*Ochotona thibetana thibetana*)。

分 佈：雲南(劍川縣老君山)。

Leptotrombidium (s. str.) **wenense** Wu, et al. 溫州纖恙螨 (Wu, et al., 1982:119)

Leptotrombidium (s. str.) *wenense* Wu, et al., 1982:119.
寄 主：社鼠(*Rattus confuscianus*)。
分 佈：浙江(青田、永嘉)。

Leptotrombidium (s. str.) **wulanensis** Yang 烏蘭纖恙螨 (Yang, 1994:441)
Leptotrombidium (s. str.) *wulanensis* Yang, 1994:441-442.
寄 主：長尾倉鼠(*Cricetulus longicaudatus* Milne-Edwards, 1867)。
分 佈：青海(烏蘭縣)。

Leptotrombidium yuebeiensis Zhao 粵北纖恙螨 (Zhao, 1982:102)
Leptotrombidium yuebeiensis Zhao, 1982:102.
寄 主：蝙蝠。
分 佈：廣東(西北部)。

Leptotrombidium (s. str.) yui (Chen et Hsu) 于氏纖恙螨 (Chen, 1978:197; 1980:99, 291-297; Liao, 1994:159; Lu, 1979:366; Wang, 1962:276; Wang et Liao, 1981:105)
Trombicula (*Leptotrombidium*) *yui* Chen et Hsu, 1955:
寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)、花背倉鼠(*Cricetulas barabensis*)、麝鼩(*Crocidura attenata*)、白腹鼠(*Rattus coxingi andersoni*)、黃胸鼠(*Rattus flavipectus*)、針毛鼠(*Rattus fulvescens*)、黃毛鼠(羅賽鼠)(*Rattus losea exiguus* A. B. Howell)、大足鼠(*Rattus nitidus*)、社鼠(*Rattus niviventer conjucianus*)、褐家鼠(*Rattus norvegicus ningpoensis*)。
分 佈：福建、江蘇。

Lepotrombidium (s. str.) **yungshengense** Yu et Yang 永勝纖恙螨 (Yu et Yang, 1986:68)
Lepotrombidium (s. str.) *yungshengense* Yu et Yang, 1986:68-70.
寄 主：樹鼩(*Tupaia belangeri chenensis*)、黃胸鼠(*Rattus flavipectus*)。
分 佈：雲南(永勝縣)。

Leptotrombidium (s. str.) **yunlingense** Yu et Zhang 雲嶺纖恙螨 (Yu et al., 1981:153)
Leptotrombidium (s. str.) *yunlingense* Yu et Zhang, 1981:153-154.
寄 主：林姬鼠(*Apodemus sylvaticus orestes*)。
分 佈：雲南(雲嶺)。

Leptotrombidium (s. str.) **yunnanensis** Yu et al. 雲南纖恙螨 (Yu et al., 1980:260)
Leptotrombidium (s. str.) *yunnanensis* Yu et al., 1980:260-261.
寄 主：四川短尾鼩(*Anourosorex squamipes* Milne-Edwards)、小耳林姬鼠(*Apodemus sylvaticus orests* Thomas, 1911)、黃足鼯鼠(*Trogopterus xanthipes* Milne-Edwards, 1867)。
分 佈：雲南。

Leptotrombidium (s. str.) **zeta** 己纖恙螨 (Sun, 1994:74)
寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus qgrarius*)、黑線倉鼠(*Cricetulus barabensis*)、東方田鼠

(*Microtus fortis*)、花鼠(*Eutamias sibiricus*)、棕背鼫(*Clethrionomys rufocanus*)、大林姬鼠(*Apodmus peninsulae*)、大倉鼠(*Cricetulus tritan*)、小家鼠(*Mus musculus*)。
分 佈：遼寧。

Leptotrombidium (s. str.) **zhongdianense** Yu et Yang 中甸纖恙蟎 (Yu et al., 1981:149)
Leptotrombidium (s. str.) *zhongdianense* Yu et Yang, 1981:149-150.
寄 主：齊氏姬鼠(*Apodemus agrarius chevrieri*)、大林姬鼠 *Apodemus latronum*)。
分 佈：雲南(中甸)。

Leptotrombidium (s. str.) **xiaguanense** Yu et Yang 下關纖恙蟎 (Yu et al., 1981:151)
Leptotrombidium (s. str.) *xiaguanense* Yu et Yang, 1981:151-152.
寄 主：齊氏姬鼠(*Apodemus agrarius chevrieri*)。
分 佈：雲南(下關)。

Lorillatum (Synlorillatum) flagellasensilla Wang et Song 鞭感長鞭恙蟎 (Wang et Song, 1992:299)
Lorillatum (*Synlorillatum*) *flagellasensilla* Wang et Song, 1992:299-301.
寄 主：鼠耳蝠(*Myotis* sp.)翼膜上。
分 佈：江西(弋陽縣)。

Lorillatum (s. str.) **oreintale** Zhao et al. 東方長鞭恙蟎 (Zhao et al., 1988:365)
Lorillatum (s. str.) *oreintale* Zhao et al., 1988:365-367.
寄 主：白腹巨鼠(*Rattus edwardsi* Thomas, 1882)、社鼠(*Rattus confucianus* Milne-Edwards, 1871)、針尾鼠(*Rattus fulvescens* Gray, 1846)、旋氏屋頂鼠(*Rattus rattus sladeni* Anderson, 1879)。
分 佈：廣東(鼎湖山)。

Lorillatum (Synlorillatum) tungshihensis (Hsu et Chen) 通什長鞭恙蟎 (Hsu et Chen, 1964:740; Zhao, 1985:341)
Trombicula (? s. str.) *tungshihensis* Hsu et Chen, 1964:740.
寄 主：黃毛鼠(*Rattus rattoides exiguus* Howell, 1927)。
分 佈：海南(瓊中通什)。

Microtrombicula (s. str.) **anfuensis** Wang et Son 安福微恙蟎 (Wang et Son, 1988)
Microtrombicula (s. str.) *anfuensis* Wang et Son, 1988:131.
寄 主：折翼蝠(*Miniopterrus* sp.)(鼻腔內)。
分 佈：江西(安福縣)。

Microtrombicula (s. str.) **guangxiensis** Zhao et Qiu 廣西微恙蟎 (Zhao et Qiu, 1979:283)
Microtrombicula (s. str.) *guangxiensis* Zhao et Qiu, 1979:283-284.
寄 主：蝙蝠。
分 佈：廣西。

Microtrombicula (s. str.) **microscuta** Zhao, et al. 小盾微恙蟎 (Zhao, et al., 1989:488)

Microtrombicula (s. str.) *microscuta* Zhao, et al., 1989:488.

寄 主：雙色蹄蝠(*Hipposideros bicolor* (Temminck))。

分 佈：廣東(雲開大山)。

Microtrombicula petauristae Yu et al. 鼯鼠微恙蟎 (Yu et al., 1982:379)

Microtrombicula petauristae Yu et al., 1982: 379-380.

寄 主：鼯鼠(*Petaurista* sp.)

分 佈：雲南(西部碧羅雪山)。

Microtrombicula (s. str.) **qingjiangensis** Huang 清澗微恙蟎 (Huang, 1987:173)

Microtrombicula (s. str.) *qingjiangensis* Huang, 1987:173-174.

寄 主：大倉鼠。

分 佈：陝西(清澗縣)。

Microtrombicula (s. str.) **spinosetosa** Wang et Song 針毛微恙蟎 (Wang et Song, 1988:132)

Microtrombicula (s. str.) *spinosetosa* Wang et Song, 1988:132-133.

寄 主：折翼蝠(*Miniopterus* sp.)。

分 佈：江西(彭澤縣)。

Microtrombicula trapezoidiscuta Zhao 梯盾微恙蟎 (Zhao, 1985:343)

Microtrombiucla trapezoidiscuta Zhao, 1985:343.

寄 主：

分 佈：海南。

Microtrombicula (s. str.) **yiyangensis** Wang et Song 弋陽微恙蟎 (Wang et Song, 1988:133)

Microtrombicula (s. str.) *yiyangensis* Wang et Song, 1988:133-135.

寄 主：中華鼠耳蝠(*Myotis chinensis*)鼻腔內。

分 佈：江西(弋陽縣)。

Multisetosa pekingensis Wen et Liu 北京多毛恙蟎 (Wen et Liu, 1973:189)

=*Acomatacarus major* (Schluger, 1955), *sensu* Liu, 1958:185.

=*Leeuwenhoekia major* Schluger, 1955, *sensu* Liu, 1958:

Multisetosa pekingensis Wen et Liu, 1973:189.

寄 主：褐家鼠(*Rattus norvegicus*)。

分 佈：北京。

Muritrombicula dali Yu et al. 大理鼠恙蟎 (Yu et al., 1981:53)

Muritrombicula dali Yu et al., 1981:53.

寄 主：白腹鼠(*Rattus coxingi andersoni*)。

分 佈：雲南(大理)。

Neoschöengastia americana solemonis 所羅門新勛恙蟎 (Jeu et Wen, 1957: 452)

寄 主：雞(*Gallus gallus domestica* (Linnaeus))。

分 佈：福建。

Neoschöengastia asakawai Fukuzumi et Obata 朝川奇棒恙蟎 (Wang, 1964:96; Wang et Liao, 1981:107)

Neoschöengastia asakawai Fukuzumi et Obata, 1953:

寄 主：鳥類。

分 佈：福建。

Neoschöengastia (s. str.) **gallinarum** Hatori 雞新棒恙蟎 (Jeu, 1956:433-448; 1959:167-175; Jeu et Wen, 1957:452; 1960:179-194, 485-492; Sun, 1994:74)

Neoschöengastia gallinarum Hatori, 1920:

別 名：*雞新勛恙蟎*。

寄 主：雞(*Gallus gallus domestica* Linnaeus)(來亨雞、薩塞克斯雞、羅德島雞、澳洲黑雞、蘆花雞)、環頸雉(*Phastarnis colchicus torquatus*)、家鴨(*Anas platyrhynchos domesticus*)、家鵝(*Ansercygnoid orientalis*)、鴿子(*Columba domestica*)、灰斑鳩(*Streptopelia decaocto*)、鷓鴣(*Francolinus pintadeanus*)、黑臉笑鶇(*Dryonastesp perspicillatus*)、白頭鵯(*Pycnonotus sinensis sinensis*)、白腰文鳥(*Lonchura striata swinhoei*)、麻雀(*Passer montanus saturatus*)、棕背伯勞 (*Lanius schach*)、八哥(*Acridotheres cristatella breuipenis*)、白頰卷尾(*Dicrurus leucephaeus leucohenis*)、喜鵲(*Pica pica sericea*)、烏鴉(*Coreus macroshynchus*)、河烏(*Cinclus pallasii soulieionstsler*)、黑臉噪眉 (*Garrulax perspicillatus perspicillatus*)、白鷴(*Lophura nycthemera rufipes*)、吐綬雞(*Meleagris gallopavo*)、綠孔雀(*Pavo muticus imperator*)、白腹錦雞(*Chrysolophus amherstiae*)、家兔(*Lepus domesticus*)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、山東、河北、遼寧。

Neoschöngastia posekanvi 朴氏新勛恙蟎 (Jeu et Wen, 1957:452; Wang et Liao, 1981:107)

寄 主：雞(*Gallus gallus demestica* (Linnaeus))、環頸雉(*Phastarnis colchicus torquatus*)、竹雞(*Bambusicola thoracica thoracica*)、鴿子(*Columba domestica*)、樹鵲(*Crypsirina formosae*)、棕背伯勞(*Lanius schach*)、喜鵲(*Pica pica sericea*)、黑臉噪眉 (*Garrulax perspicillatus perspicillatus*)、河烏(*Cinclus* ***pallasii*** *soulieionstsler*)、八哥(*Acridotheres cristatella breuipenis*)、黑鶇(*Turdus merula mandarinus*)、鷓鴣(*Francolinus pintadeanus*)、白頰卷尾(*Dicrurus leucephaeus leucohenis*)、麻雀(*Passer montanus saturatus*)。

分 佈：福建。

Neoschöngastia shihwanensis Mo et al. 石灣奇棒恙蟲 (Mo et al., 1959:253)

Neoschöngastia shihwanensis Mo et al., 1959:253.

寄 主：

分 佈：海南(石灣)。

Neoschöngastia solomonis (Wharton et Hardcastle) 所羅門奇棒恙蟎 (Wang et Liao, 1981:107)

Neoschöngastia solomonis (Wharton et Hardcastle), 1946:
寄 主：家雞(*Gallus gallus domestica* Linnaeus)。
分 佈：福建。

Neoschöngastia xiaguanensis Yu et al. 下關新棒恙蟎 (Yu et al., 1983:69)
Neoschöngastia xiaguanensis Yu et al., 1983:69-70.
寄 主：齊氏姬鼠(*Apodemus chevrieri*)。
分 佈：雲南(下關)。

Neotrombicula aeretes Hsu et Yang 鼯鼠新恙蟎 (Hsu et Yang, 1985:198)
Neotrombicula aeretes Hsu et Yang, 1985:198.
寄 主：鼯鼠(*Aeretes melanopterus* Milne-Edwards)、根田鼠(*Microtus oeconomus* Pallas)。
分 佈：青海。

Neotrombicula anax Audy et Womersley 異樣新恙蟎 (Wen, et al., 1982:468)
寄 主：白尾田鼠(*Pitymys leucurus*)、林姬鼠(*Apodemus sylvaticus*)、鼠(克什米爾地區)。
分 佈：西藏；克什米爾地區。

Neotrombicula deqinense Yu et Wang 德欽新恙蟎 (Yu et Wang, 1981:273)
Neotrombicula deqinense Yu et Wang, 1981:273-274.
寄 主：松田鼠(*Microtus ireni*)、西南絨鼠(*Eothenomys custos*)。
分 佈：雲南(白馬雪山)。

Neotrombicula gardellai 高麗新恙蟎 (Jeu et Wen, 1957:451; Sun, 1994:74)
寄 主：雞、黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)、黑線倉鼠(*Cricetulus arabensis*)、花鼠(*Eutamias sibiricus*)、岩松鼠(*Sciurotamias davdianus*)。
分 佈：遼寧。

Neotrombicula hsui (Wang) 徐氏新恙蟎 (Wang et Liao, 1981:106)
Neotrombicula hsui (Wang), 1964:
寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius ningpoensis*)、社鼠(*Rattus niviventer confucianus*)。
分 佈：福建。

Neotrombicula japonica 日本新恙蟎 (Sun, 1994:74)
寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)、大林姬鼠(*Apodmus peninsulae*)、東北鼢鼠(*Myospalax psilurus*)、大倉鼠(*Cricetulus tritan*)、褐家鼠(*Rattus norvegicus*)、岩松鼠(*Sciurotamias davi-dianus*)、松鴉。
分 佈：遼寧。

Neotrombicula microides Hsu et Yang 似田鼠新恙蟎 (Hsu et Yang, 1985:195)
Neotrombicula microides Hsu et Yang, 1985:195.
寄 主：根田鼠(*Microtus oeconomus* Pallas)。

分 佈：青海。

Neotrombicula oeconomus Hsu et Yang 根田鼠新恙蟎 (Hsu et Yang, 1985:196)

Neotrombicula oeconomus Hsu et Yang, 1985:196.

寄 主：根田鼠(*Microtus oeconomus* Pallas)。

分 佈：青海。

Neotrombicula pomeranzevi 飽滿新恙蟎 (Sun, 1994:74)

寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)、黑線倉鼠(*Cricetulus barabensis*)、大林姬鼠(*Apodmus peninsulae*)、棕背鼴(*Clethrionomys rufocanus*)、花鼠(*Eutamias sibiricus*)。

分 佈：遼寧。

Neotrombicula sinica (Wang) 中華新恙蟎 (Wang et Liao, 1981:106)

Neotrombicula sinica (Wang), 1964:

寄 主：花松鼠(*Tamiops swinhoei*)。

分 佈：福建。

Neotrombicula talmiensis 塔米新恙蟎 (Sun, 1994:74)

寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)、黑線倉鼠(*Cricetulus barabensis*)、大林姬鼠(*Apodmus peninsulae*)、棕背鼴(*Clethrionomys rufocanus*)、花鼠(*Eutamias sibiricus*)、松鼠。

分 佈：遼寧。

Neotrombicula tamiyai 田宮新恙蟎 (Sun, 1994:74; Wang et Liao, 1981:106)

寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)、花鼠(*Eutamias sibiricus*)、黃毛鼠(*Rattus losea exiguus*)。

分 佈：福建、遼寧。

Neotrombicula weni (Wang) 溫氏新恙蟎 (Wang et Liao, 1981:106)

Neotrombicula weni (Wang), 1964:

寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius ningpoensis*)、東方田鼠(*Microtus fortis*)、社鼠(*Rattus niviventer confucianus*)。

分 佈：福建。

Odontacarus magesticus 巨螯齒恙蟎 (Liao, 1994:161)

Odontacarus magesticus

寄 主：黃毛鼠(*Rattus rattoides exiguus* Howell)。

分 佈：福建。

Riedlinia (Trombigastia) harrisoni Womeraley 哈氏旅盾恙蟎 (Zhao et Qiu, 1979:285)

Riedlinia (*Trombigastia*) *harrisoni* Womeraley, 1952:

寄 主：蝙蝠。
分 佈：廣西。

Schöngastia obtusispura Wang 鈍距棒恙蟎 (Wang, 1962:274; Wang et Liao, 1981:108)
Schöngastia obtusispura Wang, 1962:274.
寄 主：黃毛鼠(羅賽鼠)(*Rattus losea exiguus* A. B. Howell)。
分 佈：福建。

Schöngastiella confuciana (Wang) 社鼠棒六恙蟎 (Wang et Liao, 1981:109)
Schöngastiella confuciana (Wang), 1962:
寄 主：青毛鼠(*Rattus bowersii latouchei*)、白腹巨鼠(*Rattus edwardsi edwardsi*)、針毛鼠(*Rattus fulvescens huang*)、黃毛鼠(*Rattus losea exiguus*)、社鼠(*Rattus niviventer confuciianus*)
分 佈：福建。

Schöngastiella dinghuensis Zhao et al. 鼎湖棒六恙蟎 (Zhao et al., 1986:394)
Schöengastiella dinghuensis Zhao et al., 1986:394396.
寄 主：施氏家鼠(*Rattus rattus sladeni* Anderson)。
分 佈：廣東(鼎湖山自然保護區)。

Schöngastiella lui (Chen et Hsu) (Wang, 1962:275)
Gahrliepia (*Schöngastiella*) *lui* Chen et Hsu, 1955:
寄 主：黃毛鼠(*Rattus losea exiguus* A. B. Howell)。
分 佈：

Schöngastiella (s. str.) **novoconfuciana** Wang et Song 新棒六恙蟎 (Wang et Song, 1992:375)
Schöengastiella (s. str.) *novoconfuciana* Wang et Song, 1992:375.
寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)、褐家鼠(*Rattus novegicus*)。
分 佈：江西。

Schöngastiella paraconfuciana Wang et Gu 擬社同棒恙蟎 (Wang et Gu, 1983:381)
Schöngastiella paraconfuciana Wang et Gu, 1983:381-382.
寄 主：錫金小家鼠(*Mus pahari* Thomas)、黃毛鼠(*Rattus losea* Swinhoe)、黃胸鼠(*Rattus flavipectus*)、黑尾鼠(*Rattus cremoriventer* Miller)。
分 佈：貴州。

Shunsennia hertigi Traub et al. 后角春川恙蟎 (Sun, 1979:355)
Shunsennia hertigi Traub et al.
寄 主：棕背鼴(*Clethrionomys rufocanus*)、東方田鼠(*Microtus fortis*)、黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)、花鼠(*Eutamias sibiricus*)。
分 佈：遼寧。

Shunsennia scabrisetosa Huang 粗毛春川恙蟎 (Huang, 1986:277)

Shunsennia scabrisetosa Huang, 1986:277-278.
寄 主：社鼠(*Rattus niviventer* Hodgson)。
分 佈：陝西(柞水縣黃花嶺)。

Striatiscuta cincli Hsu et Hsu 河鳥紋盾恙蟎 (Hsu et Hsu, 1982:374)
Striatiscuta cincli Hsu et Hsu, 1982:374-375.
寄 主：河鳥(*Cinclus pallasi*)。
分 佈：浙江(天臺縣)。

Tragardhula hsui Wang 徐氏五甲恙蟎 (Wang, 1964:91)
Tragardhula hsui Wang, 1964:91.
寄 主：社鼠(*Rattis confucianus confucianus*)。
分 佈：福建。

Tragardhula sinica Wang 中華五甲恙蟎 (Wang, 1964:94)
Tragardhula sinica Wang, 1964:94.
寄 主：花松鼠(*Tamiop swinhoei monticolus*)。
分 佈：福建。

Tragardhula tamiyai (Philip et Fuller) 田宮五甲恙蟎 (Wang, 1962:272)
Tragardhula tamiyai (Philip et Fuller, 1950:)
寄 主：黃毛鼠(羅賽鼠)(*Rattus losea exiguus* A. B. Howell)。
分 佈：福建(漳州)。

Tragardhula weni Wang 溫氏五甲恙蟎 (Wang, 1964:93)
Tragardhula weni Wang, 1964:93.
寄 主：社鼠(*Rattis confucianus confucianus*)。
分 佈：福建。

Trisetica asiaticus Zhao et Qiu 亞洲三毛恙蟎 (Zhao et Qiu, 1979:281)
Trisetica asiaticus Zhao et Qiu, 1979:281-282.
寄 主：蝙蝠。
分 佈：廣西。

Trombicula (s. str.) **corvi** (Jeu, 1956:434; Jeu et Wen, 1957:451,452)
寄 主：雞(*Gallus gallus domestica* (Linnaeus))。
分 佈：臺灣。

Trombicula (Eutrombicula) hirsti (Jeu, 1956:434)
寄 主：
分 佈：臺灣。

Trombicula (Eutrombicula) isshikii (Jeu, 1956:434)

寄 主：
分 佈：臺灣。

Trombicula munda (Jeu, 1956:434)
寄 主：
分 佈：廣東(廣州)。

Trombicula palpalis Nagayo et al. 鬚恙蟎 (Liu, 1958:183)
Trombicula palpalis Nagayo et al., 1919:
寄 主：溝鼠(*Rattus norvegicus*)、小家鼠(*Mus musculus* Linnaeus)。
分 佈：北京。

Trombicula (Miyatrombicula) tokyoensis shanghaiensis Lu 上海恙蟎 (Lu, 1977:461)
Trombicula (*Miyatrombicula*) *tokyoensis shanghaiensis* Lu, 1977:461.
寄 主：南鼬(*Mustela sibirica davidiana*)。
分 佈：上海。

Trombicula (Eutrombicula) wichmanni Oudemans 威氏恙蟎 (Jeu, 1956:434; 1960:485-492; Jeu et Wen, 1957:451)
Trombicula (*Eutrombicula*) *wichmanni* Oudemans
寄 主：雞(*Gallus gallus domestica* (Linnaeus))。
分 佈：臺灣、海南；菲律賓、緬甸、印尼、西利伯斯、西蘭島、澳洲。

Trombicula spp. (Jeu, 1956:433-448)
寄 主：家貓(*Felis domesctica*)、家鼠(*Rattus rattus alexandrinus*)、長江野兔(*Lepus europeus aurigineus*)。
分 佈：南京。

Trombiculindus (s. str.) acanthosphenus Wang et al. 棘梨葉片恙蟎 (Wang et al., 1988:137)
Trombiculindus (s. str.) *acanthosphenus* Wang et al., 1988:137-139.
寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agraius*)耳殼上。
分 佈：湖北(宜昌縣)。

Trombiculindus (s, str,) **alpinus** Yu et Yang 高山葉片恙蟎 (Yu et Yang, 1979:69)
Trombiculindus (s, str.) *alpinus* Yu et Yang, 1979:69-71.
寄 主：小耳林姬鼠(*Apodemus sylvaticus orestes*)。
分 佈：雲南。

Trombiculindus cardiosetosus Hsu et Chen 心毛葉恙蟎 (Hsu et Chen, 1964:741)
Trombiculindus cardiosetosus Hsu et Chen, 1964:741.
別 名：*心毛葉恙*。
寄 主：針毛鼠(*Rattus buang* Bonhote, 1905)。
分 佈：廣東(乳陽)。

Trombiculindus cuneatus Traub et Evan 楔形葉片恙蟎 (Wang, 1962:276; Wang et Liao, 1981:105)

Trombiculindus cuneatus Traub et Evan, 1951:

寄 主：臭鼩(*Suncus murinus*)、小林姬鼠(*Apodemus agrarius ningpoensis*)、青毛鼠(*Rattus bowersii latouchei*)、黃毛鼠(羅賽鼠)(*Rattus losea exiguus* A. B. Howell)、社鼠(*Rattus niviventer confucianus*)。

分 佈：福建。

Trombiculindus (s. str.) **guangdongensis** Zhao et Zhang 廣東葉片恙蟎 (Zhao et Zhang, 1979:66; 1980:323)

Trombiculindus guangdongensis Zhao et Zhang, 1979:66-68.

寄 主：白腹巨鼠(*Rattus edwardsi edwardsi*)。

分 佈：廣東。

Trombiculindus (Plumosicola) nanlingensis Zhao 南嶺葉片恙蟎 (Zhao, 1981:57)

Trombiculindus (*Plumosicola*) *nanlingensis* Zhao, 1981:57-58.

寄 主：青毛鼠(*Rattus bowersi* Anderson)。

分 佈：廣東(連縣)。

Trombiculindus (Plumosicola) ochotonae Wang et al. 鼠兔葉片恙蟎 (Wang et al., 1984:159)

Trombiculindus (*Plumosicola*) *ochotonae* Wang et al., 1984"159-160.

寄 主：西川鼠兔(*Ochotona gloveri*)。

分 佈：四川(西部阿壩)。

Trombiculindus (Plumosicola) sanxiaensis Wang et al. 三峽葉片恙蟎 (Wang et al., 1988:139)

Trombiculindus (*Plumosicola*) *sanxiaensis* Wang et al., 1988:139-140.

寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agraius*)體上。

分 佈：湖北(宜昌縣)。

Trombiculindus (Plumosicola) stenosetosus Liao 狹毛葉片恙蟎 (Liao, 1985:381)

Trombiculindus (*Plumosicola*) *stenosetosus* Liao, 1985:381-383.

寄 主：針毛鼠(*Rattus fulvescens buang* Bonhote, 1905)。

分 佈：福建(建甌)。

Trombiculindus (Plumosicola) yushuensis Yang et Wu 玉樹羽葉恙蟎 (Yang et Wu, 1990:320)

Trombiculindus (Plumosicola) yushuensis Yang et Wu, 1990:320-322.

寄 主：紅耳鼠兔(*Ochotona erythrotis* Buchner)。

分 佈：青海(玉樹縣)。

Walchia acutascuta 尖盾華溪恙蟎 (Chen, 1980:291-297)

寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)。

分 佈：江蘇。

Walchia (Ripiapichia) chinensis (Chen et Hsu) 中華華溪恙蟎 (Chen, 1978:198; 1980:291-297; Liao, 1994:159; Wang, 1962:275; Wang et Liao, 1981:108)

Gahrliepia (*Walchia*) *chinensis* Chen, et Hsu, 1955:

別 名：*中華無前恙蟎*。

寄 主：臭鼩(*Suncus murinus*)、黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)、田小鼠(*Mus bactrianus*)、小家鼠(*Mus muculus* Linnaeus)、青毛鼠(*Rattus bowersii latouchei*)、白腹鼠(*Rattus coxingi andersoni*)、針毛鼠(*Rattus fulvescens*)、黃胸鼠(*Rattus flavipectus*)、黃毛鼠(羅賽鼠)(*Rattus losea exiguus* A. B. Howell)、社鼠(*Rattus niviventer confucianus*)、大足鼠(*Rattus nitidus*)、褐家鼠(*Rattus norvegicus*)。

分 佈：福建、貴州、江蘇。

Walchia chinensis var. **oligosetosa** Chen et Hsü 中華背展恙蟎 (Wang, 1962:275;Wang et Ku, 1979:96)

Gahrliepia (*Walchia*) *chinensis* var. *oligosetosa* Chen et Hsu, 1955:

寄 主：褐家鼠(*Rattus norvegicus*)、黃胸鼠(*Rattus flavipectus*)、黃毛鼠(羅賽鼠)(*Rattus losea exiguus* A. B. Howell) 鼠 *Rattus flavipectus*。

分 佈：貴州。

Walchia fenga Zhao et Liang 封華溪恙蟎 (Zhao et Liang, 1989:245)

Walchia fenga Zhao et Liang, 1989:245.

寄 主：大足鼠(灰腹鼠)(*Rattus nitidus*)。

分 佈：廣東。

Walchia fragilis Schluger 脆弱無前恙蟎 (Liu, 1958:184; Sun, 1994:72)

Walchia fragilis Schluger, 1955:

寄 主：黑線倉鼠(*Cricetulus barabensis*)、黑線姬鼠 *Apodemus agrarius*)、大倉鼠(*Cricetulus tritan*)、東方田鼠(*Microtus fortis*)、東北鼢鼠(*Myospalax psilurus*)、溝鼠(*Rattus norvegicus*)、小家鼠(*Mus musculus* Linnaeus)。

分 佈：北京、遼寧。

Walchia globosensilla 球感華溪恙蟎 (Chen, 1980:291-297)

寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)。

分 佈：江蘇。

Walchia (s. str.) **jiangxiensis** Wang et Song 江西瓦溪恙蟎 (Wang et Song, 1981:159)

Walchia (s. str.) *jiangxiensis* Wang et Song, 1981:159-160.

寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)、針毛鼠(*Rattus fulvescens*)、褐家鼠(*Rattus norvetgicus*)、黃胸鼠(*Rattus flavipectus*)。

分 佈：江西。

Walchia kutsingensis Liang et Hwang 古井(華)葛恙蟎 (Liang et Hwang, 1959:149)

Gahrliepia (*Walchia*) *kutsingensis* Liang et Hwang, 1959:149.

寄 主：板齒鼠(*Bandicota nemorivaga*)。

分 佈：廣東(新會古井鎮)。

Walchia latiscuta Wang et al. 寬盾無前恙蟎 (Wang et al., 1987:170)

Walchia latiscuta Wang et al., 1987:170-172.

寄 主：針毛鼠。

分 佈：福建(邵武桂林)。

Walchia (Ripiaspichia) minuscuta Chen 小盾華溪恙蟎 (Chen, 1978:198; 1980:291-297)

Walchia minuscuta Chen, 1978:198.

寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)。

分 佈：江蘇。

Walchia neosinensis (Hsü et Wen) 新華華溪恙蟎 (Chen, 1978:198; 1980:291-297; Hsu et Wen, 1956:450; Wang et Ku, 1979:96)

Gahrliepia (*Walchia*) *neosinensis* Hsü et Wen, 1956:450.

寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)、黃毛鼠(*Rattus losea*)。

分 佈：貴州、浙江、江蘇。

Walchia oligosetaosa (Chen et Hsu) 貧毛無前恙蟎 (Wang et Liao, 1981:108)

Walchia oligosetaosa (Chen et Hsu), 1955:

寄 主：黃胸鼠(*Rattus flavipectus*)、黃毛鼠(*Rattus losea exiguus*)、褐家鼠(*Ratuus norvegicus*)、家鼠(*Rattus rattus rattus*)。

分 佈：福建。

Walchia (s. str.) **pacifica** (Chen et Hsu) 太平洋華溪恙蟎 (Chen, 1978:198; 1980:291-297; Wang, 1962:275; Wang et Liao, 1981:108)

Gahrliepia (*Walchia*) *pacifica* Chen et Hsu, 1955:

寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)、花背倉鼠(*Cricetulas arabensis*)、青毛鼠(*Rattus bowersii latouchei*)、白腹巨鼠(*Rattus edwardsi edwardsi*)、針毛鼠(*Rattus fulvescens huang*)、黃毛鼠(羅賽鼠)(*Rattus losea exiguus* A. B. Howell)、社鼠(*Rattus niviventer confucianus*)、中華竹鼠(*Rhiizomys sinensis*)。

分 佈：福建、江蘇。

Walchia parapacifica (Chen et Hsu) 似太平洋背展恙蟎 (Liao, 1994:159; Wang, 1962:275; Wang et Ku, 1979:95; Wang et Liao, 1981:108)

Gahrliepia (*Walchia*) *parapacifica* Chen et Hsu, 1955:

寄 主：灰麝鼩(*Crocidura attenuata*)、黑線姬鼠(*Apodemus agrarius ningpoensis*)、青毛鼠(*Rattus bowersii latouchei*)、白腹巨鼠(*Rattus edwardsi edwardso*)、黃毛鼠(*Rattus losea*)、黃胸鼠(*Rattus flavipectus*)、黃毛鼠(羅賽鼠) (*Rattus losea exiguus* A. B. Howell)、大足鼠(*Rattus nitidus*)、社鼠(*Rattus niviventer confucianus*)、褐家鼠(*Rattus norvegicus*)、中華竹鼠(*Rhizomys sinensis*)。

分 佈：福建、貴州。

Walchia pingue (Jeu, 1956:434)

寄 主：

分 佈：福建。

Walchia (s. str.) **saduski** 薩氏葛李恙蟎 (Chen, 1980:291-297)

寄 主：黑線姬鼠(*Apodemus agrarius*)。

分 佈：江蘇。

Walchia shanniui Hsu et Chen 山牛恙蟎 (Hsu et Chen, 1964:747)

Walchia shanniui Hsu et Chen, 1964:747.

別 名：*山牛背展(恙蟲)*。

寄 主：山牛(俗名)。

分 佈：廣東(乳陽)。

Walchia sunweiensis Liang et Hwang 新會(華)葛恙蟎 (Liang et Hwang, 1959:150)

Gahrliepia (*Walchia*) *sunweiensis* Liang et Hwang, 1959:150.

寄 主：板齒鼠(*Bandicota nemorivaga*)。

分 佈：廣東(新會古井鎮)。

Walchia wuchihensis Hsu et Chen 五指恙蟎 (Hsu et Chen, 1964:745)

Walchia wuchihensis Hsu et Chen, 1964:745.

別 名：*五指背展(恙蟲)*。

寄 主：黃毛鼠(*Rattus rattoides exiguus* Howell, 1927)。

分 佈：海南(瓊中通什)。

Walchia tianguangshanensis Zhao et al. 天光山華溪恙蟎 (Zhao et al., 1981:324)

Walchia tianguangshanensis Zhao et al., 1981:324.

寄 主：青毛鼠(*Rattus bowersi* Anderson, 1879)。

分 佈：華中區(南嶺)。

Walchia xishaensis Zhao et al. 西沙華溪恙蟎 (Zhao, et al., 1986:96)

Walchia xishaensis Zhao, et al., 1986:96.

寄 主：黃胸鼠(*Rattus flavipectus*)、小鼠(緬鼠)(*Rattus exulans*)、褐家鼠(*Rattus novegicus*)。

分 佈：西沙群島(永興島).

Walchiella alpina Yu et al. 高山毫前恙蟎 (Yu et al., 1982:378)

Walchiella alpina Yu et al., 1982:378-379.

寄 主：黑麝(*Moschus* sp.)。

分 佈：雲南(西部碧羅雪山)。

Walchiella wuyiensis Wang et Liao 武夷毫前恙蟎 (Wang et Liao, 1981:108, 219)

Walchiella wuyiensis Wang et Liao, 1981:219-220

寄 主：花松鼠(*Tamiops swinhoei*)、青毛鼠(*Rattus bowersii latouchei*)、針毛鼠(*Rattus fulvescens*)、社鼠(*Rattus niviventer confucianus*)。
分 佈：福建。

Leeuwenhoekiidae 里紋恙蟎科(列恙蟎科)

Multisetosa sciurotamiatis Zhou et al. 岩松鼠多毛蟎 (Zhou et al., 1987:141)
Multisetosa sciurotamiatis Zhou et al., 1987:141.
寄 主：岩松鼠(*Sciurotamias davidianus* Milne-Edwards)。
分 佈：四川。

Multisetosa sylvatici Zhou et al. 森林多毛蟎 (Zhou et al., 1987:143)
Multisetosa sylvatici Zhou et al., 1987:143.
寄 主：小林姬鼠(*Apodemus sylvticus* Linnaeus)。
分 佈：四川。

Odontacarus jinanensis Teng 濟南螯齒恙蟎 (Teng, 1983:75)
Odontacarus jinanensis Teng, 1983:75-76.
寄 主：黃脊蛇(*Coluber spinalis*)。
分 佈：山東(濟南千佛山)。

Odontcarus majesticus (Chen et Hsu) 巨螯齒恙蟎 (Wang et Liao, 1981:109)
Odontacarus majesticus (Chen et Hsu), 1955:
寄 主：白腹鼠(*Rattus coxingi andersoni*)、白腹巨鼠(*Rattus edwardsi edwardsi*)、黃胸鼠(*Rattus flavipectus*)、黃毛鼠(*Rattus losea exiguus*)、社鼠(*Rattus niviventer confuciana*)、褐家鼠(*Rattus norvegicus*)、花松鼠(*Tamiops swinhoei*)、家兔(*Lepus domesticus*)、家貓(*Felis ocreata domestica*)。
分 佈：福建。

Odontacarus shandongensis Teng 山東螯齒恙蟎 (Teng, 1983:106)
Odontacarus shandongensis Teng, 1983:106.
寄 主：無蹼壁虎(*Gekko swinhoana*)。
分 佈：山東(濟南千佛山洞)。

Odontacarus (s. str.) **sichuanensis** Zhou, Wen, Wang et Zhang 四川螯齒蟎 (Zhou, et al., 1981:317)
Odontacarus (s. str.) *sichuanensis* Zhou, et al., 1981:317.
寄 主：鼠。
分 佈：四川。

Odontacarus (s. str.) **tetrasetosus** Yu et Yang 四毛螯齒恙蟎 (Yu et Yang, 1986:64)
Odontacarus (s. str.) *tetrasetosus* Yu et Yang, 1986:64-65.
寄 主：斯氏家鼠(*Rattus rattus sladeni*)。
分 佈：雲南(雲龍)。

Odontacarus yosanai (Fukuzumi et Obata) 與氏螯齒恙蟎 (Chen, 1978:198; Jeu, 1963:42; Zhou, et al., 1981:317)

Odontacarus yosanai (Fukuzumi et Obata), 1953:

寄 主：褐家鼠(*Rattus norvegicus*)、黃胸鼠(*Rattus flavipectus*)。

分 佈：四川、江蘇。

Whartonia acutigalea Wang et Lin 尖鞘滑頓恙蟎 (Wang et Lin, 1985;105)

Whartonia acutigalea Wang et Lin, 1985:105-107.

寄 主：小家蝠

分 佈：福建(龍岩)。

Johnstonianidae 約絨蟎科

Hirstithrombium meridionalis Zhang et Xin 南方赫絨蟎 (Zhang et Xin, 1988:314)

Hirstithrombium meridionalis Zhang et Xin, 1988:314.

寄 主：

分 佈：廣東(廣州)。

Lassenta furcasetosa Zhang 叉毛拉絨蟎 (Zhang, 1988:114)

Lassenta furcasetosa Zhang, 1988:114.

寄 主：雙翅目。

分 佈：上海 。

Hydryphantidae 盾水蟎科

有幾屬寄生蚊蟲(盾水蟎 *Panisopsis* sp.,盾水蟎 *Thyas barbigera* Viets)。

Lebertiidae 腺水蟎科

Lebertia (Pilolebertia) liangi Jin 梁氏腺水蟎 (Jin, 1994:122)

Lebertia (*Pilolebertia*) *liangi* Jin, 1994:122.

寄 主：搖蚊科幼蟲。

分 佈：貴州(貴陽)。

Lebertia (Pilolebertia) ramiseta Jin 鹵觸毛腺水蟎 (Jin, 1994:120)

Lebertia (*Pilolebertia*) *ramiseta* Jin, 1994:120.

寄 主：搖蚊科幼蟲。

分 佈：貴州(興義)。

Limnesiidae 沼蟎科

Tyrrellia circularis Koenike 寄生蠓，林沼蟎 *Limnesia jamurensis* Wudemans 取食 按

蚊 *Anopheles farauti* Laveran 及 *Culex pullus* Theobald 卵、幼蟲或蛹爲食。

Pionidae 軟滑水蟎科

有些種類的幼蟎寄生搖蚊(Chironomidae)的成蟲，軟滑水蟎 *Piona nodata* (Nykker) 其若蟎和成蟎食量很大。

Hygrobatidae 濕蟎科

Hygrabates atrovirens Jin 墨綠濕蟎 (Jin, 1994:70)
Hygrabates atrovirens Jin, 1994:70-71.
寄 主：
分 佈：貴州(貴陽)。

Hygrabates gousi Jin 郭氏濕蟎 (Jin, 1994:67)
Hygrabates gousi Jin, 1994:67-68.
寄 主：
分 佈：貴州(貴陽)。

Hygrobates guizhouensis Jin 貴州濕蟎 (Jin, 1994:68)
Hygrobates guizhouensis Jin, 1994:68-70.
寄 主：
分 佈：貴州(貴陽)。

Hygrobates sinensis Uchida et Imamura 中華濕蟎 (Jin, 1994:72)
Hygrobates sinensis Uchida et Imamura
寄 主：
分 佈：北京(海淀區)。

Hygrobates xinyiensis Jin 興義濕蟎 (Jin, 1994:71)
Hygrobates xinyiensis Jin, 1994:71-72.
寄 主：
分 佈：貴州(興義)。

Arrenuridae 雄尾蟎科

Arrenurus dambyensis Mullen 寄生在加拿大寄生蚊(*Coquillettidia perturbans* (Walker))，在巴基斯坦因寄生而造成 *Aedes* 和 *Cules* 在產卵前大量死亡。

Acaridae 粉蟎科

Caloglyphus berlese (Michael) 伯氏嗜木蟎 (Xin, 1988:356)
寄 主：除貯藏食品中發現外，尚發現侵害飼養昆蟲的卵和幼蟲。

分 佈：中國。

Calogylphus fujianensis Zou et al. 福建嗜木蟎 (Zhang et al., 1997:221-228; Zou et al., 1987:115)

Calogylphus fujianensis Zou et al., 1987:115-119.

寄 主：*Holotrichia ovata* Chang 卵圓齒爪金龜
Holotrichia kiotonensis Brenske 京都大黑鰓金龜
Holotrichia sp. 肖似鰓金龜
Maladera ovatula (Fairmaire) 小闊脛絹金龜
Melolontha sp. 肖似鰓金龜
Anomala antigua (Gyllenhal) 桐黑異麗金龜
Anomala heydeni Frivaldszky 深綠異麗金龜
Anomala cupripes Hope 紅腳異麗金龜
Anomala rubripes Lin 紅腳異麗金龜。

分 佈：福建(莆田)。

Lardoglyphus konoi 河野脂蟎 (Xin, 1988:356)

寄 主：爲魚乾和鹹魚製品的重要害蟎，休眠體常寄生在各種皮蠹體上。

分 佈：中國；全世界。

Lardoglyphus zacheri Oudemans 扎氏脂蟎 (Xin, 1988:354)

寄 主：*Dermestes maculatus* 白腹皮蠹幼蟲體。

分 佈：中國；全世界。

Thyreophagus entomophagus (Laboulbene) 食蟲狹蟎 (Xin, 1988:358)

Thyreophagus entomophagus (Laboulbene, 1852:)

寄 主：普遍發生在麵粉。

分 佈：

Canestriniidae 寄甲蟎科

(Xin, 1988:375)

與鞘翅目若干科的甲有關，大多位于翅鞘下方，也有隱蔽在咽片及基節處。寄生于步甲、鍬甲、擬步甲、葉甲、黑幌、金龜等甲蟲上。

Hemisarcoptidae 半疥蟎科

(Xin, 1988:375)

已記錄有三種，蘋半疥蟎 (*Hemisarcoptes malus* (Shimer)) 爲小型種類(300 微米)，在美、歐洲及非洲取食蚧蟲及其卵。半疥蟎的休眠由盔唇瓢蟲(*Chilocorus*)所攜播，而此瓢蟲又是蚧蟲的捕食者。

柯氏半疥蟎 (*H. cooremani* (Thomas)) 在卡氏唇瓢蟲 (*Chilocorus cacti*) 的鞘翅下發現。雙斑唇瓢蟲 (*Chilocorus bipustulatus*) 與隻點盔唇瓢蟲 (*C. stigma*) 分別

攜播食蚧半疥蟎 (*H. coccophagus*) 與蘋半疥蟎 (*H. malus*)。

Hemisarcoptes sp. 柳牡蠣蚧半疥蟎 (Ji et Yang, 1990:135; Ji et al., 1991:151-153; Ren et al., 1991:158)
寄 主：*Lepidosaphes salicina* 柳牡蠣蚧
Parlatoria gergandei
Unaspis yanonensis (Kuwana) 矢尖蚧。
分 佈：貴州、遼寧。

Hemisarcoptes sp. (Chiu et Lo, 1985:3, 4)
寄 主：*Chrysomphalus anoidum* (Linnaeus) 褐圓蚧
Lepidosaphes beckii 牡蠣蚧
Parlatoria zizyphus 黑點蚧。
分 佈：臺灣。

Syringophilidae 羽管蟎科

Syringophilopsis hunanensis Liu 湖南羽管蟎 (Liu, 1988:274)
Syringophilopsis hunanensis Liu, 1988:274-275.
寄 主：麻雀(*Passer domesticus* Linnaeus)。
分 佈：湖南(嘉禾縣)。

Syringophiloidus minor Berlese 小羽管蟎 (Liu, 1988:275)
Syringophiloidus minor Berlese, 1887:
寄 主：麻雀(*Passer domesticus* Linnaeus)。
分 佈：湖南(嘉禾縣)。

Syringophilus bipectinatus Heller 雙梳羽管蟎 (Liu, 1988:276)
Syringophilus bipectinatus Heller, 1880:
寄 主：雞(*Gallus gallus* Linnaeus)。
分 佈：湖南(長沙)。

PSEUDOSCORPIONIDA 僞蠍目

Chelonthida

Chelonthidae 僞蝎科

Chelifer cancroides Linnaeus 僞蠍 (Gao, 1996, 12(3):139)
捕 食：倉庫粉嚙蟲
塵蝨
倉庫蟎類。
分 佈：貴州。

Chelifer sp. (Lin, 1968:45)

捕 食：倉庫害蟲。
分 佈：臺灣。

MYRIAPODA(CHILOPODA) 多腳綱(唇腳綱)

Scolopendridae 蜈蚣科

Scolopendra subspinipes 少刺蜈蚣 (Zhang et Li, 1982:228)

捕 食：*Odontotermes formosanus* Shiraki 黑翅土白蟻(爲害板栗)。
分 佈：浙江。

Scolopendra sp. 蜈蚣 (Liu et al., 1995, 17(4):187)

捕 食：*Cordyceps sinensis* (Berjekt) Saccards 冬蟲夏草菌(蝠蛾)。
分 佈：廣東。

CNIDARIA (CNIDARIANS) 腔腸動物

(Polyp) 水螅 (Li, 1996, 18(1):45)

捕 食：蚊(孑孓)。
分 佈：

PLATYHELMINTHES (FLATWORMS) 扁形動物

Turbellarians 渦蟲 (Li, 1996, 18(1):45)

捕 食：蚊(孑孓)。
分 佈：

VERTEBRATES 脊椎動物

FRESHWATER FISHES 淡水魚類

(Chen et Yu, 1986, I:281-407, II:489-791; Cheng, 1981, 8(1):26; Li, 1996, 18(1):45)

Homalopteridae 平鰭鰍科

Crossostoma lacustre Steindachner 臺灣纓口鰍 (Chen et Yu, 1986, I:282)

=*Formosania gilberti* Oshima
別 名：*臺灣平鰭鰍*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Hemimyzon formosanum (Boulenger) 臺灣間爬岩鰍 (Chen et Yu, 1986, I:282; Tseng, 1990:15)

別 名：*石貼仔*，*臺灣石爬子*。

捕 食：藻類及水生昆蟲。
分 佈：臺灣(西部各溪流中、上游)。

Hemimyzon taitungensis Tzeng et Shen 臺東間岩鰍 (Chen et Yu, 1986, I:282; Tseng, 1990:17)
別 名：*石貼仔*。
捕 食：藻類及水生昆蟲。
分 佈：臺灣(中央山脈以東各河川中、上游)。

Sinogastromyzon puliensis Liang 埔里中華爬岩鰍 (Chen et Yu, 1986, I:2282; Tseng, 1990:19)
別 名：*石貼仔，簸箕魚，棕簑貼，木箕貼仔*。
捕 食：藻類及水生昆蟲。
分 佈：臺灣(大甲溪以南至高屏溪之間中游河段)。

Cyprinidae 鯉科

Abbottina brevirostris brevirrostris (Günther) 短吻鐮柄魚 (Chen et Yu, 1986, I:296; Tseng, 1990:63)
Microphysogobio brevirostris Günther
別 名：*車栓仔，短吻棒花魚*。
捕 食：藻類和水生昆蟲。
分 佈：臺灣(新竹、竹東一帶、淡水河、大甲溪)。

Abbottina brevirrostris alticorpus (Chen et Yu, 1986, I:296)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(嘉義、臺中一帶)。

Acrossocheilus (s. str.) **fasciatuus** (Steinddachner) 條紋石鱝 (Chen et Yu, 1986, I:294)
別 名：*光唇魚*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Acrossocheilus (s. str.) **formosanus** (Regan) 石鱝 (Chen et Yu, 1986, I:294)
Gymnostomus formosanus Regan
別 名：*臺灣光唇魚，臺灣橫唇鮊，石斑，石鱝，秋斑*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(南投、日月潭、埔里、新竹、桃園、淡水河)。

Acrrossocheilus (Lissochilichthys) labiatus (Regan) 軟鮘 (Chen et Yu, 1986, I:294)
Gymnostomus laabiatus Regan
=*Lissochilichthys paradoxus* Günther
=*Lissochilichthys matssudai* Oshima
別 名：*厚唇魚*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(屏東、南投、大甲溪、新店、木柵)。

Aphyocypris kikuchii (Oshima) 菊池氏細鯽 (Chen et Yu, 1986, I:292; Tseng, 1990:51)

Phoxiscus kikuchii Oshiima

別 名：*Medaka* (臺東)

捕 食：掉落水面的昆蟲和藻類。

分 佈：臺灣(東部各河川和池塘，大肚溪)。

Aristichthys nobilis (Richardson) 黑鰱 (Chen et Yu, 1986, I:290)

別 名：*鏞，花鰱，紅鰱，黑鏞，胖頭鰱，大頭魚*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(養殖)、福建、廣東。

Candidia barbata (Regan) 臺灣馬口魚 (Chen et Yu, 1986, I:293)

Opsarrichthys barbatus Regan

別 名：*溪簪，戇仔魚*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(南投，日月潭；宜蘭)。

Capoeta semifascialata (Günther) 紅目鮘 (Chen et Yu, 1986, I:294; Tseng, 1990:37)

別 名：*條紋四鬚，條紋二鬚鲃*。

捕 食：雜食性，以小型無脊椎動物及絲藻爲食。

分 佈：臺灣(西部各地平原間的水溝或小溪)。

Carassius auratus auratus (Linnaeus) 鯽魚 (Chen et Yu, 1986, I:290; Tseng, 1990:31)

別 名：*鮒魚，月鯽魚，鯽仔魚，鰤仔*。

捕 食：雜食性，亦食有機碎屑及底棲動物等。

分 佈：臺灣(各河川中、下游)。

Carassius auratus X Cyprinus carpio 雜交鯽魚 (Li et al., 1986:135-137)

捕 食：飼養在稻田捕食孑孓。

分 佈：湖南。

Carassius carassius cuvieri 白鯽 (Yu et al., 1989:113-116)

捕 食：稻田養殖(控制病蟲草害)。

分 佈：浙江。

Carassius euvieri (Temminck et Schlegel) 高身鯽 (Chen et Yu, 1986, I:291; Tseng, 1990:33)

別 名：*日本鯽仔*。

捕 食：雜食性，喜食植物性浮游生物，亦食有機碎屑及附著性藻類等。

分 佈：臺灣(自日本引進爲養殖種類，現在全省各河川中、下游均有)；日本。

Carassius gibelio langsddorfi (Val.) 河內鯽 (Chen et Yu, 1986, I:291)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(自日本引進，各地池沼河川中)；日本。

Cirrhina molitorella (Cuvier et Valenciennes) 鯁魚 (Chen et Yu, 1986, I:294)

=*Rohita decora* Jordan et Evermann
=*Cirrhina melanostigma* Fowlerr et Bean
=*Labeo jordani* Oshima
別 名：*鯪魚，花鯪*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(屏東、南投、臺北)、廣東。

Ctenopharyngodon idellus (Cuvier et Valenciennes) 草魚 (Chen et Yu, 1986, I:292; Li et al., 1986:135-137; Tseng, 1990:71; Yu et al., 1989:113-116)

別 名：*鯶魚，鯇魚，白鯇，池魚*。
捕 食：水草，孑孓(稻田)。
分 佈：臺灣(最早引自中國大陸，爲我國傳統養殖魚種)、福建、廣東、湖南。

Culter erythropterus Basilewsky 紅鰭鮊 (Chen et Yu, 1986, I:292; Tseng, 1990:59)

=*Culterr brevicauda* Günther
別 名：*曲腰，翹嘴巴，白魚，白條魚*。
捕 食：肉食性，以小魚、小蝦和水中昆蟲爲食。
分 佈：臺灣(西部自淡水河以至恆春各地之河川下游、湖泊、池塘中)。

Cyprinus carpio Linnaeus 鯉魚 (Li et al., 1986:135-137; Tseng, 1990:27; Yu et al., 1989:113-116)

別 名：*魠仔*。
捕 食：雜食性，水生昆蟲，孑孓(稻田)等。
分 佈：原種普遍分佈於亞洲、歐洲各地養殖魚種，臺灣經人工移殖各地河川之中下游及湖沼，甚至部分山區湖泊裡都有其蹤跡。

Cyprinus (s. str.) **carpio haematopterus** Temminck et Schlegel 鯉魚 (Chen et Yu, 1986, I:290)

別 名：*琴高，稜高，財神魚，魠魚，魠仔*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(全島各地)、華南、華東等地。

Disttoechodon tumirostris Peters 鯝魚 (Chen et Yu, 1986, I:292)

別 名：*圓嘴鯝，贕魚*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(宜蘭)。

Erythroculter illishaformis illishaformis (Bleeker) 翹嘴鮊魚 (Chen et Yu, 1986, I:292)

別 名：*屈腰魚，橈腰*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(日月潭名產)、自福建至鴨綠江均有報告。

Erythroculter oxycephalus (Bleeker) 尖頭鮊魚 (Chen et Yu, 1986, I:292)

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Gnathopogon iijimae Oshima 飯島氏頜鬚鮈 (Chen et Yu, 1986, I:296; Tseng, 1990:69)

別 名：*車栓仔，臺灣頜鬚鮈，飯島氏麻魚；溪䱗*。

捕 食：水生昆蟲、藻類和植物屑。

分 佈：臺灣(南投、大肚溪、桃園、淡水河，爲臺灣特有種)。

Gobiobotia cheni Banaerscu et Nalbant 臺灣鰍鮀 (Chen et Yu, 1986, I:290)

Gobiobotia cheni Banaerscu et Nalbant, 1966:

捕 食 性。

分 佈：臺灣(臺中)。

Gobiobotia intermeida fukiennsis (Chen et Yu, 1986, I:290)

捕 食 性。

分 佈：福建。

Gobiobotia intermedia intermedia Banaerscu et Nnalbant 間鰍鮀 (Chen et Yu, 1986, I:290)

Gobiobotia intermedia intermedia Banaerscu et Nnalbant, 1968:

捕 食 性。

分 佈：臺灣(屏東)。

Hemibarbus labeo (Pallas) 䱻 (Chen et Yu, 1986, I:294; Tseng, 1990:41)

別 名：*鱎，唇䱗，真口魚，羅漢魚、竹竿頭*。

捕 食：水生昆蟲或淡水螺類

分 佈：臺灣(南投、新店、臺北、淡水河、宜蘭)。

Hemiculter akoensis Oshima 屏東鱎 (Chen et Yu, 1986, I:291)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(屏東)。

Hemiculter leucisculus (Basilewsky) 白鱎 (Chen et Yu, 1986, I:291; Tseng, 1990:53)

別 名：*鰲條，白條苦槽仔，海鰱仔，克氏鱎*。

捕 食：雜食性，藻類或水生昆蟲。

分 佈：臺灣(日月潭、西部各河川下游及湖沼中)。

Hypophthalmichthys molitrix (Cuvier et Valenciennes) 白鰱 (Chen et Yu, 1986, I:290)

別 名：*鱮，白魚；大頭鰱，竹葉鰱*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(養殖)、福建、廣東。

Ischikauia macrrolepis macrolepis Rregan 大鱗鱎 (Chen et Yu, 1986, I:292)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(嘉義、臺北)。

Metzia mesembrina (Jordan et Evermann) 蘭嶼石鮒 (Chen et Yu, 1986, I:293)

Acheilognathuss mesembrinum Jordan et Eveermann

捕 食 性。

分 佈：臺灣(蘭嶼)。

Mylopharyngodon piceus (Richardson) 青魚 (Chen et Yu, 1986, I:292; Tseng, 1990:67)

=*Mylopharyngodon aethiops* (Basilwsky)

別 名：*烏溜，溜仔*。

捕 食：水中軟體動物，如蚌、蜆、螺螄，蝦類及水生昆蟲幼蟲，福壽螺。

分 佈：臺灣(自中國大陸引進重要養殖魚類，天然水域中較少)。

Pararasbora moltrechtii Regan 臺灣白魚 (Chen et Yu, 1986, I:293)

別 名：*白魚，肉魚*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(日月潭)。

Parabramis pekinensis (㕦)魚 (Yu et al., 1989:113-116)

捕 食：淡水中(稻田養殖控制病蟲草害)。

分 佈：浙江。

Paracheilognothus himategus Günther 臺灣石鮒 (Chen et Yu, 1986, I:293; Tseng, 1990:49)

別 名：*副彩鱊，臺灣鰟，革條副鱮，牛屎鯽，紅目鯝仔*。

捕 食：藻類和水生昆蟲。

分 佈：臺灣(各地平原區之溝渠、池沼)。

Pseudorasbora parva (Temminck et Schelgel) 羅漢魚 (Chen et Yu, 1986, I:294; Tseng, 1990:65)

別 名：*老漢魚，麥穗魚，尖嘴仔，車栓仔*。

捕 食：水生植物、藻類、浮游動物及水生昆蟲等。

分 佈：臺灣(各地平原區之溪流、湖泊及池塘中)。

Pseudorasbora parva pumila Miyazi (Chen et Yu, 1986, I:294)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(羅東大埤)。

Ptychidia jordani Myers 嘉魚 (Chen et Yu, 1986, I:294)

別 名：*卷口魚，老鼠魚*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(中部)、廣西(原產)。

Puntius snyderi Oshima 史尼氏紅目鮘 (Chen et Yu, 1986, I:294)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(南投、大肚溪、臺北)。

Rashorinus formosae Oshima 臺灣黃鯝魚 (Chen et Yu, 1986, I:292)

別 名：*細編*；*苦花*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(臺北)。

Rashorinus lineatus (Pellegrin) 線紋黃鯝魚 (Chen et Yu, 1986, I:292)

=*Rashborinus takakii* Oshima,

別 名：*線紋細編*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(屏東)。

Rhodeus ocellatus (Kner) 點鱊 (Chen et Yu, 1986, I:293; Tseng, 1990:47)

別 名：*高體鰟鮍*，*點紋鰟鮍*，*牛屎鯽*，*紅目鯽仔*，*膨皮*；奇力仔(Kirara)，*鰔力*，*鯿仔魚*。

捕 食：藻類及水生昆蟲。

分 佈：臺灣(各地平原區之溝渠、池沼)。

Rhodeus spinalis Oshima 鱊 (Chen et Yu, 1986, I:293)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、海南(原產)。

Sarcocheilichthys nigripinnis (Günther) 斑鰁 (Chen et Yu, 1986, I:296; Tseng, 1990:73)

Chilogobio nigripinnis Günther

別 名：*黑鰭鰁*，*黑翅鰁*，*車栓仔*，*斑蜷鰁*，*留仔*。

捕 食：小型水生昆蟲、藻類。

分 佈：臺灣(西南部各河川中下游)。

Sarcocheilichthys parvus Nichols 小鰁 (Chen et Yu, 1986, I:296)

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Sinibrama macrops (Günther) 大目孔 (Chen et Yu, 1986, I:292; Tseng, 1990:57)

=*Chanochichthys macrops* Günther

別 名：*黑鰭鰁*。

捕 食：水生昆蟲、小魚、蝦、藻類和植物碎屑等。

分 佈：臺灣(淡水河、下游和水庫中，基隆)。

Spinibarbus elongates Oshima 長棘鲃 (Chen et Yu, 1986, I:293)

別 名：*長身刺鲃*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(屏東)。

Spinibarbus hollandi Oshima 何氏棘魴 (Chen et Yu, 1986, I:293; Tseng, 1990:35)

別 名：*更仔，留仔*。
捕 食：水生昆蟲、小魚、蝦、藻類和水生植物碎屑等。
分 佈：臺灣(曾文溪、高屏溪、卑南大溪、秀姑巒溪、花蓮溪)。

Varicorhinus alticorpus (Oshima) 高身鯝魚 (Chen et Yu, 1986, I:294; Tseng, 1990:45)

別 名：*高身鏟頜魚，高身齧魚，鮸仔，赦兔，兔仔*。
捕 食：藻類和水生昆蟲。
分 佈：臺灣(高屏溪、卑南大溪、秀姑巒溪、花蓮溪)。

Varicorhinus barbatulus (Pellegrin) 鯝魚 (Chen et Yu, 1986, I:294; Tseng, 1990:43)

=*Varricorhinus tamusuiienssis* (Oshima)

別 名：*臺灣鏟頜魚，苦花，苦偎，齊頭偎，齧魚，淡水魚，鮕魚*。
捕 食：藻類及水生昆蟲。
分 佈：臺灣(各地山區溪流上游)。

Xenocypris medius (Oshima) 中臺鯪 (Chen et Yu, 1986, I:292)

捕 食 性。
分 佈：臺灣(中部)。

Xenocypris schisturus (Oshima) 叉尾鯪 (Chen et Yu, 1986, I:293)

別 名：*麻叉魚，扁鯉，鯪*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣 (中部)。

Zacco barbata (Regan) 臺灣馬口魚 (Tseng, 1990:81)

別 名：*山漣仔*。
捕 食：雜食性。
分 佈：臺灣(特有種，西部各河川中、上游及小支流中較普遍)。

Zacco pachycephalus (Günther) 粗首鱲 (Chen et Yu, 1986, I:293; Tseng, 1990:79)

別 名：*溪哥仔，苦槽仔，闊嘴郎(雄)*。
捕 食：肉食性，喜食昆蟲、小魚及蝦。
分 佈：臺灣(除花蓮及臺東外之河川、湖泊中均極普遍)。

Zacco platypus (Temminck et Schlegel) 平頜鱲 (Chen et Yu, 1986, I:293; Tseng, 1990:77)

=*Zacco evolans* Jorddan et Evermann

別 名：*寬鰭鱲，寬頜鱲；溪哥仔，小溪哥，溪桿仔，紅貓(雄)*。
捕 食：雜食性，喜追逐落水之昆蟲。
分 佈：臺灣(各河川中下游較普遍)。

Zacco temmincki (Temminck et Schlegel) 丹氏鱲 (Chen et Yu, 1986, I:293)
別 名：*河鰱，石鑌，石兵*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(嘉義)。

Cobitididae 鰍科

Cobitis taenia Linnaeus 沙鰍 (Chen et Yu, 1986, I:297; Tseng, 1990:91)
別 名：*花鰍，沙溜*。
捕 食：植物碎屑、藻類及其他小生物。
分 佈：臺灣(各地溪流中泥砂底河段)。

Misgurnus anguillicaudatus (Cantor) 泥鰍 (Chen et Yu, 1986, I:297; Tseng, 1990:89)
別 名：*土鰍，土鰌，胡溜*。
捕 食：水生藻類、甲殼類、水生昆蟲和一些腐植質。
分 佈：臺灣(各低海拔河川、池沼中或水田，已有專門養殖者)。

Misgurnus decemcirrosus Basileewsky 粗鱗土鰌 (Chen et Yu, 1986, I:297)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(屏東、花蓮、臺中、臺北)。

Paramisgurnus dabryanus (Sauvage) 大鱗副泥鰍 (Tseng, 1990:87)
別 名：*粗鱗土鰍，紅泥鰍*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(水田或沼澤中)。

Clariidae 塘蝨魚科

Clarias fuscus (Lacépède) 塘蝨魚 (Chen et Yu, 1986, I:300; Li, 1996, 18(1):45; Lu, 1985(1):34; Tseng, 1990:93)
別 名：*鬍子鯰，土殺，土蝨*。
捕 食：肉食性，各種魚、蝦、水生昆蟲、軟體動物、環節動物等。
分 佈：臺灣(各河川及池塘中)、海南島和廣西欽州地區(用水缸放養胡子鯰防治其中孳生的登革熱媒介埃及伊蚊(*Aedes aegypti*)。

Siluridae 鯰科

Parasilurus asotus (Linnaeus) 鯰魚 (Chen et Yu, 1986, I:301; Tseng, 1990:95)
別 名：*鮎魚，鯷魚，怪頭魚，黃骨魚，鰱仔，念仔魚*。

捕 食：嗜食各種甲殼類、小魚及青蛙。
分 佈：臺灣(各河川)。

Amblycepidae 鮰科

Liobagrus formosanus Regan 臺灣鮰 (Chen et Yu, 1986, I:3303; Tseng, 1990:97)
別 名：*紅噹仔，黃蜂*。
捕 食：水生昆蟲及其他小型動物。
分 佈：臺灣(大甲溪、大肚溪、濁水溪、日月潭)。

Liobagrus nantoënsis Oshima 南投鮰 (Chen et Yu, 1986, I:302)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(南投)。

Liobagrus reini Hilgendorf 紅鮰 (Chen et Yu, 1986, I:302)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(埔里、基隆)；日本。

Bagridae 鮠科(黃顙魚科)

Leiocassis adiposalis (Oshima) 淡水河鮠 (Chen et Yu, 1986, I:304; Tseng, 1990:99)
別 名：*三角鉤，脂鮠，長鰭鮠，大鰭黃鱨魚，脂鬚子魚*。
捕 食：肉食性，以小魚、蝦和各種水生昆蟲。
分 佈：臺灣(淡水河、宜蘭、大肚溪、曾文溪)。

Leiocassis brevianalis (Regan) 日月潭鮠 (Chen et Yu, 1986, I:304)
別 名：*三角鮎*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(南投、日月潭、臺中)。

Leiocassis crassssilabris crasssilabris Günther 粗唇鮠 (Chen et Yu, 1986, I:304)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(南投、臺中)。

Leiocassis taiwanensis (Oshima) 臺灣鮠 (Chen et Yu, 1986, I:304)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(南投、臺中、新竹)。

Leiocassis truncates Rrgan 截尾鮠 (Chen et Yu, 1986, I:304)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(桃園中壢)。

Pseudobagrus aurantiacus (Temminck et Schlegel) 橙色黃顙魚 (Chen et Yu, 1986, I:304)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(臺北木柵)。

Pseudobagrus tenuis Günther (Chen et Yu, 1986, I:304)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(桃園中壢)。

Saimonidae 鮭科

Oncorhynchus masou (Brevoort) 櫻花鈎吻鮭 (Chen et Yu, 1986, I:307)
捕 食：水生及水面昆蟲。
分 佈：臺灣(大甲溪上游，陸封型)。

Oncorhynchus masou formosanum (Jordan et Oshima) 臺灣鱒 (Tseng, 1990:7)
別 名：*梨山鱒*，*櫻花鈎吻鮭*，*次高山鱒*，*本邦*(bun-bong 泰雅族語)。
捕 食：水生及水面昆蟲。
分 佈：臺灣(大甲溪上游，海拔 1500m 以上溪流)。

Salmo gairdneri Gibbons 紅鱒 (Chen et Yu, 1986, I:307)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(1961 年 1 月自日本引進，已在冷水性地域普遍繁殖成功)。

Salmo mykiss Walbaum 虹鱒 (Tseng, 1990:9)
別 名：*鱒魚*。
捕 食：水生及水面昆蟲。
分 佈：臺灣(1957 年引進養殖)；日本(1877 年引進養殖及放流)、北美洲太平洋沿岸及堪察加半島(原產)。

Plecoglossidae 鰈科

Plecoglossidae altivelis Temminck et Schlegel 鰈 (Chen et Yu, 1986, I:308)
別 名：*山溪魣*，*香魚*；*國姓魚*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(臺北新店溪)；日本。

Exocoetidae 文鰩魚科

Cypselurus starksi Abe 有明文鰩魚 (Chen et Yu, 1986, I:363)
別 名：*飛烏*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(石門、大溪)。

Parexocoetus brachypterus brachypterus (Richardson) 白短翅擬文鰩魚 (Chen et Yu, 1986, I:361)

別 名：*短鰭擬飛魚*；*白翅仔*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(基隆、大溪、花蓮、蘭嶼、澎湖等)。

Oryziatidae 米鱂科

Oryzias latipes (Temminck et Schlegel) 青鱂魚 (Chen et Yu, 1986, I:365; Tseng, 1990:101)

別 名：*青鱂*，*小鱂魚*，*闊尾鱂魚*，*魚目娘*，*稻田魚*。

捕 食：小型無脊椎動物。

分 佈：臺灣(各地池沼、水田中，尚稱普遍)。

Poeciliidae 花鱂魚科(胎生鱂魚科)

Gambusia affinis (Baird et Girard) 食蚊魚 (Chen et Yu, 1986, I:366; Tseng, 1990:103)

別 名：*大肚魚*，*柳條魚*。

捕 食：水面之小型昆蟲，是蚊子幼蟲孑孓的天敵。

分 佈：臺灣(1913 年由夏威夷引進後，大量推廣至全省各地，現已極普遍)；夏威夷、北美、中美、西印度群島(原產)。

Poecilia reticulata Peters 孔雀魚 (Chen et Yu, 1986, I:366)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(以觀賞魚引進，現已在各地水渠中自然繁殖)；中南美洲(原產)。

Synbranchidae 鱔科(鱓科)

Fluta alba Zuiew 鱓魚 (Chen et Yu, 1986, I:407; Tseng, 1990:105)

=*Monopterus xanthognathus* Richardson

=*Monopterus cinereeus* Riichardson

別 名：*黃鱔*，*鱔魚*，*田鰻*，*塭鰻*。

捕 食：肉食性，以昆蟲幼蟲、蝌蚪、小青蛙及小魚。

分 佈：臺灣(各地池沼、河川及水田中)。

Kuhiliidae 湯鯉科

Kuhlia rupestris (Lacépède) 大口湯鯉 (Chen et Yu, 1986, II:487; Tseng, 1990:111)

別 名：*黑尾冬*。

捕 食：水生昆蟲、小魚、小蝦類。

分 佈：臺灣(各地溪流均有，東部地區較普遍)。

Kuhlia marginata (Cuvier et Valenciennes) 湯鯉 (Chen et Yu, 1986, II:487; Tseng, 1990:113)

別 名：*烏尾冬*。
捕 食：水生昆蟲其他小型動物。
分 佈：臺灣(各地近海溪流)。

Cichlidae 慈鯛科

Sarotherodon mossambicus (Peters) 莫三鼻口孵魚 (Chen et Yu, 1986, II:620; Tseng, 1990:119)
Tilapia mossambica Peters
別 名：*吳郭魚，南洋鯽，非洲仔*，在來吳郭魚。
捕 食：雜食性，喜食藻類。
分 佈：臺灣(1946 年經吳振輝及郭哲彰二氏自印尼引進,，未久推廣全省各地,，成爲重要淡水養殖)；原產非洲東岸，現已被引到世界各地養殖。

Sarotherodon niloticus (Linnaeus) 尼羅吳郭魚 (Chen et Yu, 1986, II:620; Tseng, 1990:117; Yu et al., 1989:113-116)
=*Tilapia nilotica* (Linnaeus)
別 名：*尼羅魚，吳郭魚，尼羅口孵魚*。
捕 食：雜食性而較喜草食，尤其絲藻最喜歡，亦能捕食蚊孑孓(稻田養殖)。
分 佈：臺灣(1966 年游祥平及鄧火土二氏自日本引進臺灣)；日本、原產於非洲。

Tilapia aurea Peters 奧利亞吳郭魚 (Chen et Yu, 1986, II:621)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(1974 年經曾文陽、廖一久及黃丁郎三位自以色列引進)；以色列。

Tilapia zillii (Gervais) 吉利吳郭魚 (Chen et Yu, 1986, II:620)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(1963 年唐允安氏自南菲引進)；南菲。

Tilapia sp. 紅色吳郭魚 (Chen et Yu, 1986, II:621)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(可能上述各種的變種)。

Apogonidae 天竺鯛科

Apogon carinatus Cuvier et Valenciennes 單斑天竺鯛 (Chen et Yu, 1986, II:498)
別 名：*斑鰭天竺鯛*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(東港、高雄、澎湖、大溪、基隆)。

Apogon ellioti Day 黑邊天竺鯛 (Chen et Yu, 1986, II:498)
別 名：*黑緣鮸*。
捕 食 性。

分 佈：臺灣(恒春、高雄、澎湖、花蓮、大溪、基隆)。

Apogon fleurieeu (Lacépède) 環尾天竺鯛 (Chen et Yu, 1986, II:498)

=*Apogon aureeus* Day

別 名：*花紋天竺鯛，斑柄天竺鯛，條紋天竺鯛*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(恒春、澎湖、大溪、基隆)。

Apogon kinensis Jordan et Snyder 中線天竺鯛 (Chen et Yu, 1986, II:499)

別 名：*雙帶天竺鯛，雙線天竺鯛*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(恒春、東港、高雄、澎湖、大溪、基隆)。

Apogon nigrippinis Cuvier et Valenciennes 牛眼天竺鯛 (Chen et Yu, 1986, II:498)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(澎湖、大溪)。

Apogon semilineatus Temminck et Schlegel 半線天竺鯛 (Chen et Yu, 1986, II:498)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(高雄、澎湖、大溪、基隆)。

Apogonichthys ocellatuss (Weber) 眼斑正石鮔 (Chen et Yu, 1986, II:497)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(恒春、小琉球、大溪、基隆)。

Archamia lineolata (Cuvieer et Valenciennes) 原長鰭天竺鯛 (Chen et Yu, 1986, II:497)

=*Archamia macropteroides* (Bleeker)

=*Archamia natata* (Day)

別 名：*條長鰭天竺鯛，原天竺鯛*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(東港、高雄、大溪、宜蘭)。

Siphamia gracilis (Bleeker) 箭天竺鯛 (Chen et Yu, 1986, II:497)

Apogonichthyss gracilis Bleeker

捕 食 性。

分 佈：臺灣(臺北大溪)。

Siphamia versicolor (Smith et Radcliffe) 變色管天竺鯛 (Chen et Yu, 1986, II:497)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(臺北大溪)。

Rhyacichthyidae 溪鱧科

Rhyacichthys aspro (Kuhl et van Hasselth) 溪鱧 (Chen et Yu, 1986, II:727; Tseng, 1990:121)

別 名：*粗鱗石貼仔*。

捕 食：以底生的水生昆蟲和其他動物。

分 佈：臺灣(雙溪、高屏溪、花蓮溪、秀姑巒溪、卑南大溪及南部靠海的一些溪流)。

Eleotridae 塘鱧科

Prionobutis kilomattodon (Bleeker) 花錐塘鱧 (Chen et Yu, 1986, II:732)

別 名：*黑鰭，花錐，駝峰魚，鋸塘鱧*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(淡水)。

Oxyeleotris marmorata (Bleeker) 斑駁尖塘鱧 (Chen et Yu, 1986, II:733)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(1975 年自高棉引入養殖)；東南半島、菲律賓、澳洲、斐濟、薩莫亞等地。

Gobiidae 鰕虎科

Awaous melanocephalus (Bleeker) 厚唇鯊 (Chen et Yu, 1986, II:749; Tseng, 1990:131)

=*Awaous grammepomus* (Bleeker)

=*Awaous melanocephaalus* (Bleeker)

別 名：*眼斑厚唇沙魚，曙首厚唇鯊，狗甘仔*。

捕 食：砂石間之水生昆蟲或其他小動物。

分 佈：臺灣(蘭嶼、東港、宜蘭、臺北等地，各沿海之溪流均有)。

Rhinogobius giurinus (Rutter) 極樂吻鰕虎 (Tseng, 1990:127)

別 名：*狗甘仔*。

捕 食：肉食性，喜食水生昆蟲、小蝦、小魚。

分 佈：臺灣(全省各地溪流及池沼均有)。

Channidae 鱧科

Channa argus (Cantor) 黑鱧 (Chen et Yu, 1986, II:788)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(北部河川中)。

Channa asiatica Linnaeus 七星鱧 (Chen et Yu, 1986, II:788; Tseng, 1990:107)

=*Channa formosana* Jordan et Everm.

別 名：*七星烏魚，生斑魚，鮎鮰，月鱧；鮎魠*。

捕 食：兇猛的肉食魚類，以魚蝦及其他小動物爲食。

分 佈：臺灣(宜蘭、臺北以南至臺南以北，曾文溪以南及花蓮、臺東各地無記錄。

Channa gachua (Hamilton-Buchanan) 寬頭鱧 (Chen et Yu, 1986, II:788)
=*Ophiocephalus orientalis* Bl. Et Schn.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Channa maculates (Lacépède) 鱧 (Chen et Yu, 1986, II:788)
=*Ophiocephalus taddianus* Jor. et Everm.
別 名：*雷魚，草鱧，月鱧，七星烏魚；鯸魚，雷鱧*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(臺中、桃園、臺北、宜蘭)。

Anabantidae 鬥魚科

Anabas scanden (Daldorf) 攀木魚 (Chen et Yu, 1986, II:790)
別 名：*攀鱸*。
捕 食 性。
分 佈：海南、華南、華中。

Macropodus chinensis (Bloch) 圓尾鬥魚 (Chen et Yu, 1986, II:791)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Macropodus viridiauratus Lacépède 鬥魚 (Chen et Yu, 1986, II:790; Tseng, 1990:133)
=*Polyacanthus opercularis* (Linnaeus)
=*Macropodus filmentosus* Oshima
別 名：*三斑，臺灣鬥魚，蓋斑鬥魚，老梳火，菩薩魚，蝶魚，錢爿魚*。
捕 食：浮游動物、昆蟲幼蟲，具有控制孑孓及其他有害昆蟲幼蟲的功能。
分 佈：臺灣(廣佈各地之平原區)、福建。

AMPHIBIA 兩棲綱
(Chen et Yu, 1984, III:40-53; Cheng, 1981, 8(1):26)

ANURA 無尾目

Discoglossidae 盤舌蟾科

Bombina orientalis (Boulenger) 東方鈴蟾 (Zou, 1983:117)
捕 食：蟻、小甲蟲、鱗翅目幼蟲。
分 佈：江蘇。

Bufonidae 蟾蜍科
(Shi, 1980[ed.]:130-131)

Bufo andrewsi Schmidt 華西蟾蜍 (He, et al., 1991:144)
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：廣西、雲南、貴州、四川、湖北、河南、陝西。

Bufo bufo asiatics (Steindachner) 亞洲蟾蜍 (Chen, 1969(2):29)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Bufo bufo japonicus (Schlegel) 日本蟾蜍 (Chen, 1969(2):29)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Bufo bufo gargarizans Cantor 中華大蟾蜍 (An et Liu, 1995, 21(4):39; Cai, 1981:129; Chen, 1969(2):29; Chen et Yu, 1984, III:42; Chen et al., 1993:164; He, et al., 1991:144; Lü, 1990:3; Shu et Yu, 1985:93; Zhang et Li, 1982:228; Zong et al., 1984:249Zou, 1983:117)
=*Bufo bufo astiaticus* (Steindachner)
=*Bufo bufo japonicus* Schhlegel
=*Bufo bufo bankorensis* Barbour
別 名：*癩哈蟆，氣蚧，大蟾蜍，盤谷蟾蜍*。
捕 食：*Odontotermes formosanus* Shiraki 黑翅土白蟻
蝗蟲
螻蛄
蛗
螟蟲
Hyphantia cunea (Drury) 美國白蛾(幼蟲)。
分 佈：臺灣(低海拔至中海拔的山區)、福建(武夷山)、浙江、江蘇、上海、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、天津、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；除廣東、廣西、雲南、寧夏未見報道外，中國其餘省區也有分佈。

Bufo melanostictus Schneider 黑眶蟾蜍 (Cai, 1981:129; Chen, 1969(2):29; Chen et Yu, 1984, III:42; He, et al., 1991:144; Huang et al., 1982:92; Lu, 1990:4; You et al., 1987:197-204)
別 名：*癩哈蟆，蝦蟆*。
捕 食：蝗蟲
蛗
葉蟬
蛾類。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江。

Bufo raddei Strauch 花背蟾蜍 (He, et al., 1991:144; Zou, 1983:117)
捕 食：蝗蟲
螻蛄
蛗

小地老虎
蟻
小蜂
蜘蛛。
分 佈：陝西、山東、山西、江蘇、河北、青海、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Bufo viridis (Laurenti) 綠蟾蜍(Li, 1993, 19(2):7-9)
捕 食：蚜蟲
甲蟲類
Helicoverpa armigera (Hübner) 棉鈴蟲
粘蟲
地老虎
蠅蛆
其他。
分 佈：新疆。

Pelobatidae 鋤足蟾科

Carpophrys pelodytoides (Boulenger) 鳖掌突蟾 (Cai, 1981:129)
捕 食 性。
分 佈：福建(建陽、崇安)。

Leptolalax liui Fei et Ye 福建掌突蟾 (Fei et Ye, 1992:249)
Leptolalax liui Fei et Ye1992:249-251.
捕 食 性。
分 佈：福建(崇安)。

Leptolalax omeimontis (Liu) 峨嵋掌突蟾 (Fei et Ye, 1992:248; Huang et Fei, 1981:211)
Megophrys omeimontis Liu, 1950:
Leptolalax omeimontis, Fei et Ye, 1992:245.
別 名：*峨嵋角蟾*。
捕 食 性。
分 佈：四川(峨嵋山)。

Leptolalax pelodytoides (Boulenger) 鳖掌突蟾 (Fei et Ye, 1992:245)
Leptobrachium pelodytoides Boulenger, 1893:
Leptolalax pelodytoides, Fei et Ye, 1992:245.
捕 食 性。
分 佈：湖南、廣西、雲南(勐養)、貴州、浙江。

Leptolalax pachyproctus (Huang) 凸肛角蟾 (Huang et Fei, 1981:211)
Megophrys pachyproctus Huang, 1981:211-212.

捕 食 性。
分 佈：西藏(墨脫)。

Megophrys boettgeri (Boulenger) 淡肩角蟾 (Cai, 1981:129)
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山)。

Megophrys kuatunensis Pope 挂墩角蟾 (Cai, 1981:129)
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山)。

Oreolalax jingdongensis Ma, Yang et Li 景東齒蟾 (Yang, et al., 1983:323)
Oreolalax jingdongensis Ma, Yang et Li, 1983:323-324.
捕 食 性。
分 佈：雲南(景東哀牢山)。

Oreolalax liangbeiensis Liu et Fei 涼北齒蟾 (Liu et al., 1979:83)
Oreolalax liangbeiensis Liu et Fei, 1979:83-84.
捕 食 性。
分 佈：四川(越西)。

Oreolalax lichuanensis Hu et Fei 利川齒蟾 (Liu et al., 1979:86)
Oreolalax lichuanensis Hu et Fei, 1979:86-87.
捕 食 性。
分 佈：湖北(利川)。

Oreolalax puxiongensis Liu et Fei 普雄齒蟾 (Liu et al., 1979:84)
Oreolalax puxiongensis Liu et Fei, 1979:84-86.
捕 食 性。
分 佈：四川(越西)。

Oreolalax rhodostigmatus Hu et Fei 紅點齒蟾 (Liu et al., 1979:87)
Oreolalax rhodostigmatus Hu et Fei, 1979:87-89.
捕 食 性。
分 佈：四川、貴州、湖北。

Scutiger (s. str.) **boulengeri** 西藏齒突蟾 (Ye et Fei, 1993:443-446)
Scutiger (s. str.) *boulengeri*
捕 食 性。
分 佈：西藏、四川、青海。

Scutiger (A.) **brevipes** 胸腺貓眼蟾 (Ye et Fei, 1993:443-446)
Scutiger (*A.*) *brevipes*

捕 食 性。
分 佈：雲南、四川。

Scutiger gongshanensis Yang et al. 貢山短齒蟾 (Yang et al., 1979:185)
Scutiger gongshanensis Yang et al., 1979:185-186.
捕 食 性。
分 佈：雲南(貢山)。

Scutiger (A.) mammatus 刺胸貓眼蟾 (Ye et Fei, 1993:443-446)
Scutiger (A.)mammatus
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏、四川。

Scutiger (A.) muliensis 木里貓眼蟾 (Ye et Fei, 1993:443-446)
Scutiger (A.) muliensis
捕 食 性。
分 佈：四川。

Scutiger tuberculatus Liu et Fei 圓疣齒突蟾 (Liu et al., 1979:89)
Scutiger tuberculatus Liu et Fei, 1979:89-90.
捕 食 性。
分 佈：四川(越西、西昌)。

Vibrissaphora ailaonica Yang, Chen et Ma 哀牢髭蟾 (Yang et al., 1983:325)
Vibrissaphora ailaonica Yang, Chen et Ma, 1983:325-326.
捕 食 性。
分 佈：雲南(景東哀牢山)。

Vibrissaphora leishanensis Liu et Hu 雷山髭蟾 (Fei et al., 1985, 2(3/4):189-198)
捕 食 性。
分 佈：貴州。

Vibrissaphora liui Pope 崇安髭蟾 (Cai, 1981:129)
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山)。

Hylidae 雨蟾科(雨蛙科)

(Shi, 1980[ed.]:130-131)

Hyla annecatans (Jerdon) 華西雨蛙 (He, et al., 1991:144)
捕 食：稻葉蟬
　　　稻飛蝨。
分 佈：湖南、廣西、雲南、貴州、四川。

Hyla arborea immaculata (Boettger) 無斑雨蛙 (He, et al., 1991:144; Zou, 1983:117)

棲 息：農作物(水稻、棉花、玉米、山芋、豆角等)。

捕 食：稻飛蝨
稻葉蟬
蝽
金龜
象甲
稻螟
棉鈴蟲
蟻。

分 佈：福建、江西、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Hyla chinensis Guenther 中國雨蛙 (Cai, 1981:130; Chen et Yu, 1984, III:43; He, et al., 1991:144; Huang et al., 1982:93; Lu, 1990:5; Xiao et al., 1991:121; Zou, 1983:117)

Hyla sinensis Günther

別 名：*中國樹蟾*、*雨怪*、*青蚼*。

棲 息：路旁近水小樹上。

捕 食：蚱蜢
蟋蟀
稻葉蟬
稻飛蝨
蝽
金龜
甲蟲
蚊、蠅
螟蟲
棉鈴蟲
紅鈴蟲
粘蟲
Trichiocampus cannabis Xiao et Huang 大麻毛怪葉蜂
蟻
蜘蛛。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、浙江、江蘇、上海、湖北、河南。

Hyla sanchiangensis Pope 三港雨蛙 (Cai, 1981:130; He, et al., 1991:145)

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：福建(武夷山)、浙江。

Hyla zhaopingensis Tang et Zhang 昭平雨蛙 (Tang et Zhang, 1984:441)

Hyla zhaopingensis Tang et Zhang, 1984:441-443.
棲 息：芭蕉樹上。
捕 食 性。
分 佈：廣西(昭平)。

? Hyla sp. 蛙 (Tu et al., 1962:159)
棲 息：黃麻葉間。
捕 食：*Tirideta sabulifera* Guenée　黃麻擬尺蠖。
分 佈：臺灣。

Raniidae 蛙科(赤蛙科)

(Shi, 1980[ed.]:130-131)

Amolops rickeffi (Boulerger) 華南湍蛙 (He, et al., 1991:145)
Saurois rickeffi Boulerger
捕 食：螻蛄。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、湖北。

Amolops wuyiensis (Liu et Hu) 武夷湍蛙 (He, et al., 1991:145)
Staurois wuyiensis Liu et Hu
捕 食：螻蛄。
分 佈：福建、浙江、安徽。

Limnonectes fujianenensis Ye et Fei 福建大頭蛙 (Ye et Fei, 1994:494)
Limnonectes fujianensis Ye et Fei, 1994:494-498.
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、湖南、浙江。

Limnonectes kuhli (Dumeril et Bibron) 大頭蛙 (Chen, 1969(2):36; Ye et Fei, 1994:494-495)
Rana kuhli Dumeril et Bibron, 1841:
別 名：*古氏赤蛙*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Ooeidozyga lima (Gravenhorst) 尖舌浮蛙 (Huang et al., 1982:91)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Rana adenopleura Boulenger 彈琴蛙 (Cai, 1981:130; Chen, 1969(2):36; Chen et Yu, 1984, III:47; He, et al., 1991:145; Huang et al., 1982:92; Lu, 1990:18; Zhang et Li, 1982:228)
別 名：*腹斑蛙*。
捕 食：*Odontotermes formosanus* Shiraki　黑翅土白蟻
(稻田)。

分 佈：臺灣、福建(南靖、武夷山)、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇。

Rana cancrivora Gravenhorst 華南虎皮蛙 (Chen, 1969(2):36)

捕 食 性。

分 佈；臺灣、華南。

Rana catesbeiana Shaw 美國大牛蛙 (Lu, 1990:19; Shandong, 1966, 8(3):137-141)

捕 食：各類昆蟲。

分 佈：臺灣(原產美國東部及南部，引進臺灣養殖所逃逸野外者)。

Rana chevronta Ye 峰斑蛙 (Ye, 1981:334)

Rana chevronta Ye, 1981:334-336.

捕 食 性。

分 佈：四川(峨嵋山)。

Rana conaensis Fei et Huang 錯那棘蛙 (Huang et Fei, 1981:212)

Rana conaensis Fei et Huang, 1981:212-214.

捕 食 性。

分 佈：西藏(錯那)。

Rana exilispinosa Liu et Hu 小棘蛙 (Cai, 1981:130)

捕 食 性。

分 佈：福建(武夷山)。

Rana güentheri Boulenger 沼蛙 (Cai, 1981:130; Chen, 1969(2):37; Chen et Yu, 1984, III:48; He, et al., 1991:145; Huang et al., 1982:92; Lu, 1990:20)

別 名：*貢德氏蛙，水狗*。

捕 食：稻飛蝨

稻葉蟬

螟蟲。

分 佈：臺灣、福建(南靖、武夷山)、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北。

Rana huanrenensis Liu et Zhang 桓仁林蛙 (Liu et Zhang, 1993:493)

Rana huanrenensis Liu et Zhang, 1993:493-496.

捕 食 性。

分 佈：遼寧。

Rana ijimae (Stejneger) 飯島氏蛙 (Chen, 1969(2):36)

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Rana japonica chaochiaoensis Liu 日本林蛙(昭覺亞種) (He, et al., 1991:145)

捕 食：稻飛蝨

稻葉蟬。

分 佈：雲南、貴州、四川。

Rana japonica japonica Güenther 日本林蛙(指名亞種) (Cai, 1981:130; Chen, 1969(2):37; He, et al., 1991:145; Huang et al., 1982:93; Zhang et Li, 1982:228; Zhao et al., 1987:213-218; Zou, 1983:118)

別 名：*日本赤蛙*。

捕 食：*Odontotermes formosanus* Shiraki 黑翅土白蟻

稻飛蝨

稻葉蟬

稻螟蟲。

分 佈：臺灣、福建(南靖、武夷山)、江西、湖南、廣東、貴州、四川、浙江、江蘇、湖北、河南。

Rana kuhlii Duméril et Bibron 古氏赤蛙 (Cai, 1981:130; Chen et Yu, 1984, III:47; Huang et al., 1982:92; Lu, 1990:21)

別 名：*大頭蛙*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(低海拔山區、稻田、水塘、山澗)、福建(南靖、武夷山區)。

Rana latouchi Boulenger 闊褶蛙 (Cai, 1981:130; Chen, 1969(2)37; He, et al., 1991:145; Huang et al., 1982:93; Zou, 1983:118)

別 名：*拉都希氏蛙*。

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：臺灣、福建(南靖、武夷山區)、江西、湖南、廣西、浙江、江蘇、安徽。

Rana limnocharis limnocharis Boie 澤蛙 (Cai, 1981:130; Chen, 1969(2):36; Chen et Yu, 1984, III:47; He et Gu, 1990:92; He, et al., 1991:145; Huang et al., 1982:92; Lu, 1990:23; Tu et Zhang, 1985:133-136; Xu et al., 1994, 16(2):90-91, 82; Zhang et Li, 1982: 228; Zong et al., 1984:249; Zou, 1983:117)

別 名：*田蛙*。

捕 食：中華稻蝗

蟋蟀

Odontotermes formosanus Shiraki 黑翅土白蟻

蝽

稻葉蟬

稻飛蝨

稻薊馬

金龜

甲蟲

蚊、蠅

Chilo suppressalis (Walker) 二化螟

Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟

Cnaphalocrocis medinalis (Geunée) 稻縱捲葉螟
棉鈴蟲
紅鈴蟲
Sesamia inferens (Walker) 大螟
Naranga aenescens Moore 稻螟蛉
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲
蜘蛛
蟻。
分 佈：臺灣、福建(南靖、武夷山區)、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、甘肅。

Rana livida (Blyth) 大綠蛙 (Cai, 1981:130; Huang et al., 1982:92)
捕 食 性。
分 佈：福建(南靖、武夷山區)。

Rana longicrus Stejneger 長腳赤蛙 (Chen, 1969(2):37; Chen et Yu, 1984, III:49; Lu, 1990:24)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(低中海拔山區)。

Rana macrodactyla Gunther 長趾蛙 (He, et al., 1991:146)
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：廣東、海南、廣西、雲南。

Rana minimus Ting et Tsai 小山蛙 (Ting et Tsai, 1979:297)
Rana minimus Ting et Tsai, 1979:297-299.
捕 食 性。
分 佈：福建(福清)。

Rana narina Stejneger 尖鼻赤蛙 (Chen, 1969(2):37)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Rana narina swinhoana Boulenger 斯文豪氏蛙 (Chen, 1969(2):36; Chen et Yu, 11984, III:48; Lu, 1990:25)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(低海拔山區森林附近的溪流)。

Rana nigromaculata Hallowell 黑斑蛙 (An et Liu, 1995, 21(4):39; Cai, 1981:130; Chen et Qi, 1982 4(4):30-33; Chen et al., 1993:165; Feng et al., 1991:18; Feng et al., 1994, 10(3):142; He et Gu, 1990:91; He, et al., 1991:146; Wang, 1958, 10(1):35-52; Zhang et Li, 1982:228; Zou, 1983:118)
別 名：*青蛙*。
捕 食：*Oxya chinensis* 中華稻蝗

蟋蟀
螻蛄
Odontotermes formosanus Shiraki 黑翅土白蟻
蝽
稻飛蝨
稻葉蟬
金龜
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
Hyphantia cunea (Drury) 美國白蛾(幼蟲)
蟻。

分 佈：福建(武夷山區)、湖南、廣東、雲南、貴州、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、天津、青海、甘肅、寧夏、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Rana plancyi Lataste 金線蛙 (Chen, 1969(2):36; Chen et Yu, 1984, III:48; He, et al., 1991:146; Lu, 1990:26; Zou, 1983:118)

捕 食：蝗蟲
稻飛蝨
葉葉蟬
蜘蛛。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、貴州、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、山東、山西、河北、北京。

Rana plancyi fukienensis Pope 金線蛙(福建亞種) (Cai, 1981:130; Huang et al., 1982:93)

捕 食 性。

分 佈：福建(南靖、武夷山區)。

Rana pleuraden Boulonger 滇蛙 (He, et al., 1991:146)

捕 食：稻飛蝨
稻葉蟬。

分 佈：雲南；貴州、四川。

Rana sauteri Boulenger 紹德氏蛙 (Chen, 1969(2):37; Chen et Yu, 11984, III:49; Lu, 1990:27)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(低、中海拔山區，但在海拔 2800m 曾有記錄)。

Rana schmacheri Boettger 花嗅蛙 (Cai, 1981:130; Huang et al., 1982:93; Zou, 1983:118)

捕 食 性。

分 佈：福建(南靖、武夷山區)、浙江、江蘇。

Rana spinosa David 棘胸蛙 (Cai, 1981:130; He, et al., 1991:146; Huang et al., 1982:93; Zou, 1983:118)

棲 息：喜生活在山間溪流中的石塊下及石縫內。

捕 食：竹螟

鱗翅目幼蟲

蜂類

稻田昆蟲。

分 佈：福建(南靖、武夷山區)、江西、湖南、廣東、廣西、浙江、江蘇、安徽、湖北。

Rana taipehensis van Denbuzgh 臺北赤蛙 (Chen, 1969(2):36; Chen et Yu, 1984, III:48; He et al., 1991:146; Huang et al., 1982: 91; Lu, 1990:28)

捕 食：稻飛蝨

稻葉蟬。

分 佈：臺灣(臺北)、福建、廣東、海南、廣西、雲南、貴州。

Rana taiwaniana Otsu 杉林蛙 (Chen et Yu, 11984,III:49)

Rana taiwaniana Otsu, 1973:

捕 食 性。

分 佈：臺灣(阿里山)。

Rana tigrina rugulosa Wiegmann 虎皮蛙 (Chen, 1969(2):36; Chen et Yu, 1984, III:47)

別 名：*水雞，田雞*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Rana tigrina rugulosa Wiegmann 虎紋蛙 (He, et al., 1991:146; Huang et al., 1982:92; Lu, 1990:29; Zou, 1983:118)

別 名：*虎皮蛙*。

捕 食：稻飛蝨

稻葉蟬

稻螟蟲。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北。

Rana versabilis Liu et Hu 竹葉蛙 (Cai, 1981:130)

捕 食 性。

分 佈：福建(武夷山區)。

Rana weiningensis Liu et Yang 威寧蛙 (He, et al., 1991:146)

捕 食：稻飛蝨

稻葉蟬。

分 佈：貴州。

Staurois chungnaensis Pope 崇安湍蛙 (Cai, 1981:130)
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區)。

Staurois daiyunensis Liu et Hu 戴雲湍蛙 (Huang et al., 1982:91)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Staurois ricketti (Boulenger) 華南湍蛙 (Cai, 1981:130)
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區)。

Staurois wuyiensis Liu et Hu 武夷湍蛙 (Cai, 1981:131)
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區)。

Rhacophoridae (Polypedatidae) 樹蛙科

Buergeria japonicus (Hallowell) 日本河鹿樹蛙 (Chen, 1969(2):33; Lu, 1990:6)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Buergeria rubustus (Boulenger) 褐樹蛙 (Chen, 1969(2):33; Lu, 1990:7)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Chirixalus eiffingeri (Boettger) 艾氏樹蛙 (Lu, 1990:8)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(海拔 2000m 以下山區)。

Chirixalus idiootocus (Wang et Kuramoto) 面天樹蛙 (Lu, 1990:9)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(低海拔山區與平地)。

Philautus longchuanensis Yang et al. 隴川小樹蛙 (Yang et al., 1979:186)
Philautus longchuanensis Yang et al., 1979:186.
捕 食 性。
分 佈：雲南(隴川)。

Philautus rhododiscus Liu et Hu 紅吸盤小樹蛙 (Cai, 1981:131)
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區)。

Polypedates eiffingeri Boettger 艾氏河鹿蛙 (Chen et Yu, 11984, III:45)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(2,000m 以下山區，尚稱普遍)。

Polypedates japonicus (Hallowell) 日本河鹿樹蛙 (Chen et Yu, 11984, III:45)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(平地至低海拔山區溪流邊)。

Polypedates megacephalus (Gravenhorst) 白頷樹蛙 (Lu, 1990:10)
別 名：*大頭蛙*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(較低海拔地區)。

Rhacophorus chenfui Liu 經甫樹蛙 (Cai, 1981:131)
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區)。

Rhacophorus dennysi Blanford 大樹蛙 (Cai, 1981:131; He et al., 1991:146; Huang et al., 1982:93)
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：福建(南靖、武夷山區)、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、安徽。

Rhacophorus leucomystax (Gravenhorst) 斑腿樹蛙 (Cai, 1981:131; Chen et Yu, 1984, III:44; He et al., 1991:146; Huang et al., 1982:92; Zou, 1983:118)
別 名：*白頷樹蛙*。
捕 食：稻田害蟲。
分 佈：臺灣、福建(南靖、武夷山區)、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、西藏、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、甘肅。

Rhacophorus leucomystax sexvirgata (Reinwardt) 條紋白頷樹蛙 (Chen, 1969(2):33; Chen et Yu, 1984, III:45)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Rhacophous leucomystax megacephalus Hallowell (Chen et Yu, 11984, III:45)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Rhacophorus leucomystax var. **sexvirgata** Boulenger (Chen et Yu, 11984, III:45)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Rhacophorus moltrechti Boulenger 莫氏樹蛙 (Chen, 1969(2):32; Chen et Yu, 1984, III:44; Lu, 1990:11)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(特有種，中低海拔山區，以北部較多)。

Rhacophorus mutus Smith 無聲囊樹蛙 (He, et al., 1991:147)
捕 食 性。
分 佈：貴州。

Rhacophorus robustus Boulenger 褐樹蛙 (Chen et Yu, 11984, III:44)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(低海拔山區溪流邊)。

Rhacophorus schlegelii schlegelii (Günther) 薛氏樹蛙 (Chen, 1969(2):32)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Rhacophorus owstoni (Stejneger) 荷氏樹蛙 (Chen, 1969(2):32)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Rhacophorus smaragdinus Lue et Mou 翡翠樹蛙 (Lu, 1990:12)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(特有種，臺北縣翡翠谷和哈盆自然保護區)。

Rhacophorus taipeianus Liang et Wang 臺北樹蛙 (Chen et Yu, 11984, III:45; Lu, 1990:13)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(特有種，臺北、宜蘭平地或山區)。

Rhacophorus viridis (Hallowell) 青樹蛙 (Chen, 1969(2):32)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Microhylidae 狹口蛙科(姬蛙科)

Kaloula borelis (Barbour) 北方狹口蛙 (He et al., 1991:147; Zou, 1983:118)
別 名：*氣哈蟆*。
捕 食：稻飛蝨
　　　稻葉蟬。
分 佈：江蘇、山東、山西、河北、北京、天津、遼寧、吉林。

Microhyla butleri Boulenger 巴氏小雨蛙 (Chen et Yu, 1984, III:50; He et al., 1991:147; Huang et al., 1982::92; Lu,

1990:14)

別 名：*粗皮姬蛙*。

捕 食：多種稻蟲。

分 佈：臺灣(關子嶺)、福建(南靖)、貴州、華南；中南半島、緬甸。

Microhyla heymonsi Vogt 小弧斑姬蛙 (Cai, 1981:131; Chen et Yu, 1984, III:50; He et al., 1991:147; Huang et al., 1982:92; Zou, 1983:118)

捕 食：多種稻蟲。

分 佈：臺灣、福建(南靖、武夷山區)、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽。

Microhyla heymonsi Vogt 希蒙氏姬蛙 (Chen et Yu, 1984, III:50; Lu, 1990:15)

別 名：*小弧斑姬蛙，黑蒙西氏小雨蛙*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(低海拔山區)。

Microhyla inornata Boulenger 史丹吉氏小雨蛙 (Chen et Yu, 1984, III:51; Lu, 1990:16)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(關子嶺、恒春半島)；高棉、馬來、蘇門答臘。

Microhyla ornata (Dumeril et Babron) 小姬雨蛙 (Cai, 1981:131; Chen, 1969(2)37; Chen et Yu, 1984, III:51; He et Gu, 1990:91; He, et al., 1991:147; Huang et al., 1982:92; Lu, 1990:17; Zhang et Li, 1982:228; Zou, 1983:118)

=*Microhyla stejnegeri* Boulenger

=*Microhyla fissipes* Boulenger

別 名：*飾紋姬蛙，小雨蛙*。

捕 食：*Odontotermes formosanus* Shiraki 黑翅土白蟻

稻飛蝨

稻葉蟬

稻螟蟲。

分 佈：臺灣、福建(武夷山區)、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、山西。

Microhyla pulchra (Hallowell) 花姬蛙 (He, et al., 1991:147; Huang et al., 1982:92)

捕 食 性。

分 佈：福建(南靖)、湖南、廣東、海南、廣西、貴州。

CAUDATA 有尾目

SALAMANDRIFORMES 蠑螈目

Cryptobranchidae 隱鰓鯢科

Megalobatrachus davidianus (Blanchard) 大鯢 (Zou, 1983:117)

棲 息：山溪或江河中。
捕 食：水生昆蟲等。
分 佈：浙江、江蘇。

Hynobiidae 小鯢科(山椒魚科)

Batrachyperus cochranae Liu 弱唇褶山溪鯢 (Fei et al., 1983:212)
Batrachyperus cochranae Liu, 1983:102.
捕 食 性。
分 佈：四川(寶興)。

Batrachyperus karlsehmidti Liu 無角鞘山溪鯢 (Fei et al., 1983:212)
Batrachyperus karlsehmidti Liu, 1950:90.
捕 食 性。
分 佈：四川(爐霍)。

Batrachyperus longdongensis Fei et al. 龍洞山溪鯢 (Fei et al., 1983:210)
Batrachyperus longdongensis Fei et al., 1983:210-211.
捕 食 性。
分 佈：四川(峨嵋山龍洞河)。

Batrachyperus pinchonii David 山溪鯢 (Fei et al., 1983:212; Ye et Fei, 1993:443-446)
Batrachyperus pinchonii David, 1871:
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川(寶興)。

Batrachyperus tibetanus Schmidt 西藏山溪鯢 (Fei et al., 1983:212; Ye et Fei, 1993:443-446)
Batrachyperus tibetanus Schmidt, 1925:
捕 食 性。
分 佈：西藏、四川(平武)、甘肅(文縣、徽縣)。

Batrachyperus yenyuanensis Liu 鹽源山溪鯢 (Liu, 1950:101)
Batrachyperus yenyuanensis Liu, 1950:101.
捕 食 性。
分 佈：四川(鹽源)。

Hynobius chinensis Guenther 中國小鯢 (Cai, 1981:129)
捕 食 性。
分 佈：福建(挂墩)。

Hynobius flavomaculatus Fei et Ye 黃斑小鯢 (Fei et Ye, 1982:225)
Hynobius flavomaculatus Fei et Ye, 1982:225-227.
捕 食：昆蟲、其他小動物、蝦類。

分 佈：湖北(利川縣寒池)。

Hynobius formosanus (Maki) 臺灣山椒魚 (Chen, 1969(2):40; Chen et Yu, 1984, III:53)

=*Hynobius arisaneensis* Maki
捕 食 性。
分 佈：臺灣(海拔 2000m. 處)。

Hynobius sonani (Maki) 楚南氏山椒魚 (Chen, 1969(2):40; Chen et Yu, 1984, III:53)

捕 食 性。
分 佈：臺灣(玉山、雪山附近 3000m. 海拔處)。

Salamandridae 蠑螈科

Cynops orientalis (David) 東方蠑螈 (Zou, 1983:117)

棲 息：清冷靜水池沼內。
捕 食 性。
分 佈：浙江、江蘇。

Pachytriton brevipes brevipes (Sauvage) 肥螈(指名亞種)(Cai, 1981:129; Huang et al., 1982:93)

捕 食 性。
分 佈：福建(南靖、建陽、光澤、崇安)。

SALIENTIA 無尾目

LACERTILIA 蜥蜴目

(Cheng, 1981, 8(1):26)

Gekkonidae 壁虎科(守宮科)

Cosymbotus platyurus (Schneider) 蜥虎 (Chen, 1969(2):94; Chen et Yu, 1984, III:99)

別 名：*翼蝘蜓*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(新竹、臺北、基隆、宜蘭)。

Gehyra mutilata (Wiegmann) 裂足蝎虎 (Chen et Yu, 1984, III:99; Lu, 1990:30)

捕 食 性。
分 佈：臺灣(陽明山、花蓮市、紅葉溫泉三處)；原產印度洋及菲律賓各島嶼。

Gehyra variegata ogasawarassimae Okada 琉球裂足蝎虎 (Chen et Yu, 1984, III:99)

捕 食 性。
分 佈：臺灣(綠島)。

Gekko auriverrucosus Zhou et Liu 耳疣壁虎 (Zhou et al., 1982:438)

Gekko auriverrucosus Zhou et Liu, 1982:438-440.

棲 息：墻上高而有燈光處伺食。

捕 食 性。

分 佈：山西。

Gekko gecko (Linnaeus) 大壁虎 (Chen, 1969(2):94; Chen et Yu, 1984, III:99; Lin et Cheng, 1990:24-26; Lu, 1990:31)

別 名：*蛤蚧，大守宮*。

Gekko gecko (Linnaeus, 1758):205.

=*Gekko verticillatus* (Laurenti,)

棲 息：天然樹林叢中。

捕 食：昆蟲類為主，偶食幼鼠等小脊動物。

分 佈：臺灣(東部、南部山區特產，臺北偶有採獲)、華南；中南半島、馬來西亞、印度、斯里蘭卡、菲律賓群島、婆羅洲、印尼群島。

Gekko hokouensis Pope 鉛山壁虎 (Lin et Cheng, 1990:21-24; Lu, 1990:32; Zhou et al., 1982:441)

Gekko japonicus hokouensis Pope, 1928:1-2.

Gekko hokouensis, Zhou et al., 1982:441.

別 名：*多疣壁虎，守宮*。

棲 息：建築物內及林地樹幹上。

捕 食：昆蟲類、節肢動物。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、浙江、江蘇、安徽；朝鮮、日本、琉球群島。

Gekko japonicus (Duméril et Bibron) 守宮 (Chen, 1969(2):94; Chen et Yu, 1984, III:99; Zheng et al., 1981:132)

別 名：*壁虎，多疣壁虎*。

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：臺灣(全省)、福建(黃坑)。

Gekko kikuchii Oshima 蘭嶼壁虎 (Chen, 1969(2):94; Chen et Yu, 11984, III:99; Lin et Cheng, 1990:27-28; Lu, **1990:33)**

Gekko kikuchii Oshima, 1912:241-242.

別 名：*菊池氏守宮*。

棲 息：住家附近。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(蘭嶼)。

Gekko liboensis Zhou et Li 荔波壁虎 (Zhou et al., 1982:440)

Gekko liboensis Zhou et Li, 1982:440-441.

棲 息：城關。

捕 食 性。

分 佈：貴州(荔波縣城關)。

Gekko scabridus Liu et Zhou 粗疣壁虎 (Zhou et al., 1982:443)

Gekko scabridus Liu et Zhou, 1982:443-444.

棲 息：墻上有燈光處及暗處均有。

捕 食 性。

分 佈：雲南、貴州、四川。

Gekko subpalmatus Guenther 蹼趾壁虎 (Zheng et al., 1981:132)

捕 食 性。

分 佈：福建(三港)。

Gehyra mutilatus (Wiegmann) 裂足虎(Chen, 1969(2):94; Lin et Cheng, 1990:39-40)

Gehyra mutilatus (Wiegmann, 1834):54.

別 名：*裂足守宮*。

棲 息：有光建築物內。

捕 食：甲蟲及蛾類、室內甜點和發酵物。

分 佈：臺灣、華南；菲律賓、中南半島至澳洲、斯里蘭卡、馬達加斯加、夏威夷群島。

Hemidactylus bowringii (Gray) 蝘蜓 (Chen, 1969(2):94; Chen et Yu, 1984, III:99; Lin et Cheng, 1990:33-35; Huang et al., 1982:91; Lu, 1990:34)

Hemidactylus bowringii (Gray, 1845):156.

別 名：*無疣蝎虎，縱斑蜥虎*。

棲 息：住家內或附近建築物及樹幹上。

捕 食：雜食性，但以昆蟲類爲主。

分 佈：臺灣(但北部較少)、福建、華南、海南；琉球群島、印度。

Hemidactylus frenatus Duméril et Bibron 蝎虎 (Chen, 1969(2):94; Chen et Yu, 1984, III:99; Lin et Cheng, 1990:30-33; Lu, 1990:35)

Hemidactylus frenatus Dumeril et Bibron, 1836:366.

棲 息：建築物內、樹林中樹幹上及大石塊下。

捕 食：昆蟲爲主，超過 80 種以上，屋內利剩菜。

分 佈：臺灣(中南部以至澎湖、蘭嶼、綠島，不見北部)、華南；琉球群島、東南亞至澳洲北部、馬達加斯加、非洲東部、北美南部、中美洲。

Hemidactylus garnotii Dumeril et Bibron 鋸尾蝎虎 (Lu, 1990:36)

Hemidactylus garnotii Dumeril et Bibron

棲 息：中低海拔地區房舍附近。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(稀有種類)。

Hemidactylus garnotii-vietnamensis Ota et Hikida 鋸尾越南蝎虎 (Lin et Cheng, 1990: 36-37)

棲 息：建築物內及樹幹上。

捕 食：昆蟲類。

分 佈：臺灣。

Hemiphyllodactylus typus Bleeker 半葉趾蝎虎 (Lin et Cheng, 1990:41; Lu, 1990:37)

Hemiphyllodactylus typus Bleeker, 1860:327.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：臺灣(恒春半島南仁山)；印尼(蘇門答臘)。

Hemiphyllodactylus yunnanensis dushanensis Zhou et Liu 雲南半葉趾虎(獨山亞種) (Zhou et al., 1981:206)

Hemiphyllodactylus yunnanensis dushanensis Zhou et Liu, 1981:206-207.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：貴州(獨山)。

Hemiphyllodactylus yunnanensis jinpingensis Zhou et Liu 雲南半葉趾虎(金平亞種) (Zhou et al., 1981:204)

Hemiphyllodactylus yunnanensis jinpingensis Zhou et Liu, 1981:204-205.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：廣西、雲南(金平)、貴州。

Hemiphyllodactylus yunnanensis longlingensis Zhou et Liu 雲南半葉趾虎(龍陵亞種) (Zhou et al., 1981:203)

Hemiphyllodactylus yunnanensis longlingensis Zhou et Liu, 1981:203-204.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：雲南(滄源)。

Hemiphyllodactylus yunnanensis yunnanensis (Boulenger) 雲南半葉趾虎 (Zhou et al., 1981:202)

棲 息：
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Lepidodactylus lugubris (Dumeril et Bibron) 鱗趾蝎虎 (Lin et Cheng, 1990:43-44; Lu, 1990:38)

Lepidodactylus lugubris (Dumeril et Bibron, 1836):304.
棲 息：林投樹上。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(南部)；琉球群島。

Lepidodactylus yami Ota 雅美鱗趾蝎虎 (Lin et Cheng, 1990:45; Lu, 1990:39)

Lepidodactylus yami Ota, 1987:164-169.
棲 息：次生林中。
捕 食 性。

分 佈：臺灣(蘭嶼特有種)。

Agamidae 飛蜥科

Draco maculatus (Gray) 斑飛蜥 (Huang et al., 1982:91)

棲 息：
捕 食 性。
分 佈：福建。

Japalura brevipes Gressitt 短肢攀蜥 (Lin et Cheng, 1990:61-62; Lu, 1990:40)

Japalura brevipes Gressitt, 1936:117-122.
棲 息：山區樹林中。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(特有種，中、南部，中、高海拔山區)。

Japalura marki Ota 牧茂攀蜥 (Lin et Cheng, 1990:62-63; Lu, 1990:41)

Japalura marki Ota, 1989:62-63.
棲 息：針葉樹樹幹上(50-300 公分處)。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(特有種，中部山區)。

Japalura mitsukurii formosensis (Liang et Wang) 臺箕作氏攀蜥 (Chen et Yu, 11984, III:100; Lin et Cheng, 1990:59-60)

Japalura mitsukurii formosensis Liang et Wang, 1976:162-169.
棲 息：低海拔(800 公尺以下)的次生林中。
捕 食：甲蟲、蜂、蠅類、蟻及幼蟲。
分 佈：臺灣(中南部，特有亞種)。

Japalura mitsukurii mitsukurii Stejneger 南臺箕作氏攀蜥 (Chen, 1969(2):95; Chen et Yu, 1984, III:100; Lin et Cheng, 1990:60-61; Lu, 1990:42)

Japalura mitsukurii Stejneger, 1898:218.
棲 息：低海拔(1000 公尺以下)雜草蔓生的次生林。
捕 食：昆蟲類。
分 佈：臺灣(特有種，南投和花蓮以南，以及綠島和蘭嶼)。

Japalura swinhonis Günther 斯文豪氏攀蜥 (Chen, 1969(2):95; Chen et Yu, 11984, III:100; Lin et Cheng, 1990:55-57; Lu, 1990:43)

Japalura swinhonis Gunther, 1864:133.
棲 息：樹林中蔓生雜草。
捕 食：昆蟲類、少數陸生節動物。
分 佈：臺灣(中部、臺北、淡水山區)。

Phrynocephalus przewalskii 荒漠沙蜥 (Liu et al., 1992:379)

Phrynocephalus przewalskii

捕 食 性。
分 佈：甘肅(民勤)。

Lacertidae 蜥蜴科

Acanthosaura lepidogaster (Guvier) 麗棘蜥 (Huang et al., 1982:92; Zheng et al., 1981:132)
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區)。

Ateuchosaurus chinensis (Gray) 光蜥 (Huang et al., 1982:91)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Calotes kingdonwardi baponensis Yang et al. 西藏樹蜥(巴坡亞種) (Yang et al., 1979: 186)
Calotes kingdonwardi baponensis Yang et al., 1979:186-187.
棲 息：農耕地周圍的灌木叢中。
捕 食 性。
分 佈：雲南(貢山)。

Calotes versicolor (Dandin) 變色樹蜥 (Liu et al., 1999, 21(3):99)
捕 食：Chondracris rosea rosea (De Geer) 棉蝗(木麻黃)
分 佈：廣東。

Eremias argus argus Petes 麗斑麻蜥 (He, et al., 1991:147; Hu, 1984:139-142; Song, 1985, 2(1):26-28)
捕 食：*Atractomorpha sinensis* Rol. 短額負蝗
Gryllotalpa unispina Saus. 非洲螻蛄
Labidura sp. 黃褐蠷螋
Cicadella viridis (Linnaeus) 大青葉蟬
Nephotettix cincticeps (Uhler) 原黑尾葉蟬
Nephotettix virescens (Distant) 黑尾葉蟬
Laedelphax striatella Fallen 斑飛蝨
Psammotettix striatus (Linnaeus) 條斑葉蟬
Macrosiphum avenae (Fabricius) 麥長管蚜
Schizaphis graminum (Rond.) 麥二叉蚜
Erthesina fullo Thunberg 麻皮蝽
Geocoris sp. 大眼蟬長蝽
Eretes sticticus (Linnaeus) 灰龍蝨
Pleonomus canaliculatus Fald. 溝金針蟲
Aphodius sublimbatus Motschulsky 黃邊蜉金龜
Holotrichia formosan Moser. 擬毛黃鰓金龜
Maladera orientalis (Motschulsky) 黑絨鰓金龜
Maladera ovatula (Fairmaire) 小闊頸鰓金龜

Maladera vericollis (Fairmaire) 闊頸鰓金龜
Popillia atrocoerulea Botes 琉璃麗金龜
Monolepta nigrobilineata Motschulsky 二條葉甲
Linda sp. 天牛
Echinocnemus squameus Bill. 稻象甲
Sympiezomias velatus Chev. 大灰象甲
Opatrum subaratum Fald. 網目擬地甲
Anopheles sp. 按蚊
Epistrophe balteata De Geer 黑帶食蚜蠅
Syrphus collolae Fabricius 大灰食蚜蠅
Chrysoperla carnea carnea (Stephen) 普通草蛉(中華草蛉)
Brachmia macrosocopa Meyr. 甘薯麥蛾
Chilo venostus (Walker) 高梁條螟
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱卷葉螟
Ascotis selenaria Schif. 大造橋蟲
Scopula caricaria Reut. 花生枝尺蛾
Agrotis ipsilon Rot. 小地老虎
Euxoa segetum (Schif.) 黃地老虎
Helicoverpa armegera (Hübner) 棉鈴蟲
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
Mythimna loreyi (Duponchel) 勞氏粘蟲
Clubiona japonicola B. et S. 棕管巢蛛
Misumena tricuspidata (Fabricius) 三突花蛛
Lycosa pseudoannulata B. et S. 擬環狼蛛
Rana limnocharis Boie. 澤蛙。

分 佈：廣東、江蘇、安徽、河南、陝西、山東、山西、河北南部、青海、甘肅、寧夏、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Eremias argus barbouri 麗斑麻蜥(北方亞種) (Song, 1985, 2(1):26)

捕 食 性。

分 佈：陝西、山西、河北北部、甘肅、寧夏、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Eremias multiocellata 密點麻蜥 (Liu et al., 1992:379)

Eremias multiocellata

捕 食 性。

分 佈：甘肅(民勤)。

Eremias przewalskii 荒漠麻蜥 (Liu et al., 1992:379)

Eremias przewalskii

捕 食 性。

分 佈：甘肅(民勤)。

Eremias vermiculata 蟲痲蜥 (Liu et al., 1992:379)

Eremias vermiculata

捕 食 性。

分 佈：甘肅(民勤)。

Leiolepis belliana rnbritaeniata Mertens 蠟皮蜥 (Liu et al., 1999, 21(3):99)

捕 食：棉蝗(木痲黃)。

分 佈：廣東。

Lygosoma maculatum (Blyth) 斑蝘蜓 (Huang et al., 1982:92)

捕 食 性。

分 佈：福建。

Ophisaurus harti Boulenger 脆蛇蜥 (Zheng et al., 1981:133)

捕 食 性。

分 佈：福建(武夷山區)。

Platyplacopus kuehnei (Van Denburgh) 臺灣地蜥 (Chen et Yu, 1984, III:102; Lin et Cheng, 1990:87-88; Lu, 1990:44)

Platyplacopus kuehnei (Van Denburgh, 1909):50.

別 名：*古納氏蛇舅母*。

棲 息：低海拔樹林中。

捕 食：昆蟲類。

分 佈：臺灣、海南、廣東北部。

Ptyctolaemus gularis Peters 喉褶蜥 (Huang, 1980:336)

Ptyctolaemus gularis Peters

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：西藏(墨脫)；印度(阿薩姆)。

Sphenomarphus indicus (Gray) 銅石龍子 (Zhang et Li, 1982:228)

捕 食：*Odontotermes formosanus* Shiraki 黑翅土白蟻(工兵蟻)。

分 佈：浙江。

Takydromus formosanus Boulenger 臺灣草蜥 (Chen, 1969(2):96; Chen et Yu, 1984, III:102; Lin et Cheng, 1990:80-82; Lu, 1990:45)

Takydromus formosanus Boulenger, 1894:462.

別 名：*臺灣蛇舅母*。

棲 息：次生林緣地及草原。

捕 食：昆蟲類。

分 佈：臺灣(特有種，1200 公尺以下丘陵地)。

Takydromus hsuehshanensis Lin et Cheng 雪山草蜥 (Chen et Yu, 1984, III:102; Lin et Cheng, 1990:85-86; Lu, 1990:46)

Takydromus hsuehshanensis Lin et Cheng, 1981:43-47.

棲 息：草原、礫石地。

捕 食：昆蟲類。

分 佈：臺灣中央山脈(2,400-2,950m 的小雪山、大禹嶺、合歡山)(特有種)。

Takydromus kuehnei (van Denburgh) 古納氏蛇舅母 (Chen, 1969(2):96)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Takydromus sauteri Van Denburgh 南臺草蜥 (Chen, 1969(2):96; Chen eet Yu, 11984, III:102; Lin et Cheng, 1990:83-84; Lu, 1990:47)

Takydromus sauteri Van Denburgh, 1909:50.

別 名：*梭德氏蛇舅母*。

棲 息：樹林、草原。

捕 食：昆蟲類。

分 佈：臺灣(特有種，南部包括蘭嶼)。

Takydromus septentrionalis (Günther) 蛇舅母 (Chen, 1969(2):96; Ji et al., 1994:207-210; Zheng et al., 1981:132)

別 名：*草蜥，北草蜥*。

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建(武夷山區)、浙江(舟山)。

Takydromus sexlineatus meridionalis Guenther 南草蜥 (Huang et al., 1982:92; Zheng et al., 1981:133)

捕 食 性。

分 佈：福建(南靖、武夷山區)。

Takydromus stejnegeri Van Denburgh 蓬萊草蜥 (Chen et Yu, 1984, III:1102; Lin et Cheng, 1990:78-80; Lu, 1990:48)

Takydromus stejnegeri Van Denburgh, 1912:243-245.

別 名：*蛇舅母*。

棲 息：旱田、草地、花圃、樹林中。

捕 食：蚱蜢、甲蟲、鼠婦等。

分 佈：臺灣(特有種，平地至 500 公尺以下丘陵地，小琉球及澎湖島)

Takydromus wolteri Pischer 白條草蜥 (Zheng et al., 1981:133)

捕 食 性。

分 佈：福建(武夷山區)。

Scincidae 石龍子科

Dasia smaragdinum (Lesson) 臺灣姬蜥蜴 (Chen, 1969(2):99; Chen et Yu, 1984, III:105)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Emoia atrocostata (Lesson) 岩岸島蜥 (Chen, 1969(2):98; Chen et Yu, 1984, III:105; Lin et Cheng, 1990:101-103; Lu, 1990:49)

Emoia atrocostata (Lesson, 1830):50.

別 名：*都蜥蜴*。

棲 息：海岸礁石。

捕 食：昆蟲類。

分 佈：臺灣(貓鼻頭、小琉球、蘭嶼)；馬來半島、新加坡、婆羅洲、西里伯島、爪哇、新幾內亞、澳洲北部。

Eumeces barbouri Van Denburgh 巴氏石龍子 (Chen et Yu, 11984, III:105)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：臺灣；琉球。

Eumeces chinensis (Gray) 中國石龍子 (Chen, 1969(2):98; Chen et Yu, 1984, III:105; Lin et Cheng, 1990:111-114; Huang et al., 1982:92; Lu, 1990:50; Zheng et al., 1981:132)

Eumeces chinensis Van Denburgh, 1912:226-227.

別 名：*肚臃*。

棲 息：潮濕性雜草和石礫交錯地區，甘薯田邊、水田邊、水溝邊、溪流邊。

捕 食：昆蟲及其幼蟲。

分 佈：臺灣(600 公尺以下山區)、福建(南靖、武夷山區)、華東、華中、華南、西南。

Eumeces elegans Boulenger 麗紋石龍子 (Chen, 1969(2):98; Chen et Yu, 1984, III:105; Lin et Cheng, 1990:114-117; Lu, 1990:51; Zheng et al., 1981:132)

Eumeces elegans Boulenger, 1887:371.

別 名：*藍尾石龍子*。

棲 息：較乾燥的雜草和石礫地區，常在住宅附近的花圃。

捕 食：昆蟲類。

分 佈：臺灣(海拔 2500m 以下山區及平地，包括澎湖)、福建(南靖、武夷山區)、長江以南；琉球群島。

Eumeces marginatus (Hallowell) 沖繩石龍子 (Chen, 1969(2):98; Chen et Yu, 1984, III:105)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：臺灣；琉球。

Lamprolepis smaragdina (Lesson) 翠蜥 (Lin et Cheng, 1990:121-122)

Lamprolepis smaragdina (Lesson, 1830):43.

棲 息：熱帶雨林中的樹幹。

捕 食：昆蟲類。

分 佈：臺灣；菲律賓群、婆羅洲、爪哇、西里伯島、新幾內亞、加羅林島。

Leiolopsima laterale (Say) 臉窗蜥蜴 (Chen, 1969(2):99)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：臺灣(關子嶺)。

Leiolopisma modestum (Guenther) 寧波滑蜥 (Zheng et al., 1981:132)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：福建(武夷山區三港、挂墩)。

Lygosoma boulengeri (Van Denburgh) 股鱗蜓蜥 (Lin et Cheng, 1990:125-126; Zheng et al., 1981:132)

Lygosoma boulengeri Van Denburgh, 1912:6.

棲 息：雜草或雜草石礫地區，常在靠山野地區。

捕 食：昆蟲類。

分 佈：臺灣、福建(大竹嵐)、廣東、海南。

Lygosoma indicum (Gray) 印度蜓蜥 (Lin et Cheng, 1990:127-129; Huang et al., 1982:92)

Lygosoma indicus (Gray)

棲 息：雜草或雜草石礫地區，常在靠山野地區。

捕 食：昆蟲類。

分 佈：臺灣、福建(南靖)、華東、華中、華南、西南；中南半島。

Lygosoma taiwanense Chen et Lue 臺灣蜓蜥 (Lin et Cheng, 1990:129-131)

Lygosoma taiwanense Chen et Lue, 1987:

棲 息：山區石礫、草原、森林邊緣。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(2200 公尺以上山區)。

Mabuya longicaudata (Hallowell) 長尾南蜥 (Chen, 1969(2):98; Chen et Yu, 1984, III:105; :Lin et Cheng, 1990:105-108; Lu, 1990:52)

Mabuya longicaudata (Hallowell)

=*Euprepes* (*Tiliiqua*) *rihstrati* Fischer

別 名：*長尾蜥蜴*。

棲 息：岩石與雜草。

捕 食：蝗蟲、蟋蟀、金龜、昆蟲的幼蟲等。

分 佈：臺灣(南部包括綠島、蘭嶼)、海南、華南；中南半島。

Mabuya laticaudata ruhstrati Fischer (Chen et Yu, 11984, III:105)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Mabuya multicarinata (Gray) 多稜南蜥 (Chen et Yu, 1984, III:105; Lin et Cheng, 1990:109-110; Lu, 1990:53)

Mabuya multicarinata (Gray)

棲 息：樹林邊綠地區。

捕 食：昆蟲類。

分 佈：臺灣(蘭嶼)；菲律賓、婆羅洲。

Mabuya rugifera (Stoliczka) (Chen et Yu, 1984, III:105)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：臺灣(蘭嶼)。

Scincella formosensis (Van Denburgh) 臺灣滑蜥 (Chen et Yu, 1984, III:105; Lin et Cheng, 1990:119-120; Lu, 1990:54)

Scincella formosensis (Van Denburgh)

棲 息：山區樹林中。

捕 食：昆蟲類。

分 佈：臺灣(中南部山區，六龜、關子嶺、溪頭，特有種)。

Sphenomorphus boulengeri van Denburgh 鮑氏蜥蜴 (Chen, 1969(2):98; Chen et Yu, 11984, III:105; Lu, 1990:56)

Sphenomorphus boulengeri van Denburgh

別 名：*鮑氏蜓蜥*。

棲 息：岩石石縫之小坡地、空曠地。

捕 食：地面之蜘蛛、昆蟲類或其他小動物。

分 佈：臺灣(南部，綠島、蘭嶼)。

Sphenomorphus indicus (Gray) 印度蜥蜴 (Chen, 1969(2):98; Chen et Yu, 1984, III:105; Lu, 1990:56)

=*Spenomorphus indicus formosensis*

別 名：*印度蜓蜥*。

棲 息：平原至海拔 1500m 以下山區。

捕 食 性。

分 佈：甚廣，臺灣(較高丘陵地帶)至印度大吉嶺。

Sphenomorphus taiwanensis Cheng et Lue 臺灣蜓蜥 (Lu, 1990:57)

Sphenomorphus taiwanensis Cheng et Lue

棲 息：海拔 2000m 以上高山草原。

捕 食：昆蟲類及其他節肢動物。

分 佈：臺灣(特有種)。

Anguidae 蛇蜥科

Ophisaurus formosensis Kishida 臺灣蛇蜥 (Chen et Yu, 11984, III:106; Lin et Cheng, 1990:149; Lu, 1990:58)

Ophisaurus formosensis Kishida, 1929:
棲 息：有潮濕泥土的原始森林中。
捕 食：昆蟲類。
分 佈：臺灣(臺北，特有種)。

Ophisaurus harti Boulenger 脆蛇蜥 (Chen et Yu, 11984, III:106; Lin et Cheng, 1990:148)

Ophisaurus harti Boulenger,1899:160.
別 名：*蛇蜥*。
棲 息：有潮濕泥土的原始森林中。
捕 食：昆蟲類。
分 佈：臺灣(淡水、宜蘭)、福建、四川、浙江。

REPTILIA 爬行綱

CHELONIA 龜鱉目

(Chen et Yu, 1984:75-77)

Trionychidae 鱉科

Amyda ssinensis (Wiegmann) 鱉 (Chen et Yu, 1984:76)

別 名：*甲魚*。
捕 食：肉食性。
分 佈：臺灣、福建、華南諸省。

Emydidae 澤龜科

Cyclemys flavomarginata (Gray) 食蛇龜 (Chen et Yu, 1984, III:77)

別 名：*黃霊*，*箱龜*。
捕 食：蛇類。
分 佈：臺灣(恒春、花蓮、埔里、八仙山、宜蘭，棲息高山或濕地)。

Geoclemys reevesii (Gray) 金龜 (Chiu et Chou, 1978:369)

別 名：*臭青龜*，*山龜*，*秦龜*，*烏龜*。
捕 食：*Achatina fulica* Bowdich 非洲大蝸牛。
分 佈：臺灣、大陸。

AVES 鳥綱

(Chen et Yu, 1984, III:168-411; :Cheng, 1981, 8(1):25-26; Heilongjing, Mudingjiang FS., 1988[ed.]:131-132; Shi, 1980[ed.]:131; Yue, 1989:191-200)

PODICIPEDIFORMES 鸊鷉目
=COLYMBIFORMES 阿比目

Podicipedidae 鸊鷉科

Podiceps ruficollis poggei (Reichenow) 小鸊鷉 (Chen et Yu, 1984, III:214; Su et al., 1986:38)

別 名：*小葫蘆，王八鴨子、中國鸊鷉，水鸊仔*。
棲 息：各地湖沼、河川地區。
捕 食：小蝦、有翅大螞蟻、螽蟴、水生昆蟲。
分 佈：全國。

Podicepps cristatus cristatus (Linnaeus) 冠鸊鷉 (Chen et Yu, 1984, III:215)

別 名：*幘鸊鷉，鳳頭鸊鷉，浪裏白*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(稀有冬候鳥)；西北及東北各省。

CICONIIFORMES (=GRESSPRES) 鸛形目(鸛鷺目)

Threskiornithidae 朱鷺科

Nipponia nippon (Temminck) 朱鷺 (Chen et Yu, 1984, III:225)

別 名：*日本鳳頭鸛，䴉朱鷺，紅鶴*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(高雄、臺中、淡水、臺北，罕見冬候鳥)、東北；朝鮮、日本。

Platalea leucorodia leucorodia Linnaeus 琵鷺 (Chen et Yu, 1984, III:225)

=*Platalea leucorodia major* Temminck et Schlegel
別 名：*匙嘴鷺，廣嘴鸛，勺嘴*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(淡水、澎湖等地，稀有迷鳥)、我國東南、西北、東北各省；朝鮮。

Platalea minor Temminck et Schlegel 黑面琵鷺 (Chen et Yu, 1984, III:225)

別 名：*小琵鷺，黑琵鷺，黑面勺嘴*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(高雄、臺南、彰化、淡水、宜蘭，稀有冬候鳥)、東北；朝鮮。

Threskiornis aethiopicus melannocephala (Latham) 黑頭白䴉 (Chen et Yu, 1984, III:224)

捕 食 性。
分 佈：臺灣(過境鳥與冬候鳥)、東北各省繁殖。

Ardeidae 鷺科

Ardeola bacchus (Bonaparte) 沼鷺 (Chen et Yu, 1984, III:232)

別 名：*池鷺，中國池鷺，沙鷺，紫鄔頭，赤頭鷺，花窪子*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(稀見迷鳥)、中國大陸全境。

Ardea cinerea rectirostris Gould 蒼鷺 (Chen, 1969(2):160; Chen et Yu, 1984, III:231; Yan et al., 1996:20; Zheng et al., 1981:154)

=*Ardes comerea jouyi* Clark

捕 食 性。

分 佈：臺灣(沿海沙洲、河口、沼澤及水田中，常見冬候鳥及過境鳥)、福建、華南、西南、華東、華中、西北、東北，全國各地。

Ardea purpurea manilensis Meyen 紫鷺 (Chen, 1969(2):160; Chen et Yu, 1984, III:231; Yang et al., 1996:20; Zheng et al., 1981:154)

別 名：*草鷺*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(罕見冬候鳥)、福建、雲南、華南、華北、東北；日本、菲律賓。

Ardeola bacchus (Bonaparte) 沼鷺 (Chen, 1969(2):161; Yan et al., 1996:20; Zheng et al., 1981:154)

別 名：*池鷺*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、華南、西南、華中、華東、華北。

Botaurus stellaris stellaris (Linnaeus) 山家麻鷺 (Chen, 1969(2):161; Chen et Yu, 1984, III:233; Yan et al., 1996:22)

別 名：*麻鳽，麻團，竹雞，大麻鳽，大麻鷺，水駱駝*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(臺南、宜蘭、臺北等地，稀見冬候鳥)、海南、廣西、廣東、福建、長江流域、浙江、江蘇、湖北、華北、西北、東北。

Bubulcus ibis coromandus (Boddaert) 黃鷺 (Chen, 1969(2):161; Chen et Yu, 1984, III:232; Yan et al., 1996:20; Zheng, 1986:257; Zheng et al., 1981:154)

別 名：*牛背鷺，黃毛鷺，猩猩鷺，黃頭鷺，家畜鷺鷥*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(平地常見留鳥)、福建、華南、西南、長江以南各地；菲律賓、日本。

Butorides striatus amurensis (Schrenck) 綠簑鷺 (Chen, 1969(2):161; Chen et Yu, 1984, III:232; Su et al., 1986:38; Yan et al., 1996:20)

別 名：*綠鷺，簑五位，篠鳽，黑龍江綠鷺*。

捕 食：蜻蜓、魚、蝦。

分 佈：臺灣(蘭嶼、澎湖、日月潭、臺北，冬候鳥)、福建、廣東、海南、廣西、雲南、華南、華東、華中、華北、東北。

Butorides striatus carcinophila 綠鷺 (Zheng, 1986:257)

捕 食 性。

分 佈：臺灣；菲律賓。

Butorides striatus connectens 綠鷺 (Zheng et al., 1981:154)

捕 食 性。

分 佈：福建。

Butorides striatus javanicus (Horsfield) 爪哇綠蓑鷺 (Chen, 1969(2):161; Chen et Yu, 11984, III:232)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(尚稱普遍留鳥)、東南及西南各省。

Dupetor flavicollis major Yamashina 黃頸黑鷺 (Chen, 1969(2):161; Chen et Yu, 1984, III:233)

別 名：*黑鳽*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(沿海一帶)、華南各省。

Egretta alba modesta (Gray) 白鷺 (Chen, 1969(2):160; Chen et Yu, 1984, III:231; Yen et al., 1996:18; Zheng, 1981:154)

別 名：*大白鷺*，*東方白鷺*，*中大白鷺*、*風漂公子*，*白窪子*，*春鉏*，*白莊*，*雪客*，*白漂鳥*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(常見冬候鳥與過境鳥)、福建、華東、華南、西北、東北。

Egretta eulophotes (Swinhoe) 唐白鷺 (Chen, 1969(2):160; Chen et Yu, 1984, III:231; Yen et al., 1996:18)

別 名：*黃嘴白鷺*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(見於河口、沙洲及沼澤地帶)、西沙群島、海南、廣東、福建、浙江至東北各省。

Egretta garzetta garzetta (Linnaeus) 么白鷺 (Chen, 1969(2):160; Chen et Yu, 1984, III:232; Yen et al., 1996:18; Zheng, 1986:157; Zheng et al., 1981:154)

別 名：*白鷺*，*小白鷺*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(平地常見樹棲留鳥，亦見於蘭嶼)、福建、西南、華南；菲律賓。

Egretta intermedia intermedia (Wagler) 中白鷺 (Chen, 1969(2):160; Chen et Yu, 1984, III:231; Yen et al., 1996:18; Zheng et al., 1981:154)

別 名：*春鉏*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(見於西部及北部沿岸，尚稱普遍冬候鳥)、福建、海南、華南、長江中下游。

Egretta intermedia palleuca Diegnan (Chen et Yu, 1984, III:231)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、雲南；泰國北部。

Egretta garzetta garzetta 岩鷺 (Zheng, 1986:257)
捕 食 性。
分 佈：華南；菲律賓、日本。

Egretta picata 白頸黑鷺 (Yen et al., 1996:16)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(東港)。

Egretta sacra sacra (Gmelin) 黑鷺 (Chen et Yu, 1984, III:232; Yan et al., 1996:18)
=*Demiegretta sacra ringeri* Stejneger
別 名：*巖鷺，灰鷺，聖潔鷺鷥*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(蘭嶼、屏東、澎湖、臺北，尚稱普遍留鳥)、海南、東南各省。

Gorsachius goisagi (Temminck) 麻鷺 (Chen, 1969(2):161; Chen et Yu, 1984, III:232; Yan et al., 1996:22)
別 名：*栗鳽，溝鷺，夜鷺，栗頭虎斑鷺*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(罕見冬候鳥)、福建、上海；日本(繁殖)。

Gorsachius manificus 海南虎斑鳽 (Yan et al., 1996:22; Zheng et al., 1981:154)
捕 食 性。
分 佈：福建、海南、廣東、廣西、浙江、安徽。

Gorsakius melanolophus melanolaphus (Raffles) 臺灣麻鷺 (Chen, 1969(2):161; Zheng, 1986:258)
別 名：*黑冠虎斑鳽*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(高雄、臺南、嘉義、臺中、臺北，較稀見鳥)、東南及西南省，海南、廣西、雲南；菲律賓、日本。

Ixobrychus cinnamomeus (Gmelin) 栗小鷺 (Chen, 1969(2):161; Chen et Yu, 1984, III:233; Su et al., 1986:39; Yan et al., 1996:24; Zheng, 1986:258)
別 名：*葭鷺，栗葦鷺，獨春，黃莊，小水駱駝*。
捕 食：螻蛄、蝗、黃鱔。
分 佈：臺灣(尚稱普遍留鳥，見於高雄、花蓮、臺中、宜蘭、淡水等地之水田、河口、沼澤地)、福建、廣東、海南、廣西、西南及東南至東北各省。

Ixobrychus eurythmus Swinhoe 秋小鷺 (Chen, 1969(2):161; Chen et Yu, 11984, III:233; Yan et al., 1996:24)

別 名：*秋鳽，紫背葦鳽*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(稀見迷鳥)、海南、華南、西南、長江流域、華東、華中、華北、東北。

Ixobrychus flavicollis 黑鳽 (Yan et al., 1996:24)
別 名：*黃頸黑鷺*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、海南、華南、西南、華東、華中。

Ixobrychus minutus 小葦鳽 (Yan et al., 1996:24)
捕 食 性。
分 佈：新疆西部。

Ixobrychus sinensis sinensis Gmelin 黃小鷺 (Chen, 1969(2):161; Yan et al., 1996:24; Zheng, 1986:258; Zheng et al., 1981:154)
別 名：*葦鳽，黃斑葦鳽，小水駱駝*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(全島及蘭嶼，普遍留鳥)、福建、華南、西南、華東、華中、華北、東北；菲律賓。

Nycticorax nycticorax nycticorax (Linnaeus) 夜鷺 (Chen, 1969(2):160; Chen et Yu, 1984, III:232; Yan et al., 1996:22; Zheng, 1986:257; Zheng et al., 1981:154)
別 名：*五位鷺，夜黑鷺，窪子，灰窪子，黑背鳽*(第一年)，*黑頂夜鷺，夜雁，星鳽，蒼鳽*(長成)。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(普遍留鳥)、福建、廣東、廣西、華南、西南、華東、華中、華北、東北；菲律賓、日本。

Demiegretta sacra ringeri Stejneger 黑鷺 (Chen, 1969(2):160)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Ciconiidae 鸛科

Ciconia boyciana 東方白鸛 (Yan et al., 1996:26)
捕 食 性。
分 佈：福建、湖南、浙江、江蘇、安徽、湖北、山東。

Ciconia ciconia 白鸛 (Yan et al., 1996:26)
捕 食 性。
分 佈：西北、東北。

Ciconia nigra 黑鸛 (Yan et al., 1996:26)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、華南、西南、華東、華中、華北、西北、東北。

Leptoptilos javanicus 禿鸛 (Yan et al., 1996:26)
捕 食 性。
分 佈：海南、西南。

Mycteria leucocephala 彩鸛 (Yan et al., 1996:26)
捕 食 性。
分 佈：西南、華南、江蘇、河北。

Threskiornithidae 䴉科

Nipponia nippon 朱䴉 (Yan et al., 1996:28)
捕 食 性。
分 佈：陝西。

Platalea minor 黑臉琵鷺 (Yan et al., 1996:28)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、海南、廣東、香港、湖南、浙江、江蘇；南韓、日本、北韓(繁殖)。

Platalea leucorodia 白琵鷺 (Yan et al., 1996:28)
捕 食 性。
分 佈：廣東、福建、浙江、江蘇、安徽、東北。

Plegadis falcinellus 彩䴉 (Yan et al., 1996:28)
捕 食 性。
分 佈：廣東、福建、浙江、上海沿海。

Pseudibis darisoni 黑䴉 (Yan et al., 1996:28)
捕 食 性。
分 佈：廣東、雲南。

Threskiorttis melanocephalus 黑頭白䴉 (Yan et al., 1996:28)
捕 食 性。
分 佈：廣東、福建、東北。

ANSERIFORMES 雁形目

Anatidae 雁鴨科

Aix galericulata (Linnaeus) 鴛鴦 (Chen et Yu, 1984, III:242; Yan et al., 1996:36)
別 名：*鴫，匹鳥*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(日月潭、鴛鴦湖等地，稀有留鳥)、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、東北各省；西伯利亞。

Alopochen aegyptiacus 埃及雁 (Yan et al., 1996:34)
捕 食 性。
分 佈：河北(迷鳥)。

Alythya baeri (Radde) 青頭潛鴨 (Chen et Yu, 11984, III:244; Yan et al., 1996:44)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(高雄，偶見迷鳥)、廣東、福建至長江下游、西南(冬候鳥)至華北各省(過境鳥)，東北各省(繁殖)。

Alythya ferina (Linnaeus) 磯鳧 (Chen et Yu, 1984, III:245; Yan et al., 1996:42)
別 名：*磯雁，紅頭潛鴨*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(高雄一帶，罕見冬候鳥)、華南、華東、長江琉域、西南至華北、西北角(冬候鳥)。

Alythya fuligula (Linnaeus) 澤鳧 (Chen et Yu, 1984, III:244; Yan et al., 1996:44)
別 名：*鳳頭鴨，鳳頭潛鴨*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(沿河及內陸湖泊中，常見冬候鳥)、華南、華東至西南、西北、東北各省。

Alythya marila mariloides (Vkgors) 鈴鴨 (Chen et Yu, 1984, III:244; Yan et al., 1996:44)
別 名：*斑背潛鴨，鈴鳧，東方鈴鳧*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(稀見冬候鳥)、廣西、廣東、福建、浙江、江蘇，長江以南下游爲冬候鳥，華北、東北各省。

Alythya nyroca (Güldenstädt) 白眼潛鴨 (Chen et Yu, 1984, III:245; Yan et al., 1996:42)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(高雄，偶見迷鳥)、西藏、新疆、內蒙古等地(繁殖)，長江以南度冬。

Alythya valisineria 帆背潛鴨 (Yan et al., 1996:42)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(迷鳥)。

Anas acuta acuta Linnaeus 針尾鴨 (Chen et Yu, 1984, III:244; Yan et al., 1996:40)

別 名：*尖尾鴨，尾長鳧*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(澄清湖、西部沿岸及河口，常見冬候鳥)、西南、華南、華東、西北，東北。

Anas americana 葡萄胸鴨 (Yan et al., 1996:38)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(迷鳥)。

Anas clypeata Linnaeus 琵琶鴨 (Chen et Yu, 1984, III:2443; Yan et al., 1996:42)
別 名：*琵嘴鴨*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(西部沿岸及大形湖泊中，普遍冬候鳥、華南、華東至西南、西北、內蒙古、東北諸省；西伯利亞。

Anas crecca crecca Linnaeus 小水鴨 (Chen et Yu, 1984, III:244; Yan et al., 1996:40)
別 名：*刁鴨，綠翅鴨，小鳧，小麻鴨*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(常大群集於河口及內陸湖泊中，常見冬鳥)、海南、華南、西南、華北以南、西北、東北各省。

Anas falcata Georgi 羅紋鴨 (Chen et Yu, 11984, III:244; Yan et al., 1996:38)
別 名：*葭鳧*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(澄清湖、澎湖、五股、關渡，偶見冬候鳥)、海南、華南、華東、華北、西北、東北；西伯利亞。

Anas formosa Georgi 巴鴨 (Chen et Yu, 1984, III:244; Yan et al., 1996:38)
別 名：*花臉鴨，花臉鳧，味鳧，眼鏡小鴨，味鴨*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(本島及澎湖，偶見迷鳥)、海南、華南、華東、西北、東北各省。

Anas luzonica 棕頸鴨 (Yan et al., 1996:40)
別 名：*呂宋鴨*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(迷鳥)。

Anas penelope Linnaeus 赤頸鴨 (Chen et Yu, 1984, III:244; Yan et al., 1996:38)
別 名：*細斑黃頂鳧，赤頸鳧，赤胸鳧，丹毛鳧*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(澄清湖、西部沿岸河口等地，尚稱普遍冬候鳥)、海南、西南、華北以

南、東北諸省；西伯利亞。

Anas platyrhynchos platyrhynchos Linnaeus 野鴨 (Chen et Yu, 1984, III:243; Yan et al., 1996:40)

別 名：*名鳧，沈鳧，大麻鴨(♂)，綠頭鴨，大紅腿(♀)，紅腿鴨*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(高雄、臺南、宜蘭、臺北等地，普遍冬候鳥)、西南、華北以南、西北、內蒙古、東北；西伯利亞。

Anas platyrphynchos domesticus Linnaeus 家鴨 (He, et al., 1991:148; Shu et Yu, 1985:93)

捕 食：稻飛虱

稻葉蟬

Hyphantia cunea (Drury) 美國白蛾(幼蟲)

Dicladispa armigera similes (Uhmann) 稻鐵甲

分 佈：臺灣、長江流域以南稻區、遼寧。

Anas poecilorhyncha zonorhycha Swinhoe 花嘴鴨 (Chen et Yu, 1984, III:243; Yan et al., 1996:40)

別 名：*輕鴨，斑嘴鴨，夏鳧*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(臺東、蘭嶼、西部沿岸及河口，普遍冬候鳥)、西南、東南、華北、內蒙古、東北；西伯利亞。

Anas querquedula Linnaeus 白眉鴨 (Chen et Yu, 1984, III:244; Yan et al., 1996:42)

別 名：*巡鳧，灰翼巡鳧*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(沿海及內陸大形泊中，普遍過境鳥)、海南、華南、華東至西南、西北、東北。

Anas strepera Linnaeus 赤膀鴨 (Chen et Yu, 11984, III:244; Yan et al., 1996:38)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(澄清湖、關渡等地，稀見冬候鳥)、西南、華南、華北、西北、內蒙古、東北各省。

Anser albifrons albifrons (Scopoli) 真雁 (Chen et Yu, 1984, III:242; Yan et al., 1996:32)

別 名：*白額雁*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(臺南、澎湖、金山，罕見冬候鳥)、福建、湖南、四川、浙江、江蘇、湖北、華北、東北。

Anser anser 灰雁 (Yan et al., 1996:32)

捕 食 性。

分 佈：華南、西南、華東、華中、華北、西北、東北。

Anser caerulescens 雪雁 (Yan et al., 1996:34)
捕食性。
分佈：江蘇。

Anser cygnoides (Linnaeus) 鴻雁 (Chen et Yu, 1984, III:241; Yan et al., 1996:32)
別名：*酒面雁，原鵝，大雁*。
捕食性。
分佈：臺灣(東港、羅東、宜蘭、臺北，稀見冬候鳥)、廣東、福建、江西、江蘇、安徽、西北、內蒙古、東北。

Anser erythropus (Linnaeus) 弱雁 (Chen et Yu, 1984, III:242; Yan et al., 1996:32)
別名：*小白額雁*。
捕食性。
分佈：臺灣(高雄、羅東、礁溪，稀見冬候鳥)、廣東、福建、江西、湖南、浙江、江蘇、安徽、湖北、華北、東北；西伯利亞、北歐。

Anser fabalis 豆雁 (Yan et al., 1996:32)
捕食性。
分佈：臺灣、海南、福建、江西、湖南、浙江、江蘇、安徽、湖北、新疆(西部)；西伯利亞。

Anser fabalis middendorfi Swinhoe (Chen et Yu, 1984, III:242)
=*Anser fabalis sibiricus* (Alpheraky)
捕食性。
分佈：臺灣。

Anser fabalis serirostris Swinhoe 大雁 (Chen et Yu, 1984, III:242)
別名：*鴻，豆雁*。
捕食性。
分佈：臺灣(臺南、臺北、淡水, 稀見冬候鳥)、內蒙古、東北(至南方越冬)。

Anser indicus 斑頭雁 (Yan et al., 1996:30)
捕食性。
分佈：西部、西北、內蒙古。

Branta bernicla 黑雁 (Yan et al., 1996:34)
捕食性。
分佈：福建、山東、遼寧。

Branta ruficollis 紅胸黑雁 (Yan et al., 1996:34)
捕食性。
分佈：湖南。

Bucephala clangula (Linnaeus) 喜鵲鴨 (Chen et Yu, 11984, III:2245; Yan et al., 1996:46)

別 名：*頰鳧，鵲鴨*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(偶見迷鳥)、福建、江西、湖南、廣西、雲南、西藏、四川、浙江：江蘇、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、西北、遼寧、吉林、黑龍江；西伯利亞。

Clangula hyemalis 長尾鴨 (Yan et al., 1996:46)

捕 食 性。

分 佈：福建、湖南、山東、河北、遼寧。

Cygnus gygnus 大天鵝 (Yan et al., 1996:30)

別 名：*黃嘴天鵝*。

捕 食 性。

分 佈：華東、華中、西北、東北。

Cygnus columbianus 小天鵝 (Yan et al., 1996:30)

別 名：*鵠*。

捕 食 性。

分 佈：廣東、福建、江西、浙江、江蘇、安徽。

Cygnus olor 疣鼻天鵝 (Yan et al., 1996:30)

別 名：*瘤鵠*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、西北。

Dendrocygna javanica (Horsfield) 琉球鴨 (Chen et Yu, 1984, III:242; Yan et al., 1996:30)

別 名：*小嘴鳧，栗樹鴨，東方樹鴨*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(高雄、臺南、嘉義，稀見夏候鳥)、海南、廣西、雲南、廣東、貴州、江西、湖南、浙江、江蘇、安徽、湖北，長江中下游及東南各省。

Histrionicus histrionicus 丑鴨 (Yan et al., 1996:46)

捕 食 性。

分 佈：遼寧、吉林、黑龍江。

Melanitta fusca 斑臉海番鴨 (Yan et al., 1996:46)

捕 食 性。

分 佈：廣東、福建、浙江、江蘇、山東、河北、青海。

Melanitta nigra 黑海番鴨 (Yan et al., 1996:46)

捕 食 性。
分 佈：福建、江蘇。

Mergus albellus Linnaeus 白秋沙鴨 (Chen et Yu, 11984, III:2245; Yan et al., 1996:48)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(偶見迷鳥)、華南沿海、華東至四川帶狀、華北、(冬候鳥或過境鳥)、新疆西角、內蒙古北部、東北北部(繁殖)。

Mergus merganser comatus Salvadori 川秋沙 (Chen et Yu, 1984, III:245
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Mergus merganser orientalis Gould 川秋沙鴨 (Chen et Yu, 1984, III:245; Yan et al., 1996:48)
別 名：*拉他鴨子*，*普通秋沙鴨*，*東方沙鴨*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(迷鳥)、華北以南、西部高原、山東、山西、西北、遼寧、東北各省。

Mergus serrator Linnaeus 紅胸秋沙鴨 (Chen et Yu, 11984, III:245; Yan et al., 1996:48)
別 名：*海秋沙*，*海鴎*，*赤胸秋沙鴨*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(宜蘭，稀見冬候鳥)、廣東、福建、廣西、廣東、浙江、江蘇、山東、河北、西北、遼寧、吉林、黑龍江。

Mergus squamatus 中華秋沙鴨 (Yan et al., 1996:48)
別 名：*唐秋沙*。
捕 食 性。
分 佈：廣東、福建、江西：湖南、四川、青海、江蘇、安徽、山東、遼寧、吉林、黑龍江。

Netta rufina 赤嘴潛鴨 (Yan et al., 1996:44)
捕 食 性。
分 佈：新疆、內蒙古。

Nettapus coromandelianus coromandelianus (Gmelin) 南京鴛鴦 (Chen et Yu, 1984, III:242; Yan et al., 1996:36)
別 名：*棉鳧*，*棉鴨*，*矮小雁*，*梅花小鴨*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(高雄，稀見迷鳥)、長江流域、西南、東南各省。

Oxyura leucocephala 白頭硬尾鴨 (Yan et al., 1996:48)
捕 食 性。
分 佈：湖北(迷鳥)。

Polysticha stelleri 小絨鴨 (Yan et al., 1996:44)
捕 食 性。
分 佈：東北。

Sarkidiornis melanotos 瘤鴨 (Yan et al., 1996:34)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Tadorna cristata 冠麻鴨 (Yan et al., 1996:36)
捕 食 性。
分 佈：黑龍江。

Tadorna ferruginea (Pallas) 瀆鳧 (Chen et Yu, 1984, III:243; Yan et al., 1996:36)
別 名：*赤筑*，*紫鴨*，*黃鳧*，*赤麻鴨*，*黃鴨*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(東港、屏東、秀姑巒溪等地，極稀見迷鳥)、西藏、青海、四川、陝西、黑龍江(夏候鳥)，西北及東北各省，長江以南度冬。

Tadorna tadorna (Linnaeus) 花鳧 (Yan et al., 1996:36)
別 名：*赤鳧*，*潦鳧*、*穴鳧*、*翹鼻麻鴨*，*筑紫鴨*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(高雄、五股、關渡，常冬候鳥)、長江以南度冬、新疆、青海、內蒙古、黑龍江(夏候鳥)，西北及東北諸省；西伯利亞。

FALCONIFORMES 鷹形目

Accipitridae (Aquilidae) 鷲鷹科

Accipiter badius 褐耳鷹 (Yan et al., 1996:62)
捕 食 性。
分 佈：雲南、廣西、廣東、貴州、新疆西部。

Accipiter badius poliopsis (Hume) 高砂鷹 (Chen et Yu, 1984, III:258)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(極稀見迷鳥)、東南各省。

Accipiter gentilis 蒼鷹 (Yan et al., 1996:64)
捕 食：鼠類、野兔、斑鳩。
分 佈：臺灣(迷鳥)、雲南、貴州、四川、廣西、廣東、福建、江西、湖南、浙江、江蘇、安徽、青海、新疆西部、內蒙古黑龍江。
附 註：中國有五個亞種。

Accipiter gentiles fujiyamae (Swann et Hartert) 蒼鷹 (Chen et Yu, 11984, III:258)

=*Accipiter gentiles schveddowi* (Menzbier)

別 名：蒼鷹(幼)，黃鷹；雞鷹(老)。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(臺中，稀見冬候鳥)；日本(繁殖)。

Accipiter gentilis schvedowi 蒼鷹 (Zheng et al., 1981:155)

捕 食 性。

分 佈：福建。

Accipiter nisus nisosimilis (Tickell) 雀鷹 (Chen et Yu, 1984, III:257; Yan et al., 1996:62; Zheng et al., 1981:155)

捕 食：小型鼠類、小型鳥類。

分 佈：臺灣(彰化、埔里、臺北，偶見冬候鳥或迷鳥)、海南、華南、西南、華東、華中、華北、西藏、青海、新疆西部、東北各省。

Accipiter soloensis (Horsfield) 赤腹鷹 (Chen et Yu, 1984, III:258; Tsou et al., 1990:31; Yan et al., 1996:62; Zheng et al., 1981:155)

別 名：*鴿子鷹*。

捕 食：小鳥、蜥蜴、蛙、蜻蜓、昆蟲類。

分 佈：臺灣(恒春、澎湖、臺中、臺北，普遍過境猛禽)、福建(挂墩)、長江以南、雲南、四川。

Accipiter trivirgatus formosae Mayr 臺灣鳳頭蒼鷹 (Chen et Yu, 1984, III:258; Tsou et al., 1990:33; Zheng, 1986:258)

=*Accipiter trrivirgatus rufitinctus* (McClelland)

別 名：*鳳頭雀鷲，臺灣蒼鷲*。

捕 食：松鼠、五色鳥、綠鳩、赤腹鷹、綠簑鷺。

分 佈：臺灣(恒春、臺東、高雄、臺中、臺北，1,500m 以下闊葉林中)。

Accipiter virgatus 鳳頭鷹 (Yan et al., 1996:64)

捕 食：小型的鳥類 及鼠類。

分 佈：臺灣(中低海拔之森林)、海南、長江以至西藏南部、湖北、東北。

Accipiter virgatus affomos Hodgson 南方松雀鷹 (Chen et Yu, 1984, III:257)

別 名：*松雀鷹，雀鷲，臺灣雀鷲*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(蘭嶼、臺南、澎湖、臺中、臺北)、西南及東南各省。

Accipiter virgatus fuscipectus Mees 臺灣松雀鷹 (Chen et Yu, 1984, III:257; Tsou et al., 1990:35; Yan et al., 1996:64; Zheng, 1986:258)

捕 食：最小型的鳥類及鼠類。

分 佈：臺灣(平地至 2,800m 森林中，留鳥，部分爲春秋過境)。

Accipiter virgatus gularis (Temminck et Schlegel) 北方松雀鷹 (Chen et Yu, 1984, III:2257; Zheng et al., 1981:155)

別 名：(♂)*雀鷂*，*雀賊*，*松子鷹*，*松兒*；(♀)*松雀鷹*，*擺胸*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、華北、東北諸省；西伯利亞。

Aegypius calvus 黑兀鷲 (Yan et al., 1996:56)

捕 食：動物屍體。

分 佈：雲南。

Aegypius monachus 禿鷲 (Yan et al., 1996:56)

捕 食：動物屍體。

分 佈：臺灣(迷鳥)、青海、甘肅、新疆、內蒙古。

Aquila chrysaetos 金鵰 (Yan et al., 1996:68)

捕 食：狐、雉雞、家山羊等中型獸類。

分 佈：雲南、四川直到內蒙古、西藏南部西部至新疆西部及經青海至內蒙古、東北。

Aquila clanga Pallas 烏鵰 (Chen et Yu, 1984, III:258; Yan et al., 1996:68; Zheng et al., 1981:155)

=*Aquila maculata* (GM.)

=*Aqula clanga fulvescens* Gray

=*Aqula pomarina hastate* (Lesson)

別 名：*褐肩皂鷲*，*小皂雕*，*樺太鷲*，*花鵰*，*小花皂雕*，*小花皂鷲*，*黃鼠鷲*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(新竹、臺北，稀少冬候鳥)、福建、廣東沿海、浙江、新疆西部、內蒙古、東北諸省。

Aquila heliaca heliaca Savigny 白肩皂鷲 (Chen et Yu, 1984, III:258; Yan et al., 1996:68)

別 名：*白肩鵰*，*食蛇鷲*，*御鵰*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(高雄壽山一帶，罕見迷鳥)、廣東、福建、湖南、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、華北、西北、青海、甘肅、新疆西部、東北諸省。

Aquila rapax 草原鵰 (Yan et al., 1996:68)

捕 食：鼠類、野兔、蜥蜴。

分 佈：海南、廣東、廣西、貴州、西藏、青海、甘肅、新疆、內蒙古。

Aquila rapax nipalensis 草原鵰 (Zheng et al., 1981:155)

捕 食 性。

分 佈：福建。

Aviceda jerdoni 褐冠鵑隼 (Yan et al., 1996:50)

捕 食：大型昆蟲。
分 佈：海南、雲南。

Aviceda leuphotes 黑冠鵑隼 (Su et al., 1986:39; Yan et al., 1996:50)
捕 食：鼠類、鱗翅目幼蟲。
分 佈：湖南、廣東、海南、廣西、貴州、四川。

Butastur indicus (Gmelin) 灰面鵟 (Chen et Yu, 1984, IIIL259; Tsou et al., 1990:37; Yan et al., 1996:58; Zheng et al., 1981:155)
別 名：*灰面鷂，南路鷹，灰臉鵟鷹，鵜鳩*。
捕 食：鼠類及大型昆蟲。
分 佈：臺灣(恒春半島、八封山及大肚山臺地，春秋過境鳥)、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、浙江、江蘇、安徽、山西、華北、東北。

Butastur liventer 棕翅鵟鷹 (Yan et al., 1996:58)
捕 食：鼠類、蜈蚣、小型鳥類。
分 佈：雲南。

Butastur teesa 白眼鵟鷹 (Yan et al., 1996:58)
捕 食：鼠類、蛙類、爬蟲類。
分 佈：西藏。

Buteo buteo 普通鵟 (Su et al., 1986:39; Yan et al., 1996:68)
捕 食：野兔、蜥蜴、蛙類、小鳥的殘體、昆蟲類。
分 佈：臺灣、廣東、海南、長江下流向西延伸至西藏南部往南、新疆西部、吉林、黑龍江、內蒙古。

Buteo butet burmanicus Hume 鵟 (Chen et Yu, 11984, III:258)
別 名：*土豹，荒雕，盜雞鷂*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(稀少冬候鳥)、長江以南(冬候鳥)、華北、西北、東北諸省。

Buteo buteo japonicus 普通鵟 (Zheng et al., 1981:155)
捕 食 性。
分 佈：福建。

Buteo hemilasius 大鵟 (Yan et al., 1996:68)
捕 食：野兔、鼠類、小型鳥類。
分 佈：雲南、四川往東至華東、西藏、青海、甘肅、內蒙古、東北。

Buteo lagopus 毛腳鵟 (Yan et al., 1996:68)
別 名：*毛足鵟*。

捕 食：鼠類、小型鳥類。
分 佈：臺灣、福建、廣東、雲南、新疆西部。
附 註：中國有二亞種。

Buteo lagopus kamtschatkensis Demeentiev 堪察加毛足鵟 (Chen et Yu, 1984, III:258)
別 名：*黑毛足野鵟*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(臺南，稀見迷鳥)、東北；西伯利亞。

Buteo lagopus pallidus (Menzbier) 西伯利亞毛足鵟 (Chen et Yu, 1984, III:258)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(罕見冬候鳥)、華北、西北諸省。

Buteo rufinus 棕尾鵟 (Yan et al., 1996:68)
捕 食：鼠類、蜥蜴、蛇、昆蟲類。
分 佈：雲南、西藏、四川、甘肅、新疆西部。

Circaetus gallicus 短趾鵰 (Yan et al., 1996:58)
捕 食：蜥蜴、蛇類、蛙類、小型鳥類。
分 佈：陝西、甘肅、新疆。

Circus aeruginosus spionotus Kaup 白頭鷂 (Chen et Yu, 1984, III:257; Yan et al., 1996:62)
別 名：*澤鵟*，*北鷂*。
捕 食：鼠類、小型鳥類。
分 佈：臺灣(臺東、高雄、臺南、臺中、臺北各地，常見冬候鳥)、西藏南部、新疆中北部、內蒙古、東北。

Circus cyaneus cyaneus 灰澤鵟 (Chen et Yu, 11984, III:257; Yan et al., 1996:60; Zheng et al., 1981:155)
別 名：*雞鵟*，*白尾鷂*，*灰澤鷂*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(普遍冬候鳥)、海南、福建、長江以南、雲南、西藏、甘肅、華北、新疆西部、東北。

Circus macrourus 草原鷂 (Yan et al., 1996:60)
捕 食：蛙類、蜥蜴、鼠類、昆蟲類。
分 佈：新疆(天山)，偶見於北京、鎮江、九江、海南。

Circus melanoleucus (Pennant) 鵲鷂 (Chen et Yu, 1984, III:257; Yan et al., 1996:60)
別 名：*花澤鵟*。
捕 食：蛙類、鼠類、魚類。
分 佈：臺灣(關渡，迷鳥)、海南、冬季移徙長江以南各省、雲南、四川、江蘇、東北。

Circus pygargus 烏灰鷂 (Yan et al., 1996:60)
捕 食：蛙類、蜥蜴、昆蟲類。
分 佈：新疆(天山)。

Circus spilonotus 白腹鷂 (Yan et al., 1996:60)
別 名：*澤鵟*。
捕 食：鼠類、昆蟲類。
分 佈：臺灣、海南、長江以南、雲南、四川、內蒙古、吉林、黑龍江。

Elanus caeruleus 黑翅鳶 (Yan et al., 1996:52)
捕 食 性。
分 佈：雲南(留鳥)、廣西、浙江(夏候鳥)。

Gypaetus barbatus 鬍兀鷲 (Yan et al., 1996:56)
捕 食：屍體、小型鹿類、羊、雁鴨。
分 佈：西藏、四川、青海、甘肅、寧夏、內蒙古、新疆。

Gyps bengalensis 白背兀鷲 (Yan et al., 1996:56)
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Gyps himalayensis 高山兀鷲 (Yan et al., 1996:56)
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏、四川、青海、甘肅、寧夏、新疆。

Haliastur indus 栗鳶 (Yan et al., 1996:52)
捕 食：蛙、魚、大型昆蟲。
分 佈：雲南、廣西、廣東、貴州、湖南、江西、福建、浙江、江蘇、安徽、湖北。

Haliaeetus albicilla albicilla (Linnaeus) 白尾海鵰 (Chen et Yu, 11984, III:2259; Yan et al., 1996:54)
別 名：*白尾鷲*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(新竹、臺北等地，稀見候鳥)、廣東、福建、四川、浙江、江蘇、安徽、華北、青海、甘肅、寧夏、東北。

Haliaeetus leucogaster 白腹海鵰 (Yan et al., 1996:54)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(迷鳥)、海南、廣東、福建。

Haliaeetus leucoryphus 玉帶海鵰 (Yan et al., 1996:54)
捕 食：鼠類、蛙、魚類、小型鳥類。

分 佈：中國、西部及內蒙古。

Haliaeetus pelagicus pelagicus (Pallas) 虎頭海鵰 (Chen et Yu, 11984, III:259; Yan et al., 1996:54)

捕 食：魚類、大型鳥類、動物屍體。

分 佈：臺灣(嘉義，偶見迷鳥)、河北、遼寧沿海；西伯利亞東部(繁殖)，冬季南徙。

Hieraeetus fasciatus 白腹隼鵰 (Yan et al., 1996:64)

捕 食：野兔、鼠類。

分 佈：雲南、貴州、四川東部、廣西、廣東、湖南、江西、福建、浙江、江蘇、安徽、湖北。

Hiraeetus kienerii 棕腹隼鵰 (Yan et al., 1996:64)

捕 食：鼠類。

分 佈：海南。

Hieraeetus pennatus 靴隼鵰 (Yan et al., 1996:64)

捕 食 性。

分 佈：新疆西部。

Ichthyophaga ichthyaetus 漁鵰 (Yan et al., 1996:52)

捕 食：魚類、鳥類。

分 佈：海南。

Ictinaetus malayensis (Temminck) 林鵰 (Chen et Yu, 11984, III:258;Tsou et al., 1990:39; Yan et al., 1996:68)

捕 食：蛙類、鼠類、鳥類、昆蟲類、森林中上層的小動物，鳥巢中的幼鶵與卵；國外甚至飛入岩穴中攫取蝙蝠。

分 佈：臺灣(嘉義，1,100-2,300m 原始森林中，留鳥)、福建、海南；印尼、爪哇、蘇門答臘。

Milvus korschun formosanus Kuroda 臺灣老鷹 (Chen et Yu, 11984, III:259)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(各港口、湖泊、溪流上空，普遍留鳥)。

Milvus korschun lineatus Gray 鳶 (Chen et al., 1993:155; Su et al., 1986:39)

捕 食：小型動物、蝎蝽科成蟲、大型昆蟲。

分 佈：廣東。

Milvus migrans 黑鳶 (Yan et al., 1996:52)

別 名：*老鷹*。

捕 食：鼠類、野兔、蛙類、魚類。

分 佈：全國。

Pandion kaliaetus kaliaetus 鶚 (Zheng et al., 1981:155)

捕 食 性。

分 佈：福建。

Pernis ptilorhynchus orientalis Taczanowaki 東方蜂鷹 (Chen et Yu, 1984, III:259; Tsou et al., 1990:41; Yan et al., 1996:50)

=*P. apivorus neglectus* Kuroda

別 名：*雕頭鷹，八角鷹，八雕，食蜂鷹，鳳頭蜂鷹*。

捕 食：蜜蜂、胡蜂幼蟲、蛙類、蛇類。

分 佈：臺灣(春秋過境，但以低海拔闊葉林較常見，罕見冬候鳥)、海南、雲南、四川、華北、東北。

Spilornis cheela hoya Swinhoe 大冠鷲 (Chen et Yu, 1984, III:259; Su et al., 1986:39; Tsou et al., 1990:43; Yan et al., 1996:58; Zheng, 1986:258)

別 名：*蛇鷹，蛇鵰*。

捕 食：蛇類、蜥蜴、蛙類、野鼠、蝗蟲、螃蟹、石龍子、小鳥。

分 佈：臺灣(各地低海拔闊葉林，普遍留鳥)、廣東、海南、華南、西南。

Spizaëtus niplensis niplensis (Hodgson) 鷹鵰 (Chen et Yu, 1984, III:259; Yan et al., 1996:66)

別 名：*赫氏角鷹*。

捕 食：野兔、雉雞。

分 佈：臺灣(低海拔闊葉林)、海南、華東、華南、西南、西藏。

附 註：中國有四個亞種。

Spizaëtus niplensis fokiensis Sclater 南方角鷹 (Chen et Yu, 1984, III:259; Tsou et al., 1990:45; Yan et al., 1996:66; Zheng et al., 1981:155)

別 名：*熊鷹，赫氏角鷹，大花雕，鷹鵰*。

捕 食：小型哺乳動物、鳥類及爬蟲類。

分 佈：臺灣(南部山區，稀有留鳥)、福建、東南部各省。

Falconidae 隼科

Falco altaicus 阿爾泰隼 (Yan et al., 1996:74)

捕 食：野鼠、野兔、旱獺。

分 佈：青海、新疆。

Falco cherrug 獵隼 (Yan et al., 1996:74)

捕 食：野鴨、野兔、鼠類。

分 佈：山東經河南、山西、陝西至四川、西藏南部；西藏、四川、青海、新疆、內蒙古。

Falco columbarius 灰背隼 (Yan et al., 1996:72)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(迷鳥)、華南、華東向西延伸至西南、西藏、青海、新疆西部。
附 註：中國有四個亞種。

Falco naumanni 黃爪隼 (Yan et al., 1996:72)
捕 食 性。
分 佈：河南、河北、山西、新疆北部、內蒙古中部。

Falco peregrinus 遊隼 (Yan et al., 1996:72)
別 名：*隼*。
捕 食：空中追捕野鴨、鷗類、鳩鴿等。
分 佈：臺灣(稀有留鳥及冬候鳥)、海南、華南、華東向西延伸到西南、新疆西部。

Falco peregrinus callidus Latham 花梨隼 (Chen et Yu, 11984, III:248)
=*Falco peregrinus leeucogenys* Brehm
別 名：*隼，鶻，鴨虎，游隼*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(高雄、臺南、澎湖、新竹、淡水、臺北等地，不普遍冬候鳥)華北、東北。

Falco peregrinus peregrinator Sundwall 赤胸隼 (Chen et Yu, 1984, III:249; Tsou et al., 1990:49)
別 名：*隼，遊隼，鷞鶻*。
捕 食：燕子、鴿子。
分 佈：臺灣(臺中、埔里，過境鳥及冬候鳥)、華南、華北、西北各省。

Falco rusticolus 矛隼 (Yan et al., 1996:74)
捕 食：鼠類。
分 佈：黑龍江。

Falco severus 猛隼 (Yan et al., 1996:70)
捕 食：飛翔的蝗蟲、蜻蜓、蟬、甲蟲，偶食蝙蝠和蜥蜴。
分 佈：海南、廣西、雲南。

Falco subbuteo streeichi Hartert et Neumann 燕隼 (Chen et Yu, 11984, III:250; Yan et al., 1996:72)
捕 食：飛蟲、鳥類。
分 佈：臺灣(臺北烏來，過境鳥)、全中國。

Falco tinmunculus interstinctus McClelland 紅隼 (Chen et Yu, 1984, III:249; Yan et al., 1996:72)
=*Falco tinnunculus japonicus* Temminck et Schlegel
別 名：*東方茶隼，馬糞鷹*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(全省，普遍冬候鳥)、海南、全國。

Falco tinnunculus tinnunculus Linnaeus 歐洲紅隼 (Chen et Yu, 1984, III:249)

別 名：*歐洲茶隼*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(澎湖、埔里、淡水、臺北等地，稀有冬候鳥)、西北、東北各省。

Falco vespertinus 紅腳隼 (Yan et al., 1996:70)

捕 食 性。

分 佈：華北、東北。

Microhierax caerulescens 紅腿小隼 (Yan et al., 1996:70)

捕 食：昆蟲類。

分 佈：雲南。

Microhierax melanoleucus 白腿小隼 (Yan et al., 1996:70)

捕 食：小型鳥類、鼠類。

分 佈：華南、西南。

GALLIFORMES 雞形目

Phasianidae 雉科

Alectoria chukar 石雞 (Yan et al., 1996:82)

捕 食 性。

分 佈：山東、遼寧向西延伸經河北、山西、陝西、寧夏、內蒙古南部、甘肅、青海至新疆。

Alectoria magna 石雞 (Yan et al., 1996:82)

捕 食：植物嫩芽、果實、種子、昆蟲類。

分 佈：甘肅、青海。

Arborophila ardens 南海山鷓鴣 (Yan et al., 1996:86)

捕 食：植物嫩芽、種子、蝸牛。

分 佈：海南(迷鳥)。

Arborophila atrogularis 白額山鷓鴣 (Yan et al., 1996:88)

捕 食：植物。

分 佈：雲南西部狹窄地區。

Arborophila brunneopectus 棕胸山鷓鴣 (Yan et al., 1996:88)

捕 食：植物嫩芽、果實、昆蟲類、螺類。

分 佈：雲南、廣西。

Arborophila crudigularis (Swinhoe) 深山竹雞 (Chen et Yu, 1984:263; Chen et Yu, 11984, III:263; Yan et al., 1996:88; Zheng, 1986:258)

別 名：*臺灣山鷓鴣，棕眉竹雞，紅腳竹雞*。

捕 食：植物嫩芽、漿果、種子、蚯蚓、昆蟲類。

分 佈：臺灣(全省各地 700-2,300m 原始闊葉林中，特有留鳥)。

Arborophila gingica (Gmelin) 白額山鷓鴣 (Yan et al., 1996:86; Zheng et al., 1981:155, 165)

Arborophila gingica (Gmelin), 1789:

捕 食 性。

分 佈：福建(武夷山區挂墩)。

Arborophila mandellii 紅胸山鷓鴣 (Yan et al., 1996:86)

捕 食 性。

分 佈：西藏東南部(巴丹江上游)。

Arborophila fufipectus 四川山鷓鴣 (Yan et al., 1996:88)

捕 食：蝸牛、蛞蝓、蟻、植物嫩芽。

分 佈：四川西部。

Arborophila rufogularis 紅喉山鷓鴣 (Yan et al., 1996:86)

捕 食 性。

分 佈：雲南西部及西南部。

Arborophila torqueola 環頸山鷓鴣 (Yan et al., 1996:86)

捕 食 性。

分 佈：雲南、西藏狹窄區域。

Bambusicola fytchii 棕胸竹雞 (Yan et al., 1996:84)

捕 食：昆蟲類、嫩芽、漿果。

分 佈：雲南。

Bambusicola thoracica 灰胸竹雞 (Su et al., 1986:39; Yan et al., 1996:84)

別 名：*竹雞*。

捕 食：雜食，螞蟻、昆蟲類。

分 佈：東至臺灣、廣東、長江以南各省、北達陝西南部、西至四川盆地西緣。

Bambusicola thoracica sonorivox Gould 臺灣竹雞 (Chen et Yu, 1984, III:263; Zheng, 1986:258)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(各地平地至 2,200m 附近森林中，特有亞種)。

Bonasa bonasia 花尾榛雞 (Yan et al., 1996:76)

捕 食：植物的花、果實、昆蟲類。

分 佈：東北。

Bonasa sewerzowi 斑尾榛雞 (Yan et al., 1996:76)

捕 食：漿果、昆蟲類。

分 佈：雲南、四川、青海、甘肅。

Chrysoplphus amherstiae 白腹綿雞 (Yan et al., 1996:102)

捕 食：蕨、葉芽、漿果、核果。

分 佈：雲南、廣西西部、貴州、四川、西藏東南端。

Chrysolophus pictus 紅腹綿雞 (Yan et al., 1996:102)

別 名：*金雞*。

捕 食 性。

分 佈：貴州、四川東部、湖南、湖北西部、陝西、甘肅南部，中國中部山區，而以陝西寶雞市附近的秦嶺山脈爲多。

Coturnix chinensis chinensis (Linnaeus) 藍胸鶉 (Chen et Yu, 1984, III:262; Yan et al., 1996:84)

別 名：*小鵪鶉，赤喉鶉*。

捕 食：種子、昆蟲類。

分 佈：臺灣(臺東、花蓮、高雄、臺南、臺北，普遍留鳥)、海南、福建、廣東、廣西、雲南沿海，華南各省。

Coturnix coturnix (Linnaeus) 鵪鶉 (Chen et Yu, 1984, III:262; Yan et al., 1996:84)

別 名：*赤喉鶉*。

捕 食：葉芽、種子、昆蟲類。

分 佈：臺灣(臺東、花蓮、新竹、臺北等地，普遍留鳥)、海南、山東向西延伸至四川以南、西藏南部、新疆、山西、河北、西北、東北各省。

Coturnix coturnix japonica T. et S. (Chen et Yu, 11984, III:262)

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Crossoptilon auritum 藍馬雞 (Yan et al., 1996:98)

捕 食：植物莖、葉、根。

分 佈：四川、青海、甘肅、寧夏。

Crossoptilon crossoptilon 白馬雞 (Yan et al., 1996:98)

捕 食：植物葉芽、果實、種子、昆蟲類。

分 佈：雲南、西藏、四川、青海交界廣區域。

Crossoptilon harmani 藏馬雞 (Yan et al., 1996:98)

捕 食：植物葉芽、果實、種子。

分 佈：西藏東南部。

Crossoptilon manichuricum 褐馬雞 (Yan et al., 1996:98)
捕 食：植物根、莖葉、果實、種子、喜食橡子。
分 佈：山西、河北。

Dendragapus falcipennis 鐮翅雞 (Yan et al., 1996:74)
捕 食：嫩枝、漿果。
分 佈：黑龍江(小興安嶺)。

Francolinus pintadeanus 鷓鴣 (Su et al., 1986:39; Yan et al., 1996:90; Zheng et al., 1981:155)
捕 食：蚱蜢、蟻等昆蟲，植物嫩芽、果實、種子。
分 佈：海南、廣東、廣西、雲南、貴州、湖南、江西、福建、浙江、安徽南部。

Gallus domisticus 家雞 (Jia et al., 1981(4):20-22; Shu et Yu, 1985:93; Tan, 1996(1):50)
捕 食：*Ambrostoma quadriimpressum* (Motschulsky) 榆紫葉甲
Hyphantia cunea (Drury) 美國白蛾(幼蟲)。
分 佈：遼寧、吉林。

Gallus gallus 原雞 (Yan et al., 1996:94)
捕 食：植物種子、果實、竹筍、昆蟲類。
分 佈：海南、廣西西南、雲南南部。

Ithaginis cruentus 血雉 (Yan et al., 1996:90)
捕 食：植物嫩葉、漿果、蕨、苔鮮、菌類、小昆蟲。
分 佈：西藏、四川、青海、甘肅、陝西；尼泊爾、錫金。

Lagopus lagopus 柳雷雞 (Yan et al., 1996:76)
捕 食：植物嫩枝、葉、昆蟲類。
分 佈：黑龍江。

Lagopus mutus 岩雷雞 (Yan et al., 1996:76)
捕 食：植物莖、葉、果實，嗜食矮樺樹葉。
分 佈：新疆北部極狹窄範圍。

Lerwa lerwa 雪鶉 (Yan et al., 1996:78)
捕 食：苔鮮、地衣、漿果、種子。
分 佈：雲南西北、西藏南部、四川、甘肅交界區、青海。

Lophophorus impeyanus 棕尾虹雉 (Yan et al., 1996:94)
捕 食：果實、種子。
分 佈：西藏南部極狹窄區域。

Lophophorus lhuysii 尾虹雉 (Yan et al., 1996:94)

捕 食：植物地下莖、嫩芽、苔鮮、昆蟲類。

分 佈：四川、青海、甘肅。

Lophophorus sclateri 白尾梢虹雉 (Yan et al., 1996:94)

捕 食：植物根、葉芽、種子、昆蟲幼蟲。

分 佈：雲南、西藏極狹窄區域；緬甸東北部。

Lophura imperialis 皇鷴 (Yan et al., 1996:96)

捕 食：植物果實、葉芽、小動物。

分 佈：雲南(西雙版納)。

Lophura leucomelana 黑鷴 (Yan et al., 1996:96)

捕 食：植物根、莖、果實、小動物。

分 佈：雲南、西藏極狹窄區域。

Lophura nycthemera fokiensis Delacour 白鷴 (Su et al., 1986:39; Yan et al., 1996:96; Zheng et al., 1981:165)

Lophura nycthemera fokiensis Delacour, 1943:

捕 食：殼斗科植物果實(如錐栗)、竹筍、鱗翅目幼蟲、馬陸。

分 佈：海南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、湖南、江西、福建(武夷山區挂墩)、浙江、江蘇南部、安徽、湖北。

Lophura swinhoii (Gould) 山雞 (Chen et Yu, 1984, III:263; Yan et al., 1996:96; Zheng, 1986:258)

別 名：*雉雞，環頸雉，藍鷴，藍腹鷴，黑尾雞*。

捕 食：植物性食物、昆蟲類。

分 佈：臺灣(各地 200-2,300m 原始闊葉林底層，特有種)。

Pavo muticus 綠孔雀 (Yan et al., 1996:104)

捕 食：雜食性。

分 佈：雲南、西藏東南部。

Perdix dauuricae 斑翅山鶉 (Yan et al., 1996:82)

捕 食：植物種子、嫩芽、昆蟲類。

分 佈：華北、寧夏、甘肅、青海、新疆、內蒙古、東北。

Perdix hodgsoniae 高原山鶉 (Yan et al., 1996:82)

捕 食：植物嫩芽、漿果、種子、苔鮮。

分 佈：四川、西藏、青海、甘肅。

Perdix perdix 灰山鶉 (Yan et al., 1996:82)

捕 食 性。

分 佈：新疆北部。

Phasianus colchicus 雉雞 (Chen et al., 1993:156; Yan et al., 1996:102)

別 名：*環頸雉*。
捕 食：食性雜，喜捕各種昆蟲、軟體動物、植物種子。
分 佈：臺灣、全國除西藏中南部大部分地區及新疆中部外，均有分布。
附 註：全國有十九個亞種。

Phasianus colchicus formosanus Elliot 臺灣雉 (Chen et Yu, 11984, III:263)

捕 食 性。
分 佈：臺灣(各地雜草中，特有亞種)。

Polyplectron bicalcaratum 孔雀雞 (Yan et al., 1996:102)

捕 食 性。
分 佈：海南、雲南東南、西藏東南。

Pucrasia macrolopha 勺雞 (Yan et al., 1996:90)

捕 食：植物嫩芽、花、果實。
分 佈：浙江、江蘇、山東、河北、遼寧南端向西南延伸經山西、陝西、甘肅、四川、西藏南端、雲南北部、貴州、湖南、江西北部。

Syrmaticus ellioti 白頸長尾雉 (Yan et al., 1996:100)

捕 食 性。
分 佈：福建西北部、廣東、廣西北部、貴州、湖南、江西、浙江。

Syrmaticus humiae 黑頸長尾雉 (Yan et al., 1996:100)

捕 食：植物嫩芽、果實、昆蟲類。
分 佈：廣西西部、雲南、貴州南部。

Syrmaticus mikado (Ogilvie-Grant) 帝雉 (Chen et Yu, 1984, III:263; Yan et al., 1996:100)

別 名：*黑長尾雉*。
捕 食：雜食性，蕨、草莓、植物嫩芽、昆蟲類。
分 佈：臺灣(1,800-3,200m 附近原始闊葉林中，特有種，極少見)。

Syrmaticus reevesii 白冠長尾雉 (Yan et al., 1996:100)

捕 食：果實、穀物。
分 佈：貴州、四川、湖北、安徽、陝西。

Tetrao nrogallus 松雞 (Yan et al., 1996:78)

捕 食：植物嫩枝。
分 佈：新疆北部極狹窄範圍。

Tetrao parvirostris 黑嘴松雞 (Yan et al., 1996:78)
捕 食：植物嫩枝、葉芽。
分 佈：吉林、黑龍江。

Tetrao tetrix 黑琴雞 (Yan et al., 1996:78)
捕 食：植物嫩枝、葉芽、漿果、昆蟲類。
分 佈：山西、吉林、黑龍江(大小興安嶺)、新疆西北部。

Tetraogallus altaicus 阿爾泰雪雞 (Yan et al., 1996:80)
捕 食：漿果、植物葉芽、種子、球莖、昆蟲類。
分 佈：新疆北部極狹窄範圍。

Tetraogallus himallayensis 暗腹雪雞 (Yan et al., 1996:80)
捕 食：植物根莖、葉芽、花、果實、種子。
分 佈：青海、甘肅、新疆。

Tetraogallus tibetanus 淡腹雪雞 (Yan et al., 1996:80)
捕 食：植物嫩芽、果實、種子。
分 佈：四川西北部、西藏、青海、新疆西南部。

Tetraophasis obscurus 雉鶉 (Yan et al., 1996:80)
捕 食：植物莖、花、野果、昆蟲類。
分 佈：四川、甘肅、青海交界區。

Tetraophasis szechenyii 四川雉鶉 (Yan et al., 1996:80)
捕 食：蕨、草根、野果、昆蟲類。
分 佈：雲南、西藏、四川交界區。

Tragopan blythii 灰腹角雉 (Yan et al., 1996:92)
捕 食 性。
分 佈：雲南(貢山)、西藏東部。

Tragopan caboti 黃腹角雉 (Yan et al., 1996:90)
捕 食：蕨類、殼斗科果實。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西。

Tragopan melanocephalus 黑頭角雉 (Yan et al., 1996:92)
捕 食：植物葉芽、漿果、種子。
分 佈：西藏西南隅(獅泉河流域)。

Tragopan satyra 紅胸角雉 (Yan et al., 1996:92)
捕 食：植物葉芽、球莖。

分 佈：西藏南部、雲南(貢山)。

Tragopan temminckii 紅腹角雉 (Yan et al., 1996:92)
捕 食：植物葉芽、果實。
分 佈：廣西、雲南、西藏東南部、貴州、四川、湖南、湖北、陝西。

Tropicoperdix chloropus 綠腳山鷓鴣 (Yan et al., 1996:88)
捕 食：植物種子、昆蟲類。
分 佈：雲南(西雙版納)。

GRUIFORMES 鶴形目

Turnicidae 三趾鶉科

Turnix suscitator 棕三趾鶉 (Yan et al., 1996:104)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、海南、雲南、廣西，貴州、四川、湖南、江西南部、福建。
附 註：中國有二個亞種。

Turnix sylvatica 林三趾鶉 (Yan et al., 1996:104)
捕 食：昆蟲類、草籽。
分 佈：臺灣、海南、廣東。

Turnix ssuscitator rostrata Swinhoe 臺灣三趾鶉 (Chen et Yu, 11984, III:268)
別 名：*棕三趾鶉*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(各地，平地至 1,200m 乾燥野草地區，特有亞種)。

Turnix sylvatica mikado Hachisuka 小三趾鶉 (Chen et Yu, 11984, III:268)
別 名：*林三趾鶉*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(高雄、埔里，尙稱普遍留鳥)、海南、廣東。

Turnix tanki 黃腳三趾鶉 (Yan et al., 1996:104)
捕 食：草籽、穀物、昆蟲類。
分 佈：海南、華南、西南、華東、華中、華北、東北。

Gruidae 鶴科

Anthropoides virgo 簑羽鶴 (Yan et al., 1996:108)
捕 食：小魚、蛙、水生昆蟲、植物嫩芽、種子。
分 佈：西藏南部地區、寧夏、新疆西北部小區域、內蒙古北部、東北地區。

Gurs antigone 赤頸鶴 (Yan et al., 1996:108)

捕 食：穀粒、植物嫩芽、蛙、小魚。

分 佈：雲南。

Grus canadensis 沙丘鶴 (Yan et al., 1996:106)

捕 食：昆蟲類、植物漿果、堅果。

分 佈：江蘇北部(迷鳥)；西伯利亞東北部、北極地區苔原地帶、楚克奇半島。

Grus grus 灰鶴 (Yan et al., 1996:106)

捕 食：植物根莖、草籽、昆蟲類、蛙、軟體動物。

分 佈：海南、雲南、貴州、四川、西藏南端、廣西、廣東、湖南、江西、福建、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西。

Grus grus lilfordi Sharpe 灰鶴 (Chen et Yu, 1984, III:269)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(新竹香山一帶，偶見迷鳥)。

Grus japonensis (P. L. S. Müller) 丹頂鶴 (Chen et Yu, 1984, III:268; Yan et al., 1996:108)

別 名：*白鶴，仙鶴*。

捕 食：魚類、水生昆蟲、軟體動物、蛙等。

分 佈：臺灣(臺北、羅東等地，罕見冬候鳥)、黑龍江、吉林(在東北地區繁殖)，江蘇、江西一帶度冬。

Grus leucogeranus 白鶴 (Yan et al., 1996:108)

捕 食：植物根、嫩芽、昆蟲類、小型囓齒動物。

分 佈：內蒙古、黑龍江，長江中、下游度冬。

Grus monacha Temminck 白頭鶴 (Chen et Yu, 1984, III:268; Yan et al., 1996:106)

捕 食：昆蟲類、甲殼動物、小魚、植物嫩芽、稻穀。

分 佈：臺灣(蘭陽一帶，稀有冬候鳥)、江蘇、安徽、湖北(冬季移棲長江下游及華北、東北(繁殖)。

Grus nigricollis 黑頸鶴 (Yan et al., 1996:106)

捕 食：植物根莖、草籽、昆蟲類、蛙、軟體動物。

分 佈：雲南、貴州、四川、西藏、青海。

Grus vipio Pallas 白枕鶴 (Chen et Yu, 1984, III:269; Yan et al., 1996:108)

別 名：*鍋鶴，真那鶴，赤頰鶴*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(淡水，罕見迷鳥或冬候鳥)、內蒙古北端、黑龍江西北(繁殖)，長江下游、福建度冬。

Rallidae 秧雞科

Amaurornis akool 紅腳苦惡鳥 (Yan et al., 1996:110)

捕 食：蝸牛、軟體動物、昆蟲類。

分 佈：廣西、廣東、貴州、湖南、江西、福建、浙江、江蘇、安徽。

Amaurornis bicolor 棕背田雞 (Yan et al., 1996:112)

捕 食：昆蟲類、軟體動物、甲殼類。

分 佈：雲南、四川。

Amaurornis phoenicurus 白胸苦惡鳥 (Su et al., 1986:39; Yan et al., 1996:110)

捕 食：叩頭蟲、蝗蟲、尺蠖、昆蟲類、草籽。

分 佈：臺灣、廣東、海南、雲南、四川、華南、華中廣大地區。

Amaurornis phoenicurus chinensis (Boddaert) 白腹秧雞 (Chen et Yu, 1984, III:270)

別 名：*白胸秧雞，姑婆鳥，苦惡鳥*。

捕 食：草籽、昆蟲類。

分 佈：臺灣(全省各地水域及稻田中，普遍留鳥)、華南、華北各省。

Coturnicops noveboracansis 花田雞 (Yan et al., 1996:112)

捕 食：昆蟲類、草籽。

分 佈：福建、廣東沿海、內蒙古北部、遼寧、吉林、黑龍江。

Crex crex 長腳秧雞 (Yan et al., 1996:112)

捕 食 性。

分 佈：新疆西北。

Fulica atra atra Linnaeus 骨翁 (Chen et Yu, 1984, III:271; Yan et al., 1996:110)

別 名：*白冠雞，魚凍鳥，大鷭，莊雞，水姑丁，孤頂雞，骹頂，白骨頂，骨頂，骨頂雞*。

捕 食：小魚、蝦、水生昆蟲、蠕蟲、軟體動物、植物嫩芽、種子。

分 佈：臺灣(恒春、臺東、臺南、日月潭等地，尚稱普遍冬候鳥)、海南、雲南、西藏、四川、湖北、安徽及江蘇、長江南部(冬候鳥)，河北、山西、寧夏、新疆西北部地區、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；西伯利亞。

Gallicrex cinerea conerea (Gmelin) 鶴秧雞 (Chen et Yu, 1984, III:271; Yan et al., 1996:110)

別 名：*董雞，魚凍鳥，骨翁，小鷭*。

捕 食：小魚、蝦、水生昆蟲、蠕蟲、軟體動物、植物嫩芽、種子。

分 佈：臺灣(高雄、臺東、臺南、澎湖、臺中，尚稱普遍夏候鳥)、海南、自雲南、四川向東北延伸至吉林往東南極廣大地區，沿海一帶及南方各省。

Gallinula chloropus 黑水雞 (Yan et al., 1996:110)
別 名：*紅冠水雞*。
捕 食：小魚、蝦、水生昆蟲、蠕蟲、軟體動物、植物嫩芽、種子。
分 佈：臺灣、海南、自西藏南部、雲南、四川向東北延伸至黑龍江往東南極廣大地區、新疆中西部。

Gallinula chloropus indica Blyth 紅冠水雞 (Chen et Yu, 11984, III:271)
別 名：*紅雞，黑水雞，鷭*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(全省沼澤地及稻田中，普遍留鳥)、長江以南地區。

Porphyrio porphyrio 紫水雞 (Yan et al., 1996:110)
捕 食：小魚、蝦、水生昆蟲、蠕蟲、軟體動物、植物嫩芽、種子。
分 佈：雲南南部西部。

Porzana cinerea 白眉秧雞 (Yan et al., 1996:114)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(稀有過境鳥)。

Porzana fusca 紅胸田雞 (Yan et al., 1996:112)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、雲南、四川向東伸展至吉林的東南方廣大地區。

Porzana fusca erythrothorax (Temminck et Schlegel) 緋秧雞 (Chen et Yu, 1984, III:270)
別 名：*水雞，紅胸田雞，東方紅秧雞，夏秧雞*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(屏東、日月潭等地，罕見迷鳥)、東南、華南、華中各省。

Porzana fusca dieni Deignan 臺灣緋秧雞 (Chen et Yu, 1984, III:270)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(南部冬季較多，普遍留鳥)。

Porzana parva 姬田雞 (Yan et al., 1996:114)
捕 食 性。
分 佈：新疆西部狹窄地區。

Porzana porzana 斑胸田雞 (Yan et al., 1996:114)
捕 食：昆蟲類、軟體動物、甲殼類。
分 佈：新疆西部狹窄地區。

Porzana pusilla pusilla (Pallas) 小秧雞 (Chen et Yu, 1984, III:270; Yan et al., 1996:114)
別 名：*小田雞*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(罕見迷鳥)、廣東沿海、河南、陝西、山東、山西、河北、新疆西部狹窄地區、內蒙古北部、遼寧、吉林、黑龍江；西伯利亞。

Rallina eurizonoides 白喉斑秧雞 (Su et al., 1986:39; Yan et al., 1996:112)

別 名：*灰腳秧雞*。

捕 食：蜈蚣。

分 佈：臺灣、廣東、海南、廣西南部。

Rallina eurrizonoides formosana Seebohm 臺灣大秧雞 (Chen et Yu, 1984, III:270)

別 名：*白喉斑秧雞*，*灰腳秧雞*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(蘭嶼、臺中等地，特有亞種，留鳥)。

Rallina fasciata (Raffles) 南洋大秧雞 (Chen et Yu, 1984, III:270; Yan et al., 1996:112)

別 名：*栗喉斑秧雞*，*紅腳秧雞*，*紅腿斑秧雞*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(蘭嶼)；印尼、蘇門答臘。

Rallina paykullii 脅斑田雞 (Yan et al., 1996:112)

捕 食：水生昆蟲、水藻、植物種子。

分 佈：河南、山西、河北、遼寧、吉林、黑龍江。

Rallus aquaticus 普通秧雞 (Yan et al., 1996:114)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、廣東、廣西、貴州、湖南、江西、福建、浙江、四川、青海甘肅、新疆、內蒙古、河北、遼寧、吉林、黑龍江。

Rallus aquaticus indicus Rlyth 印度秧雞 (Chen et Yu, 1984, III:269)

別 名：*水雞*，*普通秧雞*，*灰胸秧雞*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(罕見冬候鳥，蘭嶼偶爲留鳥)、東北地區(繁殖)、西伯利亞。

Rallus striatus 藍胸秧雞 (Su et al., 1986:39; Yan et al., 1996:114)

別 名：*灰胸秧雞*。

捕 食：水生昆蟲、昆蟲類、蝸牛、小螺、水生植物種子、嫩芽。

分 佈：臺灣、廣東、海南、雲南、四川、湖北、安徽、江蘇。

Rallus striatus taiwanus (Yamashina) 長嘴秧雞 (Chen et Yu, 1984, III:269)

別 名：*藍胸秧雞*，*灰胸秧雞*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(高雄、臺東、臺南、臺中、宜蘭、臺北等地，特有亞種，不普遍留鳥)。

CHARADRIIFORMES 鷸形目

Otididae 鴇科

Chlamydotis undulata 波斑鴇 (Yan et al., 1996:116)
捕 食：植物種子、嫩葉、也食昆蟲類、蛙、蜥蜴、小角獸類。
分 佈：新疆西北部窄地區。

Otis tarda 大鴇 (Yan et al., 1996:116)
捕 食：植物種子、嫩葉、也食昆蟲類、蛙、蜥蜴、小角獸類。
分 佈：西江、湖北、安徽：江蘇、山東、河南、陝西、甘肅、寧夏、新疆西部、內蒙古、遼寧。

Tetrax tetrax 小鴇 (Yan et al., 1996:116)
捕 食：植物種子、嫩葉、也食昆蟲類、蛙、蜥蜴、小角獸類。
分 佈：新疆西部窄地區。

Jacanidae 水雉科

Hydrophasianus chirurgus sinensis (Gmelin) 水雉 (Chen et Yu, 1984, III:281; Yan et al., 1996:116)
俗 名：*啾咕*。
捕 食：水生昆蟲、小魚、水生植物葉、種子。
分 佈：臺灣(臺東、高雄、臺南、及臺北附近，不普遍留鳥)、海南、雲南經四川向東北延伸至山西、河北的東南部大部分區。

Metopidius indicus 銅翅水雉 (Yan et al., 1996:116)
捕 食：水生昆蟲、小魚、水生植物葉、種子。
分 佈：雲南。

Phalaropodidae 瓣蹼鷸科

Phalaropus lobatus (Linnaeus) 紅頭瓣蹼鷸 (Chen et Yu, 1984, III:282)
別 名：*紅頸瓣蹼鷸，紅領鷸*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(高雄、澎湖、臺北等地，不普遍冬候鳥及過境鳥)、西北、東北各省。

Rostratulidae 彩鷸科

Rostratula benghalensis benghalensis (Linnaeus) 彩鷸 (Chen et Yu, 11984, III:283; Yan et al., 1996:118)
別 名：*羽斑鳴*。
捕 食：昆蟲類、螺等無脊椎動物、植物種子。

分 佈：臺灣(臺東、高雄、臺中、臺北等地水田, 尙稱普遍留鳥)、海南、雲南經四川向東北延伸至山西、河北的東南部大部分區。

Haematopodidae 蠣鷸科

Haematopus ostralegus osculans Swinhoe 蠣鴴 (Chen et Yu, 1984, III:304; Yan et al., 1996:118)

別 名：*蠣鷸*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(高雄、臺南、澎湖等地，稀見冬候鳥)、北方沿海一帶夏候鳥，在東南沿海度冬。

Recurvirostridae 反嘴鷸科

Himantopus himantopus himantopus (Linnaeus) 高蹺鷸 (Chen et Yu, 1984, III:303; Yan et al., 1996:118)

別 名：*黑翅長腳鷸，黑翅高鷸，長腳鴴*。

捕 食：軟體動物、甲殼類、環節動物、昆蟲類。

分 佈：臺灣(西部沿岸，不甚普遍冬候鳥)、海南、廣東、雲南、華北各省、青海、甘肅、新疆、內蒙古、河北、遼寧、吉林、黑龍江。

Recurvirostra avosetta Linnaeus 反嘴鷸 (Chen et Yu, 1984, III:303;Yan et al., 1996:118)

別 名：*反嘴鷸*。

捕 食：甲殼類、昆蟲類、蠕蟲、軟體動物。

分 佈：臺灣(極罕見迷鳥)、廣東、福建、江西、浙江、江蘇、安徽；新疆、青海、甘肅、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Burhinidae 石鴴科

Burhinus oedicnemus 石鴴 (Yan et al., 1996:120)

捕 食 性。

分 佈：廣東(迷鳥)。

Esacus recurvirostris 大石鴴 (Yan et al., 1996:120)

捕 食：甲殼類、軟體動物。

分 佈：海南、雲南。

Ibidorhynchidae 鹮嘴鷸科

Ibidorhyncha strutliersil 鹮嘴鷸 (Yan et al., 1996:120)

捕 食 性。

分 佈：四川、西藏、新疆西部、青海、甘肅、寧夏、陝西、河南、山東、山西、河北。

Glareolidae 燕鴴科

Glareola lactea 灰燕鴴 (Yan et al., 1996:120)
捕 食：飛行中捕食、地上捕捉食物(昆蟲類)。
分 佈：雲南南部。

Glareola maldivarus 普通燕鴴 (Yan et al., 1996:120)
捕 食：飛行中捕食、地上捕捉食物(昆蟲類)。
分 佈：臺灣、海南、廣東、廣西、貴州、四川、甘肅、寧夏、內蒙古向東及東南延伸。

Glareola pratineola maldivarum Forster 燕鴴 (Chen et Yu, 1984, III:280)
=*Glareola oreintalis* Leach
別 名：*土燕子*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(蘭嶼、臺東、花蓮、高雄、臺南、臺北等地，尚稱普遍鳥)、東南、華北、內蒙古、東北各省(繁殖)。

Charadriidae 鴴科

Charadrius alexandrinus 環頸鴴 (Yan et al., 1996:124)
別 名：*東方環頸鴴*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、海南、雲南、西藏及四川交界地區(冬候鳥)、廣西向西北經貴州、四川、青海至新疆往東南沿海及東北。

Charadrius alexandrinus alexandrinus Linnaeus 細嘴環頸鴴 (Chen et Yu, 1984, III:302)
別 名：*白領鴴，肯特鴴*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(普遍冬候鳥)、西北、內蒙古等地。

Charadrius alexandrinus dealbatus (Swinhoe) 東方環頸鴴 (Chen et Yu, 1984, III:302)
別 名：*白鴴，東方肯鴴，黃腿小鴴*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(西部各地及澎湖，普遍冬候鳥及過境鳥)、沿海諸省。

Charadrius alexandrinus nihonensis Deignan 日本環頸鴴 (Chen et Yu, 1984, III:302)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(本島及澎湖)、東南沿海各省(冬候鳥)。

Charadrius asiaticus 紅腳鴴 (Yan et al., 1996:126)
捕 食：昆蟲及其幼蟲。

分 佈：新疆西北部。

Charadrius asiaticus veredus Gould 紅胸鴴 (Chen et Yu, 1984, III:302)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、廣東、廣西、長江流域(過境鳥)、東部各省、東北；西伯利亞。

Charadrius dominicus fulvus Gmelin 黑胸鴴 (Chen et Yu, 1984, III:302)

別 名：*黑襟鴴，金斑鴴，金背子，金鷸*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(本島及澎湖)、華北，西北，內蒙古、東北諸省。

Charadrius dubius 金眶鴴 (Yan et al., 1996:124)

別 名：*小環頸鴴*。

捕 食：昆蟲類、蝌蚪。

分 佈：臺灣、海南、廣東、福建、浙江沿海；雲南、四川、西藏、青海、新疆、甘肅、寧夏、陝西、山西、山東、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Charadrius dubius curonicus Gmelin 小環頸鴴 (Chen et Yu, 1984, III:301)

=*Charadrius minor* Woly et Meyer

別 名：*小項圈鴴，歐洲環頸鷸，小鷸*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(高雄、臺南、澎湖、臺中、臺北等地，普遍冬候鳥)、華北諸省，冬季移棲東南沿海各省。

Charadrius dubius dubius Scopoli 南方小環頸鴴 (Chen et Yu, 1984, III:301)

別 名：*金眶，東方小項圈鴴*

捕 食 性。

分 佈：臺灣(臺東、臺南、臺中等地)。

Charadrius hiaticula 劍鴴 (Yan et al., 1996:124)

別 名：*環頸鴴*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(迷鳥)、廣東、廣西、貴州、湖南、江西(冬季度冬)；雲南、貴州、四川、湖北、安徽、江蘇、河南、山東、陝西、甘肅、山西、河北、內蒙古(北部)、遼寧、吉林、黑龍江。

Charadrius hiaticula placidus Gray 劍鴴 (Chen et Yu, 1984, III:302)

別 名：*長嘴鴴* 。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(常見於沙洲上，較稀見冬候鳥)、華北、東北各省。

Charadrius leschenaultii 鐵嘴沙鴴 (Yan et al., 1996:126)

別 名：*鐵嘴鴴*。
捕 食：昆蟲類 、軟體動物。
分 佈：海南(冬候鳥)、新疆西部及北部、內蒙古西部。

Charadrius leschenaultii leschenaultii Lesson 鐵嘴鴴 (Chen et Yu, 1984, III:302)
=*Ochodromus geoffroyi* (Wagler)
別 名：*鐵嘴沙鴴，大沙鴴*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(澎湖，普遍過境鳥)、內蒙古、西北諸省。

Charadrius mongolus 蒙古沙鴴 (Yan et al., 1996:126)
別 名：*蒙古鴴*。
捕 食：昆蟲類、軟體動物。
分 佈：臺灣、海南、廣東沿海、西藏、青海、新疆西部。

Charadrius mongolus stegmanni Portenko 蒙古鐵嘴鴴 (Chen et Yu, 1984, III:302)
別 名：*蒙古鴴，小沙鴴*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(本島及澎湖，普遍過境鳥)、西伯利亞(可能繁殖)。

Charadrius placidus 長嘴劍鴴 (Yan et al., 1996:124)
別 名：*劍鴴*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(迷鳥)。

Charadrius veredus 東方紅胸鴴 (Yan et al., 1996:126)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(迷鳥)、內蒙古、遼寧、口林、黑龍江(繁殖)，冬季經東南沿海過境往南遷移至廣東、廣西、四川東部。

Eudromias morinellus 小嘴鴴 (Yan et al., 1996:126)
捕 食：昆蟲類、軟體動物。
分 佈：新疆西北、內蒙古東北(稀有過境鳥)。

Glareola maldivarum Forster 燕鴴 (Chen, 1969(2)；181; He, et al., 1991:148)
捕 食：稻田取食。
分 佈：臺灣、山東、北方沿海、遼寧南部(除廣西、雲南、西藏、貴州、新疆外都有分佈。

Microsarcops cinerea (Blyth) 跳鴴 (Chen et Yu, 1984, III:301)
=*Vanellus cinereus* (Blyth)
別 名：*跳凫，灰頭麥雞，白尾灰鶮*。

捕 食 性。
分 佈：臺灣(罕見迷鳥)、西南各省及長江中下游(過境鳥)、內蒙古、東北各省。

Pluvialis fulva 金斑鴴 (Yan et al., 1996:122)
捕 食：昆蟲類、蠕蟲。
分 佈：臺灣、海南、廣東、廣西、雲南、貴州。

Pluvialis squatarola (Linnaeus) 灰斑鴴 (Chen et Yu, 1984, III:301; Yan et al., 1996:122)
捕 食：昆蟲類、蠕蟲。
分 佈：臺灣(不甚普遍冬候鳥及過境鳥)、海南、雲南、貴州、廣東、福建、江西、湖北、安徽、浙江、江蘇、西北及東北各省。

Vanellus cinereus 灰頭麥雞 (Yan et al., 1996:122)
別 名：*跳吡*。
捕 食：昆蟲類、螺、蚯蚓。
分 佈：臺灣(稀有過境鳥)、廣東、廣西、雲南、貴州。

Vanellus duvaucelii 距翅麥雞 (Yan et al., 1996:122)
捕 食 性。
分 佈：海南、廣西、雲南。

Vanellus indicus 肉垂麥雞 (Yan et al., 1996:122)
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Vanellus vanellus (Linnaeus) 小辮鴴 (Chen et Yu, 1984, III:301; Yan et al., 1996:124)
別 名：*田鳧，水雞，窪子，小辮兒，鳳頭麥雞，嘀嘀咕，鳳頭麥雞*。
捕 食：昆蟲類、草籽。
分 佈：臺灣(臺南、宜蘭、臺北，不甚普遍 冬候鳥)、福建、湖南、雲南、貴州、西藏南部、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北；新疆、青海、甘肅、寧夏、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、西北及東北各省；西伯利亞。

Scolopacidae 鷸科

Actitis hypoleucos 磯鷸 (Yan et al., 1996:136)
捕 食：昆蟲類、螺類、蠕蟲。
分 佈：臺灣、海南、雲南經四川、貴州、湖南、湖北、江西、安徽、江蘇、浙江、福建、廣東、廣西(冬候鳥)；西藏向東北至遼寧西北及東北廣大地區(夏候鳥)。

Arenaria interpres interpres (Linnaeus) 翻石鷸 (Chen et Yu, 1984, III:297; Yan et al., 1996:140)
別 名：*鵜鷸*。
捕 食：甲殼類、軟體動物、昆蟲類、蜘蛛、蚯蚓、種子、漿果。

分 佈：臺灣(澎湖，尚稱普遍冬候鳥及過境鳥)、海南、廣東、福建、浙江(過境鳥)、內蒙古、東北。

Calidris acuminata (Horsfield) 尖尾鷸 (Chen et Yu, 1984, III:297; Yan et al., 1996:144)
別 名：*鶉鷸，尖尾濱鷸*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(主要南部，蘭嶼、澎湖，普遍冬候鳥、過境鳥)、海南(夏候鳥)；廣東北至內蒙古東部、遼寧、吉林、黑龍江(夏候鳥)。

Calidris alba 三趾鷸 (Yan et al., 1996:146)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、海南、廣東、福建(冬候鳥)。

Calidris alpina 黑腹濱鷸 (Chen et Yu, 1984, III:297; Yan et al., 1996:142)
別 名：*濱鷸*。
捕 食：軟體動物、昆蟲及其幼蟲。
分 佈：臺灣(澎湖，普遍冬候鳥)、海南、廣西、廣東、福建、江西、湖南、湖北、安徽、浙江、江蘇(冬候鳥)。
附 註：中國有二亞種。

Calidris alpina sakhalina (Vieillot) 濱鷸 (Chen et Yu, 1984, III:297)
別 名：*黑腹濱鷸*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(澎湖，普遍冬候鳥)、東南部沿海至東北。

Calidris canutus rogersi (Mathews) 漂鷸 (Chen et Yu, 1984, III:297; Yan et al., 1996:144)
別 名：*紅腹濱鷸*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(不普遍過境鳥及冬候鳥)、海南、廣東(冬候鳥)東南沿海、華北、東北各省。

Calidris ferruginea (Pontoppidan) 彎嘴濱鷸 (Chen et Yu, 1984, III:297; Yan et al., 1996:142)
=*Erolia testacea* (Pallas)
別 名：*滸鷸*。
捕 食：環節動物、昆蟲類。
分 佈：臺灣(不普遍過境鳥)、海南、廣東(冬候鳥)、西北、內蒙古、東北諸省；西伯利亞。

Calidris mauri 西濱鷸 (Yan et al., 1996:142)
捕 食 性。
分 佈：臺灣(迷鳥)；阿拉斯加(繁殖區)、在中南美渡冬。

Calidris melanotos 斑胸濱鷸 (Yan et al., 1996:144)
別 名：*美洲尖尾鷸*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(迷鳥)。

Calidris minutilla subminuta (Middendorff) 雲雀鷸 (Chen et Yu, 1984, III:298)
別 名：*長趾鷸，長趾濱鷸*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(澎湖，普遍過境鳥及冬候鳥)、廣東至東北各省；西伯利亞東部。

Calidris ptilocnemis 岩濱鷸 (Yan et al., 1996:142)
捕 食 性。
分 佈：遼寧(迷鳥)。

Calidris ruficollis (Pallas) 稺鷸 (Yan et al., 1996:146)
別 名：*紅胸濱鷸，赤頸小沙鑽*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(南部最多、澎湖， 普遍冬候鳥)、海南、廣東(冬候鳥)往北至東北各省；西伯利亞東部。

Calidris subminuta 長趾濱鷸 (Yan et al., 1996:146)
別 名：*雲雀鷸*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、海南、廣東(冬候鳥)。

Calidris temminckii (Leisler) 丹氏稚鷸 (Chen et Yu, 1984, III:297; Yan et al., 1996:146)
別 名：*青腳濱鷸，田氏小沙鑽*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(普遍境鳥及冬候鳥)、海南、雲南、廣西、廣東(冬候鳥)、大陸全境。

Calidris tenuirostris (Horsfield) 大濱鷸 (Chen et Yu, 1984, III:297; Yan et al., 1996:144)
別 名：*姥鷸，細嘴濱鷸*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(不普遍冬候鳥及過境鳥)、海南、廣東(冬候鳥)、東部沿海各省。

Capella gallinago gallinago (Linnaeus) 田鷸 (Chen et Yu, 1984, III:298)
別 名：*水鴦，普通沙錐，長尾鷸，鶴鶉鷸，扇尾鷸，扇尾沙錐，水雞兒*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(澎湖，普遍冬候鳥及過境鳥)、冬季南徙至大陸南方；歐亞大北部(繁殖)。

Capella hardwickii (J. E. Gray) 大地鷸 (Chen et Yu, 1984, III:298)
別 名：*大鷸，澳南沙錐*。

捕 食 性。
分 佈：臺灣(可能過境鳥)；日本北海道(繁殖)。

Capella megala (Swinhoe) 中地鷸 (Chen et Yu, 1984, III:298)
別 名：*大沙錐，北鷸*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(尚稱普遍冬候鳥及過境鳥)、內蒙古；西伯利亞東(繁殖)。

Capella stenura (Bonaparte) 針尾鷸 (Chen et Yu, 1984, III:298)
別 名：*針尾沙錐*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(普遍冬候鳥)、西北各省；西伯利亞東部。冬季南徙至大陸南方。

Crrocethia alba (Pallas) 三趾鷸 (Chen et Yu, 11984, III:296)
別 名：*沙鷸*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(普遍過境鳥，少數冬候鳥)；西伯利亞(繁殖)。

Eurynorhynchus pygmeus 勺嘴鷸 (Yan et al., 1996:146)
別 名：*琶嘴鷸*。
捕 食 性。
分 佈：廣東(冬候鳥)。

Gallinago gallinago 扇尾沙錐 (Yan et al., 1996:138)
別 名：*田鷸*。
捕 食：環節動物、昆蟲類、蜘蛛、甲殼類、軟體動物、小魚。
分 佈：臺灣、海南、西藏南部、雲南經貴州、四川、湖南、湖北、江西、安徽、江蘇、浙江、福建、廣東、廣西(冬候鳥)；新疆西部、內蒙古東部、吉林、黑龍江(夏候鳥)。

Gallinago hardwickii 澳南沙錐 (Yan et al., 1996:138)
別 名：*大地鷸*。
捕 食：環節動物、昆蟲類、蜘蛛、甲殼類、軟體動物、小魚。
分 佈：臺灣、河北、吉林(迷鳥)。

Gallinago nemoricola 林沙錐 (Yan et al., 1996:140)
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏(迷鳥)。

Gallinago solitaria 孤沙錐 (Yan et al., 1996:138)
捕 食：環節動物、昆蟲類、蜘蛛、甲殼類、軟體動物、小魚。
分 佈：廣東、浙江北部、四川南部、雲南西部、西藏南部、新疆西部(冬候鳥)；青

海、甘肅、新疆、內蒙古西部及東部、吉林、黑龍江(夏候鳥)。

Gallinago stenura 針尾沙錐 (Yan et al., 1996:138)

別 名：*針尾鷸*。

捕 食：環節動物、昆蟲類、蜘蛛、甲殼類、軟體動物、小魚。

分 佈：臺灣、海南、雲南、廣東(冬候鳥)；內蒙古東部、吉林、黑龍江(夏候鳥)。

Heteroscelus brevipes 灰尾鷸 (Yan et al., 1996:136)

別 名：*黃足鷸*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(過境鳥)、海南(冬候鳥)。

Heteroscelus incanus 灰鷸 (Yan et al., 1996:136)

別 名：*美洲黃足鷸*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(迷鳥)。

Limicola falcinellus sibirica Dresser 闊嘴鷸 (Chen et Yu, 1984, III:197; Yan et al., 1996:142)

別 名：*鮮卑鷸*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(西南沿海，不普遍過境鳥)、海南、廣東(冬候鳥)、東南各省至華北、東北。

Limosa lapponica 斑尾塍鷸 (Yan et al., 1996:128)

別 名：*斑尾鷸*。

捕 食：昆蟲及其幼蟲、甲殼類、環節動物。

分 佈：臺灣(過境鳥)、海南、廣東、福建沿海(冬候鳥)。

Limosa lapponica menzbieri Portenko 斑尾鷸 (Chen et Yu, 1984, III:295)

=*Limosa lapponica novaezealandoae* Gray

=*Limosa lapponica baueri* Naumann

捕 食 性。

分 佈：臺灣(臺南、澎湖、宜蘭等地，不普遍冬候鳥及過境鳥)、西北及東北各省。

Limosa limosa melanuroides Gould 黑尾鷸 (Chen et Yu, 1984, III:295; Yan et al., 1996:128)

別 名：*黑尾塍鷸*。

捕 食：昆蟲及其幼蟲、軟體動物。

分 佈：臺灣(不普遍冬候鳥及過境鳥)、西南、西北、新疆、內蒙古(夏候鳥)、東北各省。

Limnodromus scolopaceus 長嘴半蹼鷸 (Yan et al., 1996:128)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、香港(迷鳥)；西伯利亞東部、阿拉斯加(繁殖)、日本(冬候鳥及過境鳥)、巴里島、汶萊、泰國；遷移美國西岸、南部及中南美洲度冬，有小部份會沿太平西岸遷移。

Limnodromus semipalmatus 半蹼鷸 (Yan et al., 1996:128)

捕 食：昆蟲及其幼蟲、甲殼類、環節動物。

分 佈：臺灣(過境鳥)、東南沿海(過境鳥)、內蒙古東北部、吉林、黑龍江(夏候鳥)。

Lymnocrytes minuta (Brünnich) 小鷸 (Chen et Yu, 1984, III:298; Yan et al., 1996:146)

別 名：*姬鷸*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(偶見迷鳥)、香港(迷鳥)；歐亞大陸北部(繁殖)。

Micropalama himantopus 高蹺鷸 (Yan et al., 1996:134)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(迷鳥)。

Numenius arquata 白腰杓鷸 (Yan et al., 1996:130)

別 名：*大杓鷸*。

捕 食：昆蟲類、甲殼類、軟體動物、蠕蟲、小魚、蛙類。

分 佈：臺灣、海南、廣東至江蘇、江西、湖南、湖北、安徽、西藏西南部(冬候鳥)；內蒙古東北部、吉林、黑龍江(繁殖)。

Numenius arquata orientalis Brrehm 大杓鷸 (Chen et Yu, 1984, III:295)

別 名：*麻鷸，白腰杓鷸，大麻鷸*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(沿海灘地，普遍冬候鳥及過境鳥)、西北、內蒙古、東北諸省；西伯利亞。

Numenius borealis minutus Gould 小杓鷸 (Chen et Yu, 11984, III:295)

捕 食 性。

分 佈：臺灣(臺南、澎湖等地，稀有過境鳥)、東北各省；百伯利亞。

Numenius madagascariensis (Linnaeus) 駝鷸 (Chen et Yu, 1984, III:295; Yan et al., 1996:130)

=*Numenius cyanopus* Vieillot

別 名：*焙烙鷸，紅背大杓鷸，紅腰杓鷸*。

捕 食：昆蟲類、甲殼類、軟體動物、小魚、蛙類。

分 佈：臺灣(臺南、澎湖、宜蘭、臺北等地，冬候鳥及過境鳥)、廣東、甘肅、內蒙古東北部、吉林、黑龍江(繁殖)。

Numenius minutus 小杓鷸 (Yan et al., 1996:130)

捕 食：昆蟲及其幼蟲、甲殼類、軟體動物、小魚、兩棲類。

分 佈：臺灣、福建、廣東、內蒙古東北部、遼寧、吉林、黑龍江(過境鳥)。

Numenius phaeopus variegates (Scopoli) 中杓鷸 (Chen et Yu, 1984, III:295;Yan et al., 1996:130)

別 名：*杓鷸，小雛嘍兒*。
捕 食：昆蟲類、螺類。
分 佈：臺灣(沿海一帶、澎湖，普遍冬候鳥及過境鳥)、海南、廣東(沿海)(冬候鳥)；北極凍原帶(繁殖)。

Phalaropus fulicarius 灰瓣蹼鷸 (Yan et al., 1996:136)

捕 食：昆蟲類、螺類。
分 佈：臺灣(迷鳥)、浙江、江蘇、新疆西北部、河北、遼寧、吉林、黑龍江(過境鳥)。

Phalaropus lobatus 紅領瓣蹼鷸 (Yan et al., 1996:136)

捕 食：昆蟲類、浮游生物、甲殼類、軟體動物。
分 佈：臺灣(過境鳥)、海南(冬候鳥)。

Philomachus pugnax (Linnaeus) 流蘇鷸 (Chen et Yu, 1984, III:295; Yan et al., 1996:140)

別 名：*縐領，粗頸鷸*。
捕 食：昆蟲類。
分 佈：臺灣(花蓮、淡水，稀見過境鳥)、廣東、福建(冬候鳥)，遷徙時見於全國；西伯利亞(繁殖)。

Rringa guttifer 小青腳鷸 (Yan et al., 1996:134)

別 名：*諾氏鷸*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(迷鳥)、長江以南沿海(過境鳥)。

Scolopax rusticola rusticola Linnaeus 丘鷸 (Chen et Yu, 1984, III:297; Yan et al., 1996:140)

別 名：*山鷸，遊鶩，大水鶩*。
捕 食：環節動物、蠕蟲、昆蟲及其幼蟲。
分 佈：臺灣(蘭嶼，少見冬候鳥)、海南、西藏南部、雲南經四川、湖南、湖北、江西、安徽、江蘇、浙江、福建、廣東、廣西(冬候鳥)；甘肅、新疆、內蒙古東部、吉林、黑龍江(繁殖)。

Tringa erythropus (Pallas) 鶴鷸 (Chen et Yu, 1984, III:296; Yan et al., 1996:132)

=*Totanus fuscous* (Linnaeus)

別 名：*紅足沙鑽，紅腳鶴鷸*。
捕 食：昆蟲及其幼蟲、甲殼類、軟體動物。
分 佈：臺灣(稀有冬候鳥及過境鳥)、海南、廣東、福建(沿海)(冬候鳥)、新疆(繁殖)，遷徙幾遍見於東部各省。

Tringa glareola Linnaeus 林鷸 (Chen et Yu, 11984, III:196; Yan et al., 1996:132)

別 名：*鷹斑鷸，鷹鷸*。
捕 食：昆蟲類、蜘蛛、甲殼類、軟體動物。
分 佈：臺灣(普遍冬候鳥及過境鳥)、海南、廣東(冬候鳥)、山東、河北、內蒙古東部(夏候鳥)；西伯利亞(繁殖)。

Tringa guttifer (Nordmann) 諾曼氏青足鷸 (Chen et Yu, 1984, III:296)
別 名：*小青腳鷸*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(臺南，罕見冬季過境鳥)；西伯利亞(繁殖)。

Tringa hypoleucos Linnaeus 磯鷸 (Chen et Yu, 1984, III:296)
別 名：*夏鷸*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(普遍冬候鳥及過境鳥)、華南、華北(過境鳥)；西伯利亞(繁殖)。

Tringa incana brevipes (Vieillot) 黃足鷸 (Chen et Yu, 1984, III:295)
別 名：*東灰鷸*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(沿海一帶、蘭嶼、澎湖，普遍過境鳥及冬候鳥)、西北及東北各省。

Tringa incana incana (Gmelin) 美洲黃足鷸 (Chen et Yu, 1984, III:295)
=*Heteroscelus incanum incanum* (Gmelin)
別 名：*灰鷸*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(普遍過境鳥及冬候鳥)；阿拉斯加(繁殖)，冬季南遷至美國太平洋沿岸

Tringa nebularia (Gunnerus) 青腳鷸 (Chen et Yu, 1984, III:296; Yan et al., 1996:134)
別 名：*青足鷸，青鷸*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、海南、西藏南部經四川、湖南、湖北、江西、安徽、江蘇、浙江、福建、廣東、廣西(夏候鳥)。

Tringa ochropus Linnaeus 白腹草鷸 (Chen et Yu, 1984, III:296; Yan et al., 1996:132)
別 名：*綠鷸，草鷸*。
捕 食：昆蟲類、蜘蛛、甲殼類、軟體動物。
分 佈：臺灣(尚稱普遍冬候鳥及過境鳥)、海南、雲南、西藏南部經四川、陝西、山西、河北的東地區及新疆西部(冬候鳥)；新疆西部、遼寧、吉林、黑龍江(夏候鳥)；歐亞大陸北部(繁殖)。

Tringa stagnatilis (Bechstein) 澤鷸 (Chen et Yu, 1984, III:296; Yan et al., 1996:134)
別 名：*小青足鷸，泥澤鷸*。
捕 食 性。

分 佈：臺灣(普遍冬候鳥及冬候鳥)、內蒙古東部、吉林、黑龍江(夏候鳥)；西伯利亞(繁殖)。

Tringa totanus tetanus (Linnaeus) 紅腳鷸 (Chen et Yu, 1984, III:296; Yan et al., 1996:132)

=*Tringa tetanus eurrhinus* (Obeerholser)

別 名：*赤足鷸，鍆鷸*。

捕 食：昆蟲及其幼蟲、甲殼類、軟體動物。

分 佈：臺灣(不普遍冬候鳥及過境鳥)、海南、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、江西、湖南、湖北、廣東、福建(沿海)(冬候鳥)；西藏經四川北部、甘肅、陝西北部、山西、河北、新疆、內蒙古、遼寧、黑龍江(繁殖)；西伯利亞。

Tryngites subruficollis 飾胸鷸 (Yan et al., 1996:144)

別 名：*黃胸鷸*。

捕 食：昆蟲及其幼蟲、植物種子。

分 佈：臺灣(迷鳥)。

Xenus cinereus (Güldenstadt) 蹺嘴鷸 (Chen et Yu, 1984, III:2295; Yan et al., 1996:134)

別 名：*反嘴鷸*。

捕 食：昆蟲及其幼蟲、甲殼類、軟體動物。

分 佈：臺灣(普遍過境鳥)、海南、廣西、廣東、福建、浙江、江蘇、山東、河北、遼寧沿海、雲南南部、西藏南部、新疆西部(過境鳥)、東北各地。

LARIFORMES 鷗形目

Laridae 鷗科

Anoüs stolidus pileatus (Scopoli) 玄燕鷗 (Chen et Yu, 1984, III:278)

別 名：*玄鷰*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(不甚普遍留鳥)；菲律賓、印尼等地。

Chlidonias hybrida 鬚浮鷗 (Yan et al., 1996:156)

別 名：*黑腹燕鷗*。

捕 食：魚、蝦、水生昆蟲、蝗蟲。

分 佈：臺灣(冬候鳥)、雲南經四川至甘肅轉向東北東南廣大地區(夏候鳥)。

Chlidonias hybrida swinhoei (Mathews) 黑腹燕鷗 (Chen et Yu, 1984, III:277)

=*Hydrochelidon hydrida* (Pallas)

=*Chidonias leeucopareia swinhoei* (Math.)

別 名：*中華鬚燕鷗，花頭小燕鷗，鬚浮鷗，浮鷰*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(普遍冬候鳥及過境鳥)、西北及東北各省。

Chlidonias leucoptera (Temminck) 白翅浮鷗 (He, et al., 1991:148)

捕 食：稻蝗

Mythimna separata (Walker) 粘蟲。

分 佈：福建、廣東、海南、浙江、江蘇、山東、河、天津、內蒙古、東北等沿海。

Chlidonias nigra 黑浮鷗 (Yan et al., 1996:156)

捕 食：昆蟲類。

分 佈：河北、天津(冬候鳥)；新疆西北部(夏候鳥)。

Gelochelidon nilotica 鷗嘴噪鷗 (Yan et al., 1996:156)

別 名：*鷗嘴燕鷗*。

捕 食：魚、蝦、昆蟲類。

分 佈：臺灣、海南(稀有過境鳥)；廣西、廣東、湖南、江西、福建、浙江(留鳥)；山東、河北、遼寧、新疆西北部(夏候鳥)。

Gelochelidon nilotica affinis (Horsfield) 鷗嘴燕鷗 (Chen et Yu, 1984, III:277)

=*Gelochelidon nilotica addenda* Mathews

=*Gelochelidon nilotica nilotica* Mathews

別 名：*鷗嘴燥鷗*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(恒春、臺南、澎湖、淡水等地，稀見留鳥)、華北各省。

Hydroprogne tsschhegrava tschegrava (Lepechin) 裏海燕鷗 (Chen et Yu, 1984, III:277)

別 名：*紅嘴巨鷗*，*魚江郎*，*鬼鳶*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(蘭嶼、臺南、澎湖等地，不普遍冬候鳥及過境鳥)、山東、東北各省。

Larus argentatus 銀鷗 (Yan et al., 1996:150)

別 名：*黑脊鷗*。

捕 食：死魚或殘物、嚙齒類、昆蟲類。

分 佈：臺灣、雲南、貴州、四川、湖南、湖北、山東、河北、江蘇、安徽、浙江、福建、江西、廣東、廣西(冬候鳥)；新疆西部、內蒙古東部(夏候鳥)。

Larus canus kamtschatschensis (Bonaparte) 鷗 (Chen et Yu, 1984, III:279)

別 名：*海鷗*，*灰鷗*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣(不甚普遍冬候鳥)、東南、西南、東北各省。

Larus crassirostris Vieillot 黑尾鷗 (Chen et Yu, 1984, III:279)

別 名：*大嘴鷗*，*海貓*。

捕 食 性。